

Najstrawniejsza
ze wszystkich wód zawierających arsen i żelazo
Naturalna mineralna

Woda Gubera
zawierająca
żelazo i arsen
ze **Srebrenicy** w Bośni

Według analizy, którą przeprowadził c. k. z. prof. chemii
lekarskiej radca dworu Dr. Ernest Ludwig, zawiera owa
mineralna woda na 10.000 części:

bezwodnika kwasu arsenowego . . . 0 061
siarkanu żelazowego 3.734

Woda Gubera stosowana była ze skutkiem:

1. W chorobach wywołanych nieprawidłowym składem krwi (Anaemia, Chlorosis).
2. W osłabieniach po cięższych chorobach, po przebyciu zimnicy, w cherze zimniczej.
3. W chorobach kobiecych i ich następstwach.
4. W chorobach skóry.
5. W chorobach nerwowych.
6. W niektórych nowotworach (Lymphoma).

Wylączne prawo rozsyłki posiadają
firmy:

HENRYK MATTONI

Francensbad, Wiedeń, Karlsbad, Budapeszt.

ZAKŁAD WODOLECZNICZY


Dra J. Kołaczkowskiego
w Szczawnicy pod ~~gór~~ami
■ cały rok otwarty ■



W pensyonacie opłaca jedna osoba
3 Zlr. 50 ct. za wszystko.

❧ Kuchnia wyborna ❧

Własne gospodarstwo dostarcza
mleka i. t. p.



Najnowsze przyrządy elektryczne, gim-
nastyczne znajdują się w Zakładzie.

ZAKŁAD
zdrojowo-klimatyczny
W SZCZAWNICY

poleca się gorąco

obywatelskiemu poparciu
PT. Lekarzy z ordynacją
wód ze źródeł

Józefiny i Magdaleny

silniejszych od tego rodzaju szczaw
alkaliczno sodowo-słonawych zagra-
nicznych, jak wody Emskie, Gle-
ichenbergskie, a zwłaszcza Selterska
i Giesshübelska.

Dzierżawca i zarządca

Feliks Wiśniewski.

KALENDARZ LEKARSKI

KRAKOWSKI

NA ROK

1898_x

na wezwanie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

ułożył

Doc. Dr. Jan Raczyński.

ROK SIÓDMY.

W KRAKOWIE,

NAKŁADEM KSIĘGARNI S. A. KRZYŻANOWSKIEGO.

1898.



1003120781

Kalendarz kościelny.	Str.
Podręcznik terapeutyczny	1
Spis środków lekarskich oficjalnych i waż- niejszych nieoficjalnych (wraz z poda- niem ich cen, sposobu stosowania i daw- kowania	113
Najwyższe dawki środków leczniczych	175
Dawki przeciętne dla dzieci	177
Cennik robót receptowych	179
Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich	185
Badanie moczu	187
Ostre otrucia	193
Środki używane do podskórnych wstrzyki- wań	204
Tablica brzemienności	210
Skorowidz ważniejszych zdrojowisk	211
Praktyczne wskazówki karmienia niem- owląt	231
Tabela wzrostu i przybierania na ciężarze zdrowego	235
Uwagi sądowo lekarskie	237
Warunki przyjmowania chorych do zakł. obłąkanych	243
Ustawy o zaprowadzeniu Izb lekarskich	245
Szematyzm lekarski	251
Ogólne przepisy pocztowe	288
Skala stemplowa	292

42819



W KRAKOWIE,

W Drukarni „CZASU“ FR. KLUCZYCKIEGO I SPÓŁKI
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.

Styczeń.

Janwar.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Nowy Rok. Mieczysława	20 Ihnattia jep. mucz.
2 N.	2 po Boż. Nar. Makarego	21 N. 4 Adw. Julianyi mucz.
3 P.	Daniela i Genowefy p.	22 Anastazyia mucz.
4 W.	Tytusa i Eugeniusza	23 Muczen. 10 w Kry.
5 S.	Emiliana p. i Telesfora	24 <i>Wigil. do Rożdest.</i>
6 C.	Trzech Króli	25 Rożdest. Chryst.
7 P.	Juliana i Lucyana mm.	26 Sobor Pr. Bohor.
8 S.	Seweryna i Maksyma ☿	27 Stefana mucz.
9 N.	1 po 3 Kr. Marcyanny p.	28 N. 1 p. R. 20 tysiaecz. Mucz.
10 P.	Wilhelma i Jana Dobr.	29 14 tys. ubit. Mładence
11 W.	Higiniusza b. i Leone.	30 Anysyi prepod.
12 S.	Honoraty i Arkadyusza	31 Melanyi Rymianki
13 C.	Hilarego bisk. i Gotfryda	1 Janwar. Obr. Hospod.
14 P.	Feliksa męcz.	2 Sylwestra papy Rym.
15 S.	Pawła 1 púst. i Maura ☿	3 Małachia proroka
16 N.	2 po 3 Kr. <i>Imię Jezusa</i>	4 N. 2 po R. Sobor 70 apost.
17 P.	Antoniego opata wyzn.	5 <i>Wigil. do Bohojawłen</i>
18 W.	Kat. ś. Piotra w Rz.	6 Bohøjawłenye Hospod.
19 S.	Ferdynanda wyzn.	7 Sobor S. Joanna
20 C.	Fabiana i Sebastjana m.	8 Heorhia prep.
21 P.	Agnieszki panny męcz.	9 Połyjewkta mucz.
22 S.	Wincentego i Anastaz. ☿	10 Hryhoria jepisk.
23 N.	3 po 3 Kr. Zaślubien. NP.	11 N. 1 po B. Fteodosya prep.
24 P.	Tymoteusza bisk. męcz.	12 Tatyanny mucz.
25 W.	Nawrócenie ś. Pawła	13 Jermyła mucz.
26 S.	Batyldy i Pauli wdowy	14 SS. Otec w Synai
27 C.	Jana Złotoustego b. w.	15 Pawła Ftyweysk.
28 P.	Karola W. i Walerego b.	16 Petra Weryhy
29 S.	Franciszka Sal. i Sab. ☿	17 Antonya Welykaho
30 N.	4 po 3 Kr. Hiacynty p.	18 N. 2 po B. Aftanasya i Kyr.
31 P.	Ludwiki-Albertonii wd.	19 Makarya prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

24 — 1 **Schebat.**

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 8 g. 1 m. 24 rano.

☿ dnia 15 g. 4 m. 46 dopoł.

☿ dnia 22 g. 8 m. 24 rano.

☿ dnia 29 g. 3 m. 32 podoł.

Luty.

Fewrał.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	<i>Wigil.</i> Ignacego bisk.	20	Jeoftymya Welykaho
2 S.	Oczyszczenie N. Maryi P.	21	Maxyma prepod.
3 C.	Błażeja bisk. męcz.	22	Tymoftea apost.
4 P.	Weroniki panny.	23	Klymenta jepisk.
5 S.	Agaty panny męcz.	24	Xenyi prepod.
6 N.	5 Staroz. Doroty p. m. ☿	25	N. 3 po B. Hryhorya bohosi.
7 P.	Romualda opata w.	26	Xenofonta prepod.
8 W.	Jana z Mathy i Cyryaka	27	Joanna Zlatoust.
9 S.	Apolonii p. i Sabina	28	Jefrema prepod.
10 C.	Scholastyki i Sylwiana	29	Ihnatia jepisk. mucz.
11 P.	Hipolita i Eufrozyny	30	Triech Swiatytel.
12 S.	Modesta m. i Eulalii p.	31	Kyra i Joanna mucz.
13 N.	6 Mięsup. Juliana męcz.	1	Fewrał, N. 4 po B. Tryf.
14 P.	Walentego kapłana ☾	2	Strytenye Hospod.
15 W.	Faustyna i Jowity mm.	3	Symeona bohopr.
16 S.	Juliany panny męcz.	4	Isydora prepod.
17 C.	Sabina b. i Sylwina	5	Ahaftyi mucz.
18 P.	Symeona i Konstancyi p.	6	Wukoła prepod.
19 S.	Konrada w. i Mansweta	7	Parftenya prepod.
20 N.	7 Zapustna. Leona p. ☼	8	N. 5 po B. Miasop. Fteodora
21 P.	Eleonory panny.	9	Nykyfora mucz.
22 W.	Katedry ś. Piotra w Ant.	10	Charalampia mucz.
23 S.	<i>Popielec.</i> Florentego w.	11	Własya jepisk. mucz.
24 C.	<i>Macieja apostola</i>	12	Meletya archiep.
25 P.	Wiktoryna i Wiktora m.	13	Martyniana prepod.
26 S.	Aleksandra b. i Nestora	14	Auxentia prepod.
27 N.	1 Wstępna. Anastazyi p.	15	N. 6 Syrop. Onysyma apost.
28 P.	Romana opata w. ☾	16	<i>Post Wel.</i> Pamfyła mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

29 — 1 Adar.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 6 g. 7 m. 24 popoł.

☾ dnia 14 g. 1 m. 34 rano.

☼ dnia 20 g. 8 m. 40 popoł.

☾ dnia 28 g. 12 m. 13 popoł.

Marzec.

Mart.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	Albina b. i Antoniny p.	17	Fteodora mucz.
2 S.	<i>Such.</i> Heleny i Amalii	18	Lwa Papy Rymskoho
3 C.	Kunegundy cesarzowej	19	Archyppa apost.
4 P.	<i>Such.</i> Kazimierza kr. pol.	20	Lwa episk.
5 S.	<i>Such.</i> Fryderyka opata	21	Tymoftea prepod.
6 N.	2 <i>Sucha.</i> Kolety i Maryana	22	N. 1 Wstupa. SS. MM. w Ew.
7 P.	Tomasza z Akwinu w.	23	Polykarpa jep. mucz.
8 W.	Jana Bożego i Beaty [Ⓜ]	24	Obr. Gławy Joanna
9 S.	Franciszki Rzym. wd.	25	Tarasia archiep.
10 C.	40 Męczenników	26	Porfiryra prep.
11 P.	Konstantego Wielk.	27	Prokopia archiep.
12 S.	Grzegorza Wielk. pap.	28	Wasylyia prep.
13 N.	3 Głucha. Krystyhy p.	1	Mart. N. 2 Postu. Jewdoki
14 P.	Zacharyasza p. i Matyldy	2	Fteodota mucz.
15 W.	Izabelli i Leoncyi pp. [Ⓢ]	3	Jewtropia mucz.
16 S.	Cyryaka dyakona	4	Harasya prepod.
17 C.	Gertrudy p. i Patrycego	5	Konona mucz.
18 P.	Aleksandra i Edwarda	6	SS. 43 męczenników
19 S.	Józefa obłubieńca NMP.	7	Wasylyia mucz.
20 N.	4 Srodop. Eufemii męcz.	8	N. 3 Postu. Fteofylakta m.
21 P.	Benedykta opata w.	9	SS. 40 Męczenników
22 W.	Katarzyny król. Szw. [Ⓢ]	10	Kondrata mucz.
23 S.	Wiktoryana i Oktawiana	11	Sofronia prepod.
24 C.	Wigil. Gabryela archan.	12	Fteofana prepod.
25 P.	Zwiastowanie N. Maryi P.	13	Nikyfora patryar.
26 S.	Teodora biskupa	14	Wenedykta prepod.
27 N.	5 Biała. Jana p. i Ruperta	15	N. 4 Postu. Ahapia mucz.
28 P.	Sykstusa pap. wyzn.	16	Sawyna mucz.
29 W.	Eustazego op. i Cyryla	17	Alexia prepod.
30 S.	Kwiryna m. i Zozyma [Ⓢ]	18	Kyrylla archiep.
31 C.	Balbiny i Kornelii pp.	19	Chrysanfta mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

7 — 13 Post. Estery.

8 — 14 Purim.

9 — 15 Schuschan-Purim.

24 — 1 **Nisan.**

ODMIANY KSIĘŻYCA.

Ⓜ dnia 8 g. 10 m. 28 rano.

Ⓢ dnia 15 g. 8 m. 48 popoł.

Ⓢ dnia 22 g. 9 m. 37 rano.

Ⓢ dnia 30 g. 8 m. 40 rano.

Kwiecień.

April.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	7 <i>Bol. NP.</i> i Hugona bisk.	20 Prepod. Otec. w Ob. S.
2 S.	Franciszka z Pauli w.	21 Jakowa prepod.
3 N.	6 Kwietnia. Pankracego	22 N. 5 Postu. Wasylija jep.
4 P.	Izydora bisk. wyzn.	23 Nykona prepod.
5 W.	Wincentego Fereryusza	24 Zacharyi prepod.
6 S.	Celestyna papieża ☸	25 Błahowiszcze
7 C.	<i>Wiecz. Pańska.</i> Epifan.	26 Sobor Hawryła
8 P.	<i>Wielki.</i> Dyonizego bisk.	27 Matrony mucz.
9 S.	<i>Wielka.</i> Maryi Kleofe	28 Hariona prepod.
10 N.	Wielk. Zmartw. P. Ezech.	29 N. 6 Postu. Marka prepod.
11 P.	Wielkanocny. Leona pap.	30 Joanna Listw.
12 W.	Juliusza pap.	31 Ipatya jepisk.
13 S.	Justyna mucz. i Idy ☾	1 April. Maryi Jehyp.
14 C.	Waleryana i Maksyma	2 Tyta prepod.
15 P.	Ludwiny i Kasyldy pp.	3 Piatok welyki. Nykity prep.
16 S.	Lamberta mucz.	4 Josyfa prepod.
17 N.	1 Przew. Rudolfa bisk.	5 N. Woskresenje. Fteodula m.
18 P.	Apoloniusza mucz.	6 Pon. świąty. Jewtychia jep.
19 W.	Jerzego b. i Antonii p.	7 Wt. świąty. Heorhia prep.
20 S.	Agnieszki z Pol. ☸	8 Irodiona apost.
21 C.	Anzelma b. doktora Kość.	9 Jewpsyhia jepisk.
22 P.	Sotera i Kaja mucz.	10 Terentia mucz..
23 S.	<i>Wojciecha arcybiskupa</i>	11 Antypy jepisk.
24 N.	2 po W. Grobu Jez. Jerzego	12 N. 1 po W. Wasylija prep.
25 P.	Marka ewangelisty	13 Artemona jepisk.
26 W.	Kleta i Marcelina mm.	14 Martyna papy.
27 S.	Anastazego p. i Teofila	15 Arystarcha apost.
28 C.	Witalisa i Waleryi mm.	16 Ahapii mucz.
29 P.	Piotra męczennika ☾	17 Symeona prepod.
30 S.	Katarzyny Sen. panny	18 Joanna prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

6 — 14 Przeddzień Paschy.	13 — 21 Siódme święto.
7 — 15 Święto Paschy.	14 — 22 Koniec Paschy.
8 — 16 Drugie św. Paschy.	23 — 1 Ijar.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☸ dnia 6 g. 10 m. 19 popoł.	☸ dnia 20 g. 11 m. 20 popoł.
☾ dnia 13 g. 3 m. 28 popoł.	☾ dnia 29 g. 3 m. 4 rano.

Maj.

Maj.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA BUSKIE.
1 N.	3 p. W. <i>Op. ś. Józ. i Filipa</i>	19	N. 2 po W. Joanna prepod.
2 P.	Zygmunta m. i Anastaz.	20	Fteodora prep.
3 W.	<i>Znalezienie św. Krzyża</i>	21	Januaria mucz.
4 S.	Floryana m. i Moniki	22	Fteodora Sykeota
5 C.	Gotarda b. i Fiusa V. p.	23	Heorhia mucz.
6 P.	Jana w ol. i Benedykty ☿	24	Sawwy mucz.
7 S.	Flawii i Domicelli pp.	25	Marka Apost.
8 N.	4 po W. <i>NP. Łask. i Stanisł.</i>	26	N. 3 po W. Wasyłyia mucz.
9 P.	Grzegorza Naz. i Dyzmy	27	Symeona jep. mucz.
10 W.	Izydora włosc. i Joba	28	Jasona apost.
11 S.	Beatryksy panny	29	Dewiat muczennikow
12 C.	Nereusza i Pankrac. ☾	30	Jakowa proroka
13 P.	Hilarego i Serwacego m.	1	Mai. Jeremia proroka
14 S.	Bonifacego męcz.	2	Aftanasya Welykoho
15 N.	5 po W. Zofii i 3 jej córek	3	N. 4 po W. Tymoftea mucz.
16 P.	† Jana Nepomucena	4	Pelahi mucz.
17 W.	† Paschalisa i Torpeda	5	Iryny mucz.
18 S.	† Feliksa kapuc. i Eryka	6	Jowa Prawednaho
19 C.	Wniebowst. P. Piotra Cel.	7	Wospom. Kresta
20 P.	Bernardyna Sen. w. ☿	8	Joanna Bohosł.
21 S.	Heleny królowej	9	Pren. M. Nykoł.
22 N.	6 po W. Julii panny m.	10	N. 5 po W. Symona Apost.
23 P.	Dezyderyusza bisk. w.	11	Mokia mucz.
24 W.	Joanny wd. i Afry m.	12	Jepyfania jepisk.
25 S.	Urbana i Grzegorza	13	Hlykeryi mucz.
26 C.	Filipa Nereusza w.	14	Wozn. Hosp. Isydora mucz.
27 P.	Jana p. m. i Maryi Magd.	15	Pachomya Weł.
28 S.	<i>Wigil.</i> Wilhelma i Aug. ☾	16	Fteodora prepod.
29 N.	Zesł. Ducha św. Maksyma	17	N. 6 po W. Andronika ap.
30 P.	Świąteczny. Feliksa pap.	18	Fteodora prep.
31 W.	Petronelli panny m.	19	Patrykia jepisk.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

10 — 18 Święto szkolne
22 — 1 **Sivan.**

27 — 6 Zielone Święto.
28 — 7 Drugie święto.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 6 g. 7 m. 33 rano.

☾ dnia 12 g. 10 m. 36 popoł.

☿ dnia 20 g. 1 m. 58 popoł.

☾ dnia 28 g. 6 m. 14 popoł.

Czerwiec.

Ijun.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	<i>Such.</i> Nikodema męcz.	20 Ftałatea mucz.
2 C.	Eugeniusza p. i Erazma	21 Konstantyna i Jełeny
3 P.	<i>Such.</i> Klotyldy król.	22 Wasyliya mucz.
4 S.	<i>Such.</i> Saturniny ☿	23 Michaiła prep.
5 N.	1 po S. SSS. Trójcy. Flor.	24 N. Sosz. S. Duch a Symeona
6 P.	Norberta op. i Klaud.	25 SSS. Trojcy. Tretye Obr. Hła.
7 W.	Roberta b. i Sabiny	26 Karpa apost.
8 S.	Medarda bisk. wyzn.	27 Fteraponta jep.
9 C.	Boże Ciało. Felicyana m.	28 Nykyty prepod.
10 P.	Małgorzaty wdowy	29 Fteodosyi mucz.
11 S.	Barnaby apostoła ☾	30 Isaaka prepod.
12 N.	2 po S. Onufrego wyzn.	31 N. 1 po S. Jermia apost.
13 P.	Antoniego z Padwy	1 Ijun. Instyna mucz.
14 W.	Bazylego Wielk. bisk.	2 Nykyfora patr.
15 S.	Wita i Modesta mm.	3 Łukifyana mucz.
16 C.	Justyny p. i Benona w.	4 Tyło Chryst. Mytrofana patr.
17 P.	<i>Serca Jezus.</i> Adolfa b.	5 Doroftea jep. m.
18 S.	Marka i Marceliana mm.	6 Wyssariona prepod.
19 N.	3 po S. Gerwazego m. ☿	7 N. 2 po S. <i>Post do Petr.</i> Fteod.
20 P.	Reginy i Florentyny pp.	8 Fteodora mucz.
21 W.	Alojzego Gonzagi w.	9 Kyryła archiep.
22 S.	Paulina i Konsoreyi	10 Tymoftea jep. mucz.
23 C.	Agrypiny i Wandy pp.	11 Warfłołomea apost.
24 P.	<i>Narodzenie św. Jana</i>	12 Onufrya prep.
25 S.	Wilhelma w. i Łucyi p.	13 Sostrad. Pr. Bohor. Akityn.
26 N.	4 po S. Jana i Pawła br.	14 N. 3 po S. Jelyssea proroka
27 P.	Władysława króla w. ☾	15 Amosa proroka
28 W.	<i>Wigilia.</i> Leona pap.	16 Tychona prepod.
29 S.	Piotra i Pawła apostołów	17 Manuila mucz.
30 C.	Emilii i Lucyny mm.	18 Leontia mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

21 — 1 **Thamuz.**

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 4 g. 3 m. 11 popoł.

☾ dnia 11 g. 7 m. 4 rano.

☿ dnia 19 g. 5 m. 19 rano.

☾ dnia 27 g. 5 m. 54 rano.

Lipiec.

Ijuł.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Teobalda op. i Aarona	19 Judy Ftad. apost.
2 S.	<i>Nawiedz. NMP.</i> i Eugen.	20 Meftodia jepiskopa
3 N.	5 po S. Alfreda i Anat. ☿	21 N. 4 po S. Julyana muez.
4 P.	Józefa Kalas. i Prokopa	22 Jewsewya jep. muez.
5 W.	Cyrylla i Metodego	23 Ahrypiny muez.
6 S.	Izajasza i Domiuiki	24 Różdest S. Joanna Krest.
7 C.	Estery kr. i Klaudysza	25 Fewronyi prepod.
8 P.	Elżbiety królowej wd.	26 Dawyda prepod.
9 S.	Cyrylla b. i Anatolii	27 Sampsona prepod.
10 N.	6 po S. Jana z Dukli ☾	28 N. 5 po S. Kyra i Joanna
11 P.	Pelagii, Sabina i Pius p.	29 Petra i Pawła Apost.
12 W.	Jana Gwalb. i Epifany	30 SS. Apost. 12.
13 S.	Małgorzaty panny m.	1 Ijuł. Kosmy i Dam.
14 C.	Bonawentury dra w.	2 Położ. Ryzy. Preś. Boh.
15 P.	Rozesł. Ap. i Henryka	3 Jakynfta muez.
16 S.	<i>NP. Szkapl.</i> i Rajnolda m.	4 Andreia archiepisk.
17 N.	7 po S. Aleksego wyzn.	5 N. 6 po S. Aftanasia Afron.
18 P.	Szymona z Lipnley ☿	6 Sysoa prepod.
19 W.	Wincentego a Paulo w.	7 Ftomy prepod.
20 S.	Czesława i Kassyana	8 Prokopya muez.
21 C.	Daniela pr. i Praksedy	9 Pankratya jep. muez.
22 P.	Maryi - Magdaleny	10 45 Muezen.
23 S.	Teofila m. i Apolinarego	11 Jewfymyi muez.
24 N.	8 po S. Kunegundy król.	12 N. 7 po S. Prokta muez.
25 P.	<i>Jakóba apost.</i> i Krzyszt.	13 Hawryiła archan.
26 W.	<i>Anny Matki N. M. P.</i> ☾	14 Akyły apost.
27 S.	Natalii i Liliozy pp.	15 Kyrika muez.
28 C.	Innocentego i Wiktora	16 Aftynohema jepisk.
29 P.	Marty gosp. i Lucylli	17 Maryny muez.
30 S.	Julitty p. i Heleny wd.	18 Jemyłyana muez.
31 N.	9 po S. Ignacego Lojoli	19 N. 8 po S. Makryny prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

7 — 17 Post. Zdob. świątyni.
20 — 1 **Ab.**

28 — 9 Post. Spal. świątyni.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 3 g. 10 m. 12 popoł.

☿ dnia 18 g. 8 m. 47 popoł.

☾ dnia 10 g. 5 m. 42 popoł.

☾ dnia 26 g. 2 m. 40 popoł.

Sierpień.

Awhust.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Piotra w Okowach m.	20 Ryi proroka
2 W.	NMP. Anielsk. i Alf. ☿	21 Symeona prepod.
3 S.	Znalez. ś. Szczepana	22 Maryi Mahdałyny
4 C.	Dominika wyzn.	23 Trofyma mucz.
5 P.	N. Maryi P. Snieżnej	24 Chrystyny mucz.
6 S.	<i>Przemienienie Pańskie</i>	25 Uspen. S. Anny
7 N.	10 po S. Kajetana w.	26 N. 9 po S. Jermołaja mucz.
8 P.	Cyryaka i Maryana m.	27 Pantaleimona mucz.
9 W.	Kamila w. i Romana ☾	28 Prochora apost.
10 S.	Wawrzyńca i Filomeny	29 Kałynyka mucz.
11 C.	Zuzanny panny męcz.	30 Syły apost.
12 P.	Klary i Hilaryi pp.	31 <i>Zapust do Uspenya</i>
13 S.	<i>Wigilia.</i> Hipolita męcz.	1 Awhust. Proischozd. kr.
14 N.	11 po S. Euzebiusza m.	2 N. 10 po S. Stefana mucz.
15 P.	Wniebowzięcie N. Maryi P.	3 Isaaka prepod.
16 W.	Rocha wyznawcy	4 Sedmy Otrokow.
17 S.	Anastazego i Mirona ☿	5 Jewsychnya mucz.
18 C.	Heleny Szwedzkiej m.	6 Preobraż. Hospoda.
19 P.	Benigny p. i Sebalda w.	7 Demetrya prepod.
20 S.	Bernarda i Samuela	8 Jemelyana jepisk.
21 N.	12 po S. Jacka i Joanny	9 N. 11 po S. Matfya apost.
22 P.	Symforyna i Tymoteusza	10 Ławrentya mucz.
23 W.	Zacharyasza i Filipa B.	11 Jewpła mucz.
24 S.	<i>Bartłomieja apostoła</i> ☾	12 Fotyą mucz.
25 C.	Ludwika króla franc.	13 Maxyma prepod.
26 P.	Aleksandra m. i Zefiryna	14 Michea proroka
27 S.	Róży i Przen. ś. Kazim.	15 Uspenye Pr. Bohorodycy
28 N.	13 po S. <i>Pociesz. N. M. P.</i>	16 N. 12 po S. Nerukotw. Obraz.
29 P.	Ścięcie ś. Jana i Sabiny	17 Myrona mucz.
30 W.	Feliksa i Róży z Limy	18 Flora i Ławra m.
31 S.	Rajmunda wyzn. ☿	19 Andrea mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

19 — 1 Elul.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 2 g. 5 m. 28 rano.

☾ dnia 9 g. 7 m. 13 rano.

☿ dnia 17 g. 11 m. 34 rano.

☾ dnia 24 g. 9 m. 32 popoł.

☿ dnia 31 g. 1 m. 50 popoł.

Wrzesień.

Sentiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	Idziego opata wyzn.	20 Samuila proroka
2 P.	Stefana kr. i Kaliksty m.	21 Ftaddea apost.
3 S.	Bronisławy p. i Eufemii	22 Ahaftonyka mucz.
4 N.	14 po S. Joach. i Rozalii	23 N. 13 po S. Łuppa mucz.
5 P.	Wawrzyńca i Urbana p.	24 Jewtychia mucz.
6 W.	Zacharyasza proroka	25 Warftołomea apost.
7 S.	<i>Wigilia.</i> Reginy p. m. ☾	26 Adryana m. i Natalii m.
8 C.	Narodzenie N. Maryi Panny	27 Pimena prepod.
9 P.	Gorgonięgo i Sergiusza	28 Moysea muryna
10 S.	Mikołaja z Tolent. w.	29 Usikn. Hławy S. Joanna
11 N.	15 po S. Im. NMP. i Prota	30 N. 14 po S. Alexandra patr.
12 P.	Tobiasza w. i Gwidona	31 Położ. Poiasz. P. Bohor.
13 W.	Aureliusza bisk.	1 Sentiabr. Symeona
14 S.	<i>Podwyższenie ś. Krzyża</i>	2 Mamanta mucz.
15 C.	Nikomedesa m. i Emila	3 Anftyma mucz.
16 P.	Ludmiły m. i Edity p. ☾	4 Wawyły świaszcze.
17 S.	Piętna św. Franciszka	5 Zacharyi proroka
18 N.	16 po S. Józefa z Kopert.	6 N. 15 po S. Cud. S. Mychaila
19 P.	Januarego m. i Konst.	7 Zozonta mucz.
20 W.	Eustachego b. i Faustyna	8 Rozdestwo Pr. Bohor.
21 S.	<i>Such.</i> Mateusza ap. ew.	9 Joakima i Anny
22 C.	Maurycego i Tomasza	10 Mynodory prepod.
23 P.	<i>Such.</i> Tekli panny m. ☾	11 Fteodory prepod.
24 S.	<i>Such.</i> Gerarda bisk. m.	12 Awtenoma mucz.
25 N.	17 po S. Władysł. z Gie.	13 N. 16 po S. Kornyla mucz.
26 P.	Józefata m. i Cypryana	14 Wozdwyżenye S. Kresta
27 W.	Przeniesienie ś. Stanisł.	15 Nykity mucz.
28 S.	Wacława męcz.	16 Josafata archiep.
29 C.	<i>Michała archaniota</i>	17 Sofii mucz.
30 P.	Hieronima dra wyzn. ☾	18 Jewmenia prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

16 — 29	Przeddz. Now. Roku.	18 — 2	Drugie święto.
17 — 1	Tischri. Nowy Rok	19 — 3	Post. Gedaljach.
	5659.	26 — 10	Święto pojednania.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 7 g. 11 m. 50 popoł.	☾ dnia 23 g. 3 m. 39 rano.
☾ dnia 16 g. 1 m. 10 rano.	☾ dnia 30 g. 12 m. 10 rano.

Październik.

Octiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Remigiego biskupa w.	19	Trofyma mucz.
2 N.	18 po S. N. M. P. Różańc.	20	N. 17 po S. Jewstafya mucz.
3 P.	Kandyda i Lukrecyi p.	21	Kondrata apost.
4 W.	Franciszka Sera. wyzn.	22	Foky mucz.
5 S.	Flawii i Charytyny pp.	23	Zaczat. s. Joanna Krest.
6 C.	Brunona biskupa w.	24	Ftekly mucz.
7 P.	Justyny p. i Helana ☉	25	Jewfrosini prepod.
8 S.	Brygidy wd. i Pelagii	26	Joanna Bohosław.
9 N.	19 po S. Wincentego Kadł.	27	N. 18 po S. Kałystrata m.
10 P.	Franciszka Borg. wyzn.	28	Charytona prepoc.
11 W.	Placydy i Filomelli pp.	29	Kyryaka prepod.
12 S.	Maksymiliana biskupa	30	Hryhorya jep. mucz.
13 C.	Edwarda króla wyzn.	1	Octiabr. Pokr. Pr. Bohor.
14 P.	Kaliksta p. i Fortunaty	2	Kypryana jepisk.
15 S.	Jadwigi i Teresy ☉	3	Dyonysya mucz.
16 N.	20 po S. Pawła opata w.	4	N. 19 po S. Jeroftea jep. m.
17 P.	Florentego i Małgorzaty	5	Charytyny mucz.
18 W.	Łukasza Ewangiel.	6	Ftomy apost.
19 S.	Piotra z Alkantary w.	7	Sergia i Wakha
20 C.	Przenies. ś. Wojciecha	8	Pelachii prepod.
21 P.	Urszuli panny męcz.	9	Jakowa apost.
22 S.	Korduli i Alodii pp. ☾	10	Jewłampya mucz.
23 N.	21 po S. Jana Kantego	11	N. 20 po S. Pyłypa apost.
24 P.	Rafała arch. i Fortunata	12	Prowa mucz.
25 W.	Kryszpina i Kryszpian.	13	Karpa i Papyta
26 S.	Ewarysta pap. i Fulki	14	Nazarya mucz.
27 C.	Iwona w. i Sabiny m.	15	Jewfymya prepod.
28 P.	<i>Szymona i Tadeusza ap.</i>	16	Łonhyna mucz.
29 S.	Nareyza b. i Euzebii ☿	17	Osyi proroka
30 N.	22 po S. Marcelego pap.	18	N. 21 po S. Łuki jew. ap.
31 P.	<i>Wigilia. Wolfganga b.</i>	19	Joila proroka

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 15	Święto kuczek.	8 — 22	Koniec kuczek.
2 — 16	Drugie św. kuczek.	9 — 23	Radość z praw.
7 — 21	Święto palmowe.	17 — 1	Marcheschwan.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 7 g. 7 m. 4 popoł.	☾ dnia 22 g. 10 m. 9 rano.
☿ dnia 15 g. 1 m. 37 popoł.	☿ dnia 29 g. 1 m. 18 podół.

Listopad.

Nojabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	Wszystkich Świętych	20 Artemia mucz.
2 S.	<i>Dzień Zaduszny. Wikt.</i>	21 Hariona prepod.
3 C.	Huberta b. i Sylwii wd.	22 Awerkia jepisk.
4 P.	Karola Borom. i Modesty	23 Jakowa apost.
5 S.	Elżbiety Matki N. M. P.	24 Arefty mucz.
6 N.	23 po S. Opieki N. M. P. ☾	25 N. 22 po S. Markiana mucz.
7 P.	Herkulana i Amaranta	26 Demetria mucz.
8 W.	Czterech Koronatów m.	27 Nestora mucz.
9 S.	Teodora żoł. i Ursyna	28 Terentia mucz.
10 C.	Andrzeja z Aw. i Nimfy	29 Anastasyi mucz.
11 P.	Marcina bisk. wyzn.	30 Zynowia mucz.
12 S.	Marcina p. 5 braci Polak.	31 Stachya apost.
13 N.	24 po S. Stan. K. i Homob.	1 Nojabr. N. 23 po S. Kosmy
14 P.	Jozafata Kuncewicza ☸	2 Josafata Archiep. mucz.
15 W.	Leopolda wyzn.	3 Akepsymy mucz.
16 S.	Edmunda i Pawła	4 Joannyka prepod.
17 C.	Salomei król. polsk. p.	5 Hałaktyona mucz.
18 P.	Pośw. Kość. Rz. i Grzeg.	6 Pawła archiep.
19 S.	Elżbiety król. i Placydy	7 MM. 33 w Melyty
20 N.	25 po S. Feliksa de Val. ☾	8 N. 24 po S. Mychajła archan.
21 P.	<i>Ofiarowanie N. Maryi P.</i>	9 Onysyfora mucz.
22 W.	Cecylii panny m.	10 Szesty apost.
23 S.	Klemensa i Lukrecyi	11 Myny mucz.
24 C.	Jana od Krzyża i Flory	12 Joanna Myłostyw.
25 P.	<i>Katarzyny panny męcz.</i>	13 Joanna Złatoust.
26 S.	Piotra Aleks. i Konrada	14 Pyłypa apost. <i>Zapust.</i>
27 N.	1 Adw. Waleryana bisk.	15 N. 25 po S. Hurya i Samon m.
28 P.	Rufina m. i Grzegorza ☸	16 Matftea jewanh.
29 W.	Saturnina i Illuminaty p.	17 Hryhoria jep.
30 S.	<i>Post. Andrzeja apostoła</i>	18 Platona mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

15 — 1 Kislev.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 6 g. 3 m. 27 popoł.

☾ dnia 20 g. 6 m. 5 popoł.

☾ dnia 14 g. 1 m. 20 rano.

☾ dnia 28 g. 5 m. 39 rano.

Grudzień.

Dekabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	Eligiusza i Natalii wd.	19 Awdya proroka
2 P.	Post. Aurelii i Chryzol.	20 Prokla i Hryhory
3 S.	Franciszka Ksawer. w.	21 Wchod. Pr. Bohorodcy
4 N.	2 Adw. Barbary p. m.	22 K. 26 po S. Fyłymona apost.
5 P.	Sabby op. w. i Kryspiny	23 Amfylochya jepisk.
6 W.	Mikołaja b. i Leoncyi ☾	24 Jekatyryny mucz.
7 S.	Wigilia. Ambrożego b.	25 Klymenta papy
8 C.	Niepok. Pocz. N. Maryi P.	26 Ałpyya prepod.
9 P.	Post. Leokadyi i Waleryi	27 Jakowa mucz.
10 S.	N. Maryi P. Łoretanckiej	28 Stefana mucz.
11 N.	3 Adw. Damazego pap.	29 N. 1 Adw. Paramona mucz.
12 P.	Aleksego i Pawła	30 Andrea apost.
13 W.	Łucyi i Otylii p. ☾	1 Dekabr. Nauma pr.
14 S.	Such. Nikazego i Spirid.	2 Awwakuma pror.
15 C.	Ireneusza m. i Waler.	3 Sofonia proroka
16 P.	Such. Euzebiusza b.	4 Warwary mucz.
17 S.	Such. Łazarza bisk.	5 Sawwy Oświaszcze.
18 N.	4 Adw. Gracyana i Olimp.	6 N. 2 Adw. Nykołaja jepisk.
19 P.	Faustyna i Nemezysza	7 Amwrosia jepisk.
20 W.	Teofila m. i Juliusza ☾	8 Patapia prepod.
21 S.	Post. Tomasza apostola	9 Zaczat. Bohoro.
22 C.	Zenona ż. m. i Honorata	10 Myny Jermoh mucz.
23 P.	Post. Wiktoryi p. m.	11 Danyła Stołpny
24 S.	Wigilia. Adama i Ewy	12 Spyridona jepisk.
25 N.	Boże Narodzenie	13 N. 3 Adw. Ewstratia jepisk.
26 P.	Szczepana pierwszego m.	14 Ftyrsa mucz.
27 W.	Jana ewangelisty	15 Jełewftesya jepisk.
28 S.	Młodzianków męcz. ☾	16 Abhea proroka
29 C.	Tomasza Kantuaryjsk.	17 Danyła proroka
30 P.	Dawida kr. i Sabina	18 Sewastyana mucz.
31 S.	Sylwestra p. i Melanii	19 Wonyfatya mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

9 — 25 Pośw. świątyni.

14 — 1 **Tebeth.**

23—10 Post. Oblężenie Jerozol.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 6 g. 11 m. 5 rano,

☾ dnia 13 g. 12 m. 43 podoł.

☾ dnia 20 g. 4 m. 21 rano.

☾ dnia 28 g. 12 m. 39 rano.

SPIS ŚRODKÓW LEKARSKICH

ZAWARTYCH

W PODRĘCZNIKU TERAPEUTYCZNYM.

- Acacia* 127.
— *anthelmint.* 952.
Acetum pyrolignos. 158, 484.
Acidum agaric. 964.
— *arsenic.* 29, 36, 228, 259, 384.
— *benzoic.* 690, 691, 787, 883.
— *boric.* 284, 309, 312, 336, 732, 734.
— *carb.* zewn. 52, 157, 298, 334, 470, 598, 818, 819, 823, 824, 1037.
— *wewn.* 49.
— *citricum* 50, 52.
— *hyperosmicum* 626.
— *lacticum* 250, 348, 498, 647.
— *muriaticum* zewn. 299.
— *wewn.* 45, 87, 141, 161, 162, 208, 218, 219, 244, 245, 246, 381, 387, 420, 497.
— *phosphoricum* 18.
— *pyrogall.* 475, 828.
— *salicylic.* 10, 23, 24, 25, 51, 57, 289, 366, 389, 399, 444, 474, 477, 480, 569, 618, 620, 745, 920, 1038.
— *sclerotin.* 536.
— *sulf.* 892.
— *tannic.* 126, 465, 488, 490, 535, 538, 735, 793, 795, 835, 885, 886, 1012.
— *thymic.* 22.
Aconiti Tra 19, 71, 144, 778, 860.
Aconitin. 707, 855, 1029.
Adonis vernalis (dec.) 799, 1053.
Adonis vern. Tinct. 1045.
Aether aceticus 34, 48, 726.
Aether sulfur. 32, 78, 101, 238, 249, 300, 468, 510, 727, 804, 881, 1029.
Aethylenum brom. 462.
Agaricin. 965.
Airol 1009.
Aloë 28, 29, 223, 711, 716, 717, 718, 721, 723.
Althaea 55, 370, 965.
Alumen 58, 126, 288, 294, 303, 337, 464, 532, 643, 1003, 1034.
Alumnol 110, 408, 487.
Ammoniae antis. liquor 100, 136, 509, 511, 651, 684, 809, 881, 1057.
— *brom.* 395, 453, 567, 575, 594, 774, 784.
— *carbonic.* 650.
— *chlorat.* 40, 152, 642, 646, 817, 941.
— *citricum.* 229.
— *sulfoichthyol.* 411, 489, 591, 672, 744, 760, 761, 763, 857, 858, 859.
Amylen. hydrat 258, 456.
Amylnitrit. 397, 914.
Amylium nitros. 397, 914.
Amylum trit. 400, 402, 589, 617, 620, 1037, 1038.
— *orizae* 104.
Analgen 630, 703.
Anthraxobin 570.
Antinervin 561, 633, 708.
Antinosin 169, 34, 3, 735.
Antipyrin 41, 350, 362, 556, 578, 696, 704, 765, 783, 878, 960, 991.


- Antispasmin* 791.
Apiolum 31.
Apocodein 140.
Apomorphin. 87, 139, 141, 209, 420, 728.
Aqua amygd. am. 641, 685, 778.
 — *calcis* 61, 318, 513.
 — *cinnam.* 492.
 — *Foeniculi* 278, 513.
 — *Goulardi* 290.
 — *Laurocerasi* 99, 115, 116, 140, 152, 317, 584, 595, 767, 770, 808, 1039, 1056.
 — *plumbi* 290.
Arbutin 334, 836.
Arenari e rubr. Extr. 323.
Argentum nitric. zewn. 62, 66, 107, 296, 306, 341, 344, 371, 455, 512, 733.
 — *wewn.* 168, 943.
Argentamin 112.
Argonin 113.
Aristol. 286, 432.
Arnicae flores 724, 1057.
Arsenic zob. Solutio arsen.
Asa foetida 5. 597.
Asaprol 853.
Atropin wewn. 436, 460.
 — *zewn.* 553, 622, 623.
Balsam copaiv. 333.
 — *peruv zewn.* 7, 416, 476, 816, 820, 874.
 — *wewn.* 127.
 — *vitae Hoffm.* 525, 866.
Belladonna inf. folia 99, 458.
 — *tra* 154, 361, 380, 437, 438, 773, 778.
 — *extract.* 72, 95, 239, 241, 257, 363, 375, 423, 451, 452, 550, 585, 603, 669, 771, 814, 815, 986, 1031.
Benzoës flores 358, 418.
Benzosol 977.
Benzonaphtol 202, 503, 1013.
Betol 330, 631.
Bismut oxyjod. 116.
 — *salicyl.* 192, 369, 376, 377, 434, 504, 517, 518, 1000, 1013, 1017.
 — *subnitric.* 119, 172, 173, 177, 247, 252, 407, 507, 574, 787, 845, 1058.
 — *valerianic.* 177, 513, 514.
Blattae orient. 692.
Borax 303, 447, 449, 523, 527, 919.
Bromalin 461.
Bromoform 785.
Butylechloral 700.
Cacti grandiflori 795, 1044.
Cadmium sulf. 114.
Calcium carbonic. 214, 295, 927.
 — *oxyd.* 831.
 — *phosphoric.* 39, 843, 844.
Calomel. 82, 272, 278, 365, 394, 430, 499, 552, 637, 663, 739, 743, 817, 931, 936.
Campechu lign. 195.
Camphora zewn. 11, 450.
 — *wewn.* 47, 102, 125, 249, 253, 254, 299, 326, 347, 465, 470, 724, 725, 810, 999, 1003, 1005.
 — *do wstrzyk.* 32, 882.
Cannab indic. zewn. 327.
 — — *extr.*
Cantharidum tra 26, 29.
Capsici annui. tra. 20, 22, 27.
Cascara Sagrada 710, 713.
Cascarilla 390, 1014.
Castoreum 14, 171, 595, 596, 597, 915.
Chinae dect. 44, 154, 492.
Chinin. ferrocitr. 233, 252, 266.
 — *hydrobrom.*
 — *mur.* 40, 244, 555, 567, 564, 566, 605, 607, 608, 655, 656, 697, 877, 989, 996, 999.
 — *sulf.* 543, 723, 787, 885, 998.
 — *tannic.* 377, 436, 516, 884.
Chloralamid 15.
Chloralhydrat. wewn. 3, 12, 19, 260, 279, 360, 391, 392, 654, 662, 666, 806, 1005, 1035.
 — *zewn.* 64, 164, 598.
Chloroform wewn. 12, 176, 579, 693, 1019.
 — *zewn.* 71, 798, 825, 864, 865, 866, 867, 945.
Chrysarobin 21, 477, 550, 829, 830.
Cinae semen. 83.
Cocain zewn. 98, 167, 175, 305, 315, 325, 585, 623, 775, 826, 1030.
 — *wewn.* 240, 215, 246, 578, 581, 582, 779, 812, 983.

- Codein* 117, 145, 170, 346, 351, 682, 782, 1024, 1025.
Coffein citric. 180.
 — *natr. benz.* 428, 511, 555, 556, 560, 686, 753, 991, 992, 999, 1049.
Colchicum wewn. 79, 860.
Collodium 300.
Colombo radix 514, 969, 970.
 — *extract.* 501.
 — *tra* 390, 1014, 1016.
Coloquint. extr. 721.
Condurango 164, 165, 166.
Convallaria maj. tra 185, 685, 1044.
 — *infus.* 1049.
Cortex peruv. 610, 797, 892, 922.
Coto Tra 505.
Cotoinum 294.
Creolin 111, 159, 285, 481.
Creosot zob. Kreosotum.
Cuprum arsenic. 37.
 — *sulfuricum* 307, 640, 924.
Curare 454, 961.
Datura Stram. 99.
Dermatol 104, 404, 405, 406.
Diaphtherin 862.
Digitalis infus. 274, 428, 430, 748, 751, 889, 1040, 1042.
 — *pulv.* 422, 543, 753.
 — *tinct.* 184, 185, 1041.
Diuretin 183, 273, 688, 890, 1047.
Doveri pulv. 142, 210, 376, 507, 516, 517, 518, 965, 966.
Duboisin. 624.
Emplastr. dyachyl. 413.
 — *hydrarg.* 925.
 — *saponat.* 925.
Equisetum decoct. 752, 891.
Ergotin wewn. 238, 543, 659, 894.
 — *zewn.* 541.
Eserin 528.
Eucalyptus infus. 612.
 — *tinct.* 51, 614.
 — *oleum* 147.
Eudoxin. 199.
Euphorin 559, 628, 854.
Europhen 115, 283, 431, 432.
Exalgin 269, 698, 861, 918.
Extr. haemost. 539.
Ferrum acet. 680.
 — *albumin.* 35, 232.
Ferrum arsenicosum 229.
 — *carbon. sacchar.* 225, 268, 386, 656.
 — *jodatum sacchar.* 900, 939.
 — *lacticum* 230, 686, 844.
 — *oxyd. dial.* 228.
 — *sacchar.* 226.
 — *pomat. tra* 220, 259, 381, 385.
 — *pulverisat.* 223.
 — *pyrophosphoric.* 840, 842.
 — *reductum* 36, 224, 227.
 — *sesquichlor.* 53, 160, 463, 531, 887, 895, 923, 1002.
 — *sulf. pur.* 221, 222, 723.
Ferratin 235, 432, 566, 615.
Ferropyrin 237, 888.
Filix mas. 947, 948, 950, 951, 954.
Flores sulf. zewn. 7, 23, 54, 831, 832, 872.
Formalin 127, 486.
Gelatina alb. 762.
Gelsemii extr. 702.
Gentian extr. 16, 36, 226, 353, 940.
 — *pulvis* 564, 940.
Gossypii extr. 677.
Guajacol 976.
Guajacol carbon. 975.
Gutti 422, 721.
Haemol 234.
Haemogallol 236.
Hamamel 554, 678.
Herniariae herb. 122, 320.
Hydrarg. bichlor. 313, 443, 648, 818, 928.
 — *chlorat zob. Calomel.*
 — *peptonatum* 930.
 — *pp. flav.* 573, 638, 743, 926, 932.
 — *pp. alb.* 292, 296, 446, 447, 572, 833.
 — *protojod.* 934.
 — *salicyl.* 933.
 — *sozodol.* 930.
 — *tannic.* 935.
Hydrast. extr. fluid. 359, 542, 671, 967.
Hydrast. hydrochlor. 676.
Hydrastinin 540.
Hydroxylamin 658.
Hyosciamin 966.
Hyosciami 99, 143, 153, 328, 361, 425, 459, 543, 641, 683, 693, 723, 730, 731, 781, 798.

- Hyoscin* 271.
Ichthyol 109, 411, 466, 468, 489, 571, 591, 672, 744, 760, 761, 764, 857, 858, 859.
Ipecacuanh. inf. 134, 204, 424, 639, 644, 649, 684, 808.
Jaborandi 687.
Jalapa 83, 717, 721, 722.
Jod 657, 758, 759, 792, 802.
Jodoform wewn. 84, 354.
— *zewn.* 281, 282, 300, 316, 550, 661, 747, 763, 772, 803, 856, 1007, 1058.
Jodol 746.
Juglandi fol. 515.
Juniperus inf. 275, 687, 750.
Kali aceticum 751.
— *arsenic.* 899.
— *bromat.* 14, 188, 360, 362, 395, 453, 457, 567, 575, 594, 653, 811, 1034.
— *carbon.* 221, 222, 445.
— *citricum* 893.
— *chloricum* 42, 49, 56, 57, 67, 155, 524, 644, 648, 650, 921, 922, 927, 1033.
— *hypermag.* 30, 59, 108, 156, 295, 337, 522, 908.
— *hydrojod.* 88, 94, 657, 802, 938.
— *jodat. int.* 261, 276, 664, 792, 1052.
Kamala 948.
Kosso 949.
Kreosotum wewn. 491, 500, 580, 790, 801, 903, 904, 905, 906, 907, 971, 972, 973, 974.
— *zewn.* 293, 488.
Lac sulfur. 473.
Lactophenin 963, 993.
Lanolin 681, 876.
Laudanum 2, 55, 58, 191, 192, 193, 195, 196, 251, 252, 304, 398, 537, 766, 934, 935, 1004.
Liquor Ammoniac anis. 100, 136, 509, 511, 651, 684, 809, 881, 1057.
— *alumin. acet.* 373, 433.
— *Burrowi.* 401.
— *kali acet.* 274, 428, 750, 889, 891.
Lithium benzoic. 352.
— *carb.* 74, 86, 736, 737.
— *chlorat.* 800.
— *jod.* 73.
— *salicyl.* 357.
Lobelia 912, 1056.
Lobelin. 96.
Lupulin 125, 254, 255, 321, 810, 837.
Lisidin 76.
Magnes. carb. 173, 214, 217, 227, 715, 869.
— *salicyl.* 994, 1001.
— *usta* 213, 389, 600, 618, 1021.
Medul. ossium 299.
Menthol 129, 131, 242, 494, 563, 583, 599, 820, 821, 869.
Migraenin 568.
Morphium mur. 86, 133, 138, 139, 172, 190, 197, 211, 215, 240, 324, 375, 420, 531, 539, 545, 552, 553, 643, 706, 767, 814, 978, 1023, 1026.
Moschus 396, 729.
Myrtol 132, 150, 495.
Naphtalin 200.
Naphtol 11, 448, 472, 578, 579, 740, 871, 875, 1000, 1001, 1012.
Natr. arsenic. 656, zresztą zob.
Sol. ars. Fowl.
— *benzoic.* 80, 144, 278, 493, 500, 809.
— *biborac.* 213, 214, 352, 444, 919.
— *bicarbon.* 84, 120, 133, 138, 145, 206, 217, 378, 574, 736, 737, 863, 869, 1018, 1021, 1022, 1024.
— *bromatum* 125, 260, 262, 345, 391, 437, 453, 567, 575, 594, 665, 685, 774, 1005.
— *chlorat.* 800.
— *jodatum.* 154, 634, 665, 863, 940.
— *nitros.* 93, 913.
— *phosphor.* 738.
— *salicyl.* 44, 60, 241, 243, 331, 367, 368, 558, 590, 602, 701, 797, 839, 879, 880, 990.
— *sozodol.* 54.
— *sulph.* 243, 602, 1018.
Nitroglycerin 186, 187, 1050, 1051.
Nosophen 105, 287, 414, 621, 734, 869, 979, 1008.

- Nux vom.* 18, 39, 162, 177, 224,
 386, 438, 595, 603.
Oleum cajeputi 179.
 — *camphor.* 33.
 — *Eucalypti* 147, 655.
 — *fagi* 416, 469, 832, 872.
 — *jecor. Aselli* 816, 846, 847, 849,
 897, 902, 907.
 — *Lavandulae* 875.
 — *lignum Sant.* 332, 834.
 — *lini* 280.
 — *oliv.* 242.
 — *Pini* 469.
 — *ricini* 81, 951.
 — *rusci* 415, 473, 816.
 — *terebinth.* 46, 69, 129, 149, 238,
 333, 423, 496, 545, 591, 636.
Opium wewn. 2, 55, 58, 99, 317,
 319, 352, 366, 530.
 — *extr. aq. wewn.* 94, 99, 200,
 670, 730, 731.
 — *tinct.* 2, 55, 58, 174, 244, 246,
 247, 248, 519, 532, 537, 835,
 860, 968, 969, 980, 981, 1012,
 1017.
 — *zewn.* 94, 256, 299.
 — *czopki* 1, 363.
Orexin 383.
Papain 207, 387.
Papayotin 387.
Paraldehyd 89, 660.
Pasta guarana 562.
Pelletierin. 955.
Pepsin 161, 219, 224.
Phenacetin 557, 560, 606, 992.
Phenocoll. hydrochl. 609, 854.
Phosphor 848, 849, 850, 851.
Physostigmin 260.
Pilocarpin 45, 355, 529, 649, 650,
 959.
Piperazin 77.
Piperin 655.
Plumb. acet. 117, 291, 311, 314,
 467, 478, 479, 546, 551, 968,
 1004.
 — *cryst.* 294.
 — *tannic.* 322.
Podophyllin 603, 716, 720.
Polyg. Seneg. 651, 809.
Propylamin 267.
Pulv. Doveri 142, 201, 376,
 507, 516, 517, 518, 965, 996.
Pulv. Liquiritiae comp. 547.
Punic. granat. 946, 947.
Quebrachin 427.
Quebracho extr. 85, 426.
Ratanh 196, 526.
Resorcin 11, 24, 50, 90, 166, 192,
 208, 289, 342, 417, 502, 506,
 571, 613, 768, 910, 1013, 1015.
Rheum 82, 223, 370, 378, 600, 710,
 712, 715, 716, 718, 719, 721,
 902.
Sabina 288.
Sal. amar. 68.
 — *ammon.* 642.
Salep dect. 995.
Salipyrin 605, 852, 962.
Salol 78, 106, 123, 191, 329, 369,
 504, 518, 632, 745, 838.
Salophen 629, 854.
Santonin 81, 82, 741.
Sapo medic. 717.
 — *virid.* 11, 832, 872.
Sarsaparilla 863.
Scilla 102, 422, 750, 752, 799.
Scopolamin 625.
Secale corn. 6, 63, 66, 533, 535,
 537, 549, 674, 675, 810.
Semen lini 121, 124, 317.
Senega 651, 809.
Sol. ars. Fowleri 228, 259, 384,
 565, 566, 610, 611, 615, 699,
 827, 863, 944.
Solveol 485.
Somnal 592.
Sozodol 794.
Sparteïn 182, 754, 1048, 1054.
Spirit. camphor. 7.
 — *sapon. kalin.* 7, 868.
Stibium sulf. aur. 421, 422, 725.
Stramonium 99, 361.
Strontium 213, 380, 689, 953.
Strophantus 184, 429, 749, 1043.
Strychnin 17, 70, 173, *tinc.* 174,
 439.
Strychnos nux. 18, 39.
Styrax 874.
Sulfonal 13, 263, 790, 957, 1036.
Sulfur praecip. 7, 8, 10, 11, 23,
 25, 54, 449.
 — *sublim.* 7, 23, 54, 831, 832, 872.
Syrup ferri jod. 898.
 — *Senegae* 136.

- Talcum* 449, 590, 618.
Tamarind. 709.
Tannin. 126, 197, 200, 308, 321, 326, 372, 488, 490, 519, 525, 530, 535, 538, 586, 745, 793, 795, 835, 885, 886, 955, 1012, 1058.
Tannalbin 521.
Tannigen 203, 520.
Tartar. stib. 205, 640, 652, 709.
Terpinhydrat 145, 780.
Terpinol 130, 419, 493.
Theobromin sal. 183, 273, 1047.
Thymol 22.
Tilia flor. 1033.
Tinct. absynth. 382, 491.
— *Aconiti* 19, 71, 144, 778, 860.
— *amara* 218, 385.
— *Bestuscheffi* 492.
— *Cacti glandiflor.* 752, 1044.
— *Calabarica*
— *calami aromat* 902.
— *Cantharid.* 26, 69.
— *capsici* 20, 22, 27, 807.
— *Chin. compos.* 163, 220, 244, 611, 896, 902.
— *cinnam.* 247, 679.
— *ferri acet.* 680.
— *ferri pomat.* 565, 827.
— *gallarum* 526, 759.
— *haemostiptica* 534.
— *jodi* 20, 52, 63, 579, 758, 759.
— *Lobeliae* 86, 94.
— *myrrhae* 43, 49.
— *Neri. Oleandri* 756, 1045, 1055.
Tinct. Nuc. vomic. 162, 163, 206, 216, 244.
— *rhur. arom.* 441.
— *stramonii* 88.
Trif. fibrin extr. 601.
Trional 593.
Traumaticin 830.
Tumenol 407.
Tussol 786.
Unguent. diachyl 412.
— *emolliens* 10, 24, 416, 417, 833, 855.
— *hydragr.* 638, 645.
— *kali jodati* 985.
— *Wilsoni* 820.
Urethan 279, 393, 667, 958.
Uvae ursi 320.
Valeriana tinct. 171, 179, 189, 244, 248, 251, 265, 345, 361, 459, 597, 726, 804, 912, 915.
Veratrin tinct. 181, 695, 706, 796, 867.
Viburn. prunif. extr. 3, 4, 362.
Vinum. stibiat. 86, 102, 137.
Zincum ferrocyan. 178.
— *oxyd.* 9, 10, 104, 265, 268, 400, 405, 409, 410, 446, 459, 620, 916, 917.
— *sozodol* 742.
— *sulfocarb.* 118.
— *sulfuric.* 118, 309, 480, 482.
— *valerianic.* 264.
Zinci flores 916, 917.



Konstantego Wiszniewskiego

Aptekarza w Krakowie

Telefon Nr 31.

Wyroby farmaceutyczno-lekarskie:

Kołaczyki (Tabletki) z wyciągiem Kaskarowym

polecane przez Tow. lek. Krak.

Jako lek przeczyszczający odszczególnia się od innych środków zawierających aloes, że nie sprawia bólu i nie osłabia, a pobudza apetyt.

Zażywać można trzy razy dnia po 1, 2 do 3 kołaczyków jednorazowo.

Zażywa się: położywszy na język kołaczyk popija się wodą i połyka, nie czuje się smaku i obędzie się bez opłatka. Kołaczyki składają się z ekstraktu kaskarowego i kremortartary, tym to składnikom zawdzięcza ten preparat tak wyborny skutek.

Zawsze na składzie kołaczyki z ferratyny, samej lub z Fowlerem po jednej kropli; także Rabarbarowe, chinowe, sodowe, z bromku sodu węglanu litowego, guajakolu, Hydrastiny, żelaziste, burzące i tabletki Emskie na kaszel.

Piwo z ekstraktem słodowym, oraz ekstrakt słodowy gęsty, w słoikach.

Oryginalne przyrządy Soxhleta

do wyjaławiania mleka dla osesków.

Również rozmaite

wina lecznicze

wyrabiane na starej Maladze i winie Lacrima Christi.

Na składzie jest także

koniak leczniczy stary w całych i pół-butelkach.

Także wina:

Malaga, Lacrima Christi i Bold Cherry.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.

Polecone
przez Towarzystwo lekarskie w Krakowie

Mleko wielokrotne krakowskie

oraz

mleko dla niemowląt

prof. dra Gaertnera

wyłącznie wyrabia

E. DOBRZYŃSKA.

Składy w Krakowie.

- 1) Mleczarnia E. Dobrzyńskiej, Sławkowska 12.
- 2) Taż mleczarnia, plac WW. Świętych 10.
- 3) Droguerya „pod czarnym wilkiem“ Zopotha, Sienna 12.
- 4) Skład optyczny J. Lańskiego, róg ul. Krakowskiej i Dietla 43.

W Podgórzu.

Droguerya Żarskiego.

We Lwowie.

O otwarciu i miejscu rozsprzedaży ogłosi
się później.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.



Podręcznik terapeutyczny

zestawiony z współpracownictwem

pp. kol. DrDr. Baurowicza, Borzęckiego, Cerchy,
Murdzińskiego, Różeckiego, Sroczyńskiego,
Surzyckiego.

Abortus (Poronienie).

Jeżeli poronienie nawykowe, wykazać przyczynę. Jeżeli przyczyną była, leczenie przeciwkłowe nawet podczas ciąży, jeżeli jakieś cierpienie macicy, leczenie takowego, jeżeli choroby góraczkowe, należy zwalczać gorączkę. Strzedz chorej w okresie, w którym poprzednio roniła, i w okresach miesięczkowych, szczególnie w pierwszej połowie ciąży. Usunąć wpływy szkodliwe, podnoszące działanie tłoczni brzusznej, zabronić spółkowania, nadmiernego ruchu, trzęsącej jazdy i t. d. Wolne swobodne ubranie. — Unikać u osób krwistych czynników podniecających, napojów wysokowych, silnych wrażeń. W razie krwawienia podczas ciąży, gdy nie odchodzą skrzepy krwi, i przy badaniu jaja wyczuć nie można, leczenie wstrzymujące poronienie i spokój.

1. *Extr. Opii aquosi 0·10,*
But. Cacao q. s. ut f. l. artis
Suppositoria ad anum Nr.
quinque.

S. Rano i wieczorem czopek (i częściej).

2. *Tinct. Opii simpl. 1·00.*

S. 20—25 kropel rano i wieczorem w lewatywie.

W ostatnim czasie polecano też:

3. *Extr. fluid. Viburni prunifol. gtt. 10,* w połączeniu z 0·50 chloralu, dopóki bóle nieustaną.

W następnych dniach:

4. *Ammon. bromat. 15·00,*
Extr. fluid. Viburn. 20·00,
Aqu. dest. 120·00.

S. 2 razy dz. łyżeczkę.

Polecają-też włoscy autorowie *Asa foetida* tak w razie groźnego jak i nawykowego poronienia, w pierwszym razie daje się 3 razy dziennie lewatywę z 3 łyżek wody i do tego 15—20 kropli *trae asae foetidae*, w drugim razie należy podawać w pigułkach:

5. *Gummi resinae asae foetidae*
6·0. f. l. a. pilul. sexaginta.

S. 2 pigułki dziennie i powoli aż do 10 na dzień i znowu zmniejszać do dwóch, aż do porodu.

Gdy nie ma już nadziei utrzymania ciąży: środki pobudzające czynność porodową: zimne okłady na brzuch, wstrzykiwania do pochwy rozcyznami środków przeciwgnilnych (kwas karbolowy 3%, Creolina 1—2%). Gdy jajo wystąpiło z jamy do szyi macicy, można podać sporysz.

6. *Extr. secal. cornut.* 2'00,
Aqu. cinnam. 90'00,
Syrup. cinnam. 10'00.

MDS. Połowę na raz zażyć,
 a w razie potrzeby drugą
 połowę w 2 godziny.

Gdy krwawienie znaczne, za-
 tamponowanie pochwy najpierw
 gazą jodoformową, poniżej zaś
 tamponami z waty, napojonemi
 gliceryną. (Zmienić za 6—10 go-
 dzin i przestrzyknąć pochwę).
 Jeżeli zachodzi możebność usunię-
 cia jaja w całości, szczegól-
 niej, gdy odchody cuchnące, usu-
 nąć takowe zabiegiem ręcznym.

W razie krwawienia skutkiem
 pozostania resztek z jaja pło-
 dowego w macicy — wyskroba-
 nie tychże tępą łyżeczką. Po-
 stępowanie przeciwnilne.

Acne rosacea.

Uwzględnić przyczynę cier-
 pienia: zboczenia w narządzie
 rodnym u kobiet, błednica, nad-
 używanie napoi wysokowych.
 W okresie początkowym (zaczer-
 wienienie skóry, rozszerzenie
 naczyń) polecić na noc przy-
 kładanie Empl. hydrargyri; na-
 czynia porozszerzane doprowa-
 dzić do obliteracyi przez ska-
 ryfikacye. — W okresie później-
 szym, kiedy nastąpi przerost
 tkanki łącznej w postaci guzków,
 nierówności (Rhinophyma) usunię-
 cie ich łyżeczką ostrą, ter-
 mokauterem.

Acne vulgaris.

Starać się usunąć przyczynę
 choroby, jaką bywają przewle-
 kłe nieżyty żołądka i kiszek,
 u kobiet zboczenia w narządzie
 rodnym (anti-retroflex. uteri etc.)

Miejscowo: nacięcie ropni gru-
 czolowych, wyciskanie zaskór-
 niaków (chwilowy odczyn w po-
 staci obrzęku i zaczerwienienia
 skóry przemija wkrótce przy o-

kładach z *Liquor Burovii*). Kiedy
 usunięte zostały zropiałe gru-
 czoly, polecić zmywanie wie-
 czorem miejsc zajętych c. Sapo-
 naphthol-sulfuricum, następnie
 wecieranie na noc:

7. *Sulfur. citrini* 10'00,
Spirit. sapon. Kal. 20'00,
Spirit. lavandulae 60'00,
Balsami peruviani 1'50,
Spirit. camphor. 1'00.
Olei bergamottae gtt. V.

S. Zewnętrznie.

lub

8. *Lactis sulfuris* 10'00,
Spirit. vini gallici 50'00,
Spirit. lavandulae 10'00,
Glycerini 10'00.

S. Zewnętrznie.

Z rana po usunięciu pasty,
 środki osłaniające, puder.

9. *Zinci oxydati* 10'00,
Ungu. emoll. 50'00.
Olei rosarum gtt. V.

cienko nasmarować, następnie
 puder. Polecają rano zmyć.

10. *Acidi salicyl.* 0'30,
Sulfuris praecip. 0'70,
Zinci oxydati 0'30,
Vaselini 20'00,
Olei amygd. dulcium 10'00.

S. Na noc wetrzeć masę.

11. *Naphtol* 0'30,
Camphorae 0'30,
Resorcini
Saponis virid. āā. 0'50,
Sulfuris praecip.
Cretae albae āā. 0'20,
Vaselini 30'00.

S. Masę.

Pospelow poleca przy *Acne*
 faciei: mięsienie palcami miejsc
 zajętych, robiąc takowe wieczor-
 em i rano po 15—20 minut u-
 żywając jako tłuszczu np. maści
 borowej, po skończonem posie-
 dzeniu puder.

Agrypnia (Bezsenność).

Uwzględnić przyczyny: Anaemia, Hysteria, Neurastenia, Dyspepsia (zwłaszcza u dzieci przekarmienie) i t. d.

Przy anaemii na wieczór wino, piwo, przy nawalach derivantia, letnie kąpiele, odpowiednia dyeta, unikanie męczącej umysłowej pracy, wczesne jadać wieczór itd. Gdy te środki nie pomagają;

12. Chloralhydrat 3—5'00,

Aq. dest. 100'00,
Succi liquir 20'00,
Chloroform gtt. 3.

MDS. Połowę na raz, drugą za 1/2 godziny.

13. Sulfolali 1'00,

Tal. dos. 5.

S. Na godzinę przed spaniem proszek z herbata lub rosółem, w godzinę drugi. (Przy dłuższem używaniu intoxie!)

14. Kali bromati 0'25,

Castor. canad. 0'05,
Sacchari 0'30,
Mfp. tal. dos. 10.

S. 3 proszki dziennie (A. na tle nerwowem).

15. Chloralamid 3'00,

Aqu. dest.
Syr. simpl. āā. 30'00.

DS. Na noc zażyć.

16. Hyoscini hydrojodici 0'01,

Extr. Gent. q. s. ut. f. pill.
N. 50.

S. Na noc 2—3 pigulek.

Polecony też bywa przetwór Bromidia 2—3 łyżeczek na noc.

Alcoholismus.

Acutus zobacz: Otrucia.

Chronicus. Leczenie tylko w zakładach moźebne. *Tra chinac.*, *Tartar. emetic.* czasami w lżejszych stopniach pomaga:

17. Strychnin nitr. 0'05,

Aq. dest. 15'00.

DS. Do iniekcji.

Dzien. 1—2 inj. po 0'50 płynu. Równocześnie natr. brom.

18. Extr. nuc. vom. 0'50,

Spir. vini 5'0,
Acid. phosphor. dil. 10'0.

S. 3 razy dnia po 10 kropel.

Alopecia

a) areata.

Leczenie zwykle nie wywiera znacznego wpływu na skrócenie i przebieg cierpienia. Polecają wyrwać włosy w obwodzie ognisk chorobowo zajętych, wcieranie środków drażniących i przeciwgrybkowych.

19. Spiritus vini 20'00,

Tinct. aconiti 2'00.

S. Zewnętrznie.

20. Tinct. jodi 15'00,

„ *capsici* 5'00.

Lewin i Leistikoff polecają wcierania codziennie:

21. Chrysarobini 2'00,

Vasellini 20'00.

b) e seborrhoea.

(Seborrhoea capitis). Celem usunięcia strupów czapkę z opasek lub płótna, która należy napuścić oliwą. Po odpadnięciu i usunięciu za pomocą zmycia strupów.

22. Spir. vini 200'00,

Tintr. capsici 10'00,
Acidi thymolici 50'00.

S. Zewnętrznie.

Tym płynem zmywa pacjent głowę codziennie, dwa razy w tygodniu zaś zamiast powyższym płynem zmywa głowę mydłem i wodą. Po każdorazowym zmyciu głowy masć.

- 23.** *Acidi salicyl.* 10·00,
Florum sulfuris 10·00,
Vaselini 100·00.

S. Maść
 lub

- 24.** *Resorcini*
Acidi salicyl. āā. 10·00,
Ungu. emoll. 100·00.

S. Maść.

Przy tem leczeniu trwa choro-
 ba mniej więcej do 3 miesięcy.
 Zwrócić uwagę pacyenta, że
 w ciągu leczenia włosy będą wy-
 padać więcej nawet, niż przed
 leczeniem. Włosów, zwłaszcza
 u kobiet nie potrzeba strzydz
 na krótko.

c) syphilitica.

Obok leczenia ogólnego, miejs-
 cowe. Besnier poleca rano na-
 trzeć głowę:

- 25.** *Acidi salicyl.* 1·00,
Sulfuris praecip. 50·00,
Lanolini
Vaselini āā. 10·00.

S. Maść.

wieczorem po zmyciu mydłem
 i obsuszeniu natrzeć:

- 26.** *Alcoholi Rosmarini* 100·00,
Tincturae Canth. 10·00.

S. Zewnętrznie.

Amenorrhoea (Brak mie- siączki).

Badać dokładnie i szukać przy-
 czyny. Pamiętać o możebności
 ciąży. W przypadkach haema-
 tometra zabieg operacyjny. Je-
 żeli przyczyną chlorosis, scro-
 phulosis, tuberculosis, anaemia,
 polysarcia, zastosować odpowie-
 dnie leczenie, uregulować dyete
 i uważać na stolec.

W przypadkach niedostatecz-
 nego rozwoju macicy, albo
 w przypadkach nadmiernego
 zwinięcia się tejże po porodzie;
 wstrzykiwania ciepłe, elektry-
 zowania macicy, kąpiele nożne,

upusty krwi z części pochwowej,
 powtarzane w czterotygodnio-
 wych odstępach, szczególnie,
 gdy są molimina menstrualia.
 Żelazo wewnętrznie, zmiana po-
 wietrza, powietrze górskie, Kry-
 nica, kąpiele borowinowe (Mat-
 toniego sól borowinowa).

- 27.** *Trae Capsici* 3·00,
Rhumi optimi 80·00,
Mixturae gummosae 120·00.

S. Co 3 g. łyżeczkę od kawy.

- 28.** *Extr. aloes* 1·00.
Pulv. myrrhae q. s. ut f.
pill. Nr. 50.

S. 3 r. dnia 2—3 pigulek.

- 29.** *Acid. arsenic.* 0·06,
Ferri sulph. exsicc. 2·00,
Piper nigr.

Aloes.
Myrrh. āā. q. s. f. pill.

Nr. 60.

S. 2 r. dz. pigułkę po jedz.

- 30.** *Kali hypermang.* 1·00.
Butyr. cacao 1·00,
Pulv. cacao q. s. ut f. pill.
 50.

S. 3 r. dnia 1—2 pigulek, lub
 podaje się w czasie molimina
 menstrualia

- 31.** *Capsul. elasticar. tenentium*
0·002 Apioli
 Nr. XX.

S. Rano i wieczór kapsułkę zażyć
 (Baillot i Barbette).

Anaemia.

Jeżeli wystąpi wskutek krwo-
 toku lub długootrwałej choroby,
 podawać leki wzmacniające
 i podniecające, pożywna dyeta.
 W razie grożącego zapadu wino
 Sherry, Szampańskie, czarna ka-
 wa, eter, oraz: podskórne wstrzy-
 knięcie roztworu soli 0·7% w ilo-
 ści 500—700·00.

- 32.** *Aether sulphur.* 10·00,
Camphor. 1·00.

DS. Wstrzyknąć 1—2 wstrzyk.

33. Olei camphorati 10'00.

DS. Do wstrzykiwań.

34. Aether acet. 10'00.DS. 10—20 kropel co $\frac{1}{2}$ godz.

Przy dłuższej trwającej A. według wskazań: arsen (Woda Gubera), żelazo, wino, pobyt na świeżem powietrzu. Wody żelaziste, Krynica, Żegiestów, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Polecają też upust krwi (Schubert) licząc 2 grm. krwi na kilo wagi.

35. Liquor. ferri album. 50'00.

DS. 3 razy dz. łyżeczkę.

36. Ferri hydrog. reduct. 5'00,

Acid. arsen. 0'20,

Extr. gentian q. s. f. pill.

Nr. 100.

DS. 2 do 3 pigulek dziennie.

37. Cuprum arsenicosum 0'002

—0'003 pro dosi zalecają w ciężkiej A.

38. Haemoglobina po 0'20 na dzień w formie pastylek przez Dra Pfeiffiera.**39. Calcar. phosphoric 10'00,**

Haemoglobin 1'00—2'00,

Extr. Strychni 0'10,

Div. in dos. 20.

S. Dziennie 5 proszków.

Wody pyrophosforanowo-żelaziste. Zob. Chlorosis.

Angina diphtheritica.

Przedewszystkiem odłączyć chorego, dla zapobieżenia rozszerzenia tej choroby. Mieszkanie przewietrzać. Ciepłota w pokoju 14—15 R. Dyeta pożywna, rosół, bulion, jaja, galarety mięsne, wino z wodą, herbata z cognakiem itp. Dużo płynów, lemoniada, woda ze sokiem owocowym. Leczenie rozpocząć lekkim środkiem przeczyszczającym, bądź kalomel w małej dawce, bądź aq. laxativ. rheum.

Wobec miernej gorączki chinina po 0'20 do 0'50 (rano i wieczór przy wysokich stopniach: antypiryna z cognakiem, również po 0'20—0'50, parę razy dziennie. Zmywanie całego ciała wodą z octem. Zimne okłady na głowę. Na szyję okład wysychający, zmieniany co 2 lub 3 godz. Płukanie z rozczyńców: kali chloricum 2^o/_o Acid. borie. 3^o/_o. Dzieciom mniejszym przepłukiwanie gardła zapomocą strzykawki (z ostrożnością, aby podniebienia nie zranić — a w razie oporu, lepiej i tego zaniechać). Pędzlowania niezbyt często albo sokiem z cytryny, lub też Papayotin (1:20). Inhalacye co godzinę, w nocy co 2 godziny: Acid. borie. 2^o/_o, Aq. calcis na $\frac{1}{2}$ z wodą, Kali chlor. 2^o/_o, Sublimat 1:3000. Z leków do wewnątrz podawanych $\frac{1}{2}$ —2^o/_o rozczyń Kali chloricum w odwarze 5^o/_o kory chinowej. W uporezyw-szych i cięższych przypadkach, wcierania szaruchy po 2'00 dziennie w różne części ciała. Na obrzmiałe gruczoły okłady z liquor alum. acetic. Jeżeli błonica w nosie, lekkie przestrzykiwania kw. borowym 3^o/_o lub kali chlor. 2^o/_o. W razie zapadu, eter, kamfora, czarna kawa, zagrzewanie kończyn, nacierania ciepłym octem, wina mocne, wstrzyknięcie eteru. ok. camphor. Jeżeli błonica przeszła na krtań, stosować leczenie podane przy Laryng. crouposa. Powikłania jak: Nephritis (codziennie badać mocę), otitis, pneumonia, leczyć według wskazań. Przeciww porażeniom: dyeta wzmacniająca, chinina, przetwory żelaza, prąd stały. W czasie całego przebiegu zwracać uwagę: na serce, nerki i błony śluzowe.

Wobec dobrych wyników osiągniętych za pomocą surowicy przeciwbłoniczej, wobec tego, że

zapobiega ona niejako wytwarzaniu się dławca, należy ją stosować. (Patrz odnośny artykuł w niniejszym kalendarzu).

Środki podawane do wewnątrz:

40. *Chinin. muriat.* 0·50—1·50,
Ammon. chlorati 1·00,
Aq. dest. 60·00,
Syrup rubid. 20·00.

DS. 3 razy dz. łyżeczkę.

41. *Antipyrin* 1·50—2·00,
Cognaci 20·00,
Aq. destil. 80·00,
Syrup simpl. 20·00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

42. *Kali chlorici* 0·50—2·00,
Aq. destil. 80·00,
Syrup rubid. 20·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

43. *Tinct. Myrrhæ* 4·00,
Glycerini 8·00,
Aq. dest. ad 200·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

44. *Dcti cort. chinæ e* 5·00 *ad*
100·00,
Natri salicyl. 2·00,
Syrup sacchari 20·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

45. *Pilocarpin muriatic.* 0·01,
Pepsin 0·20,
Acid. muriat. dil. gtts. V.
Aq. dest. 80·00,
Syrup simpl. 20·00.

DS. Co godz. łyżeczkę (po każdej łyżeczce wino mocne).

46. *Ol. Terebinth. rectif.* 8·00,
Pulv. gum. ar. q. s.
Aq. dest. 120·00,
Syrup simpl. 20·00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę (po pić mlekiem).

47. *Camphor.* 0·30,
Mixt. gumm. 80·00,
Syrup sacchari 20·00.

DS. Co g. łyżeczkę, (zwłaszcza w formie septycznej).

48. *Aether. acet.* 5·00,
Ol. cinamom. 1·50.

DS. Co 2 godz. 3—5 kropli.

Arak co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę, aż do upojenia.

49. *Kali chlorici* 5·00,
Træ myrrhæ 15·00,
Acid. carbol. gtts. V.
Mel despum. 20·00,
Aq. dest. 150·00.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 15 kropli.

Leczenie miejscowe: Okłady z lodu na szyję (w woreczkach gumowych), pić wodę z lodu z dodatkiem wina czerwonego, lody owocowe. Później przy rozpadzie błon lub zgorzeli, przejść do ciepłych okładów i kataplazmów. Inni radzą od początku ciepłe okłady i kataplazmy co $\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{2}$ g. zmieniać, pokarmy ciepłe, płukania ciepłe.

Płukania:

Aq. calcis, Acid. salicyl. 1 $\frac{0}{10}$,
Ac. boricum 2 $\frac{0}{10}$, *Kali chloric.* 2 $\frac{0}{10}$, *Sublimat.* 1 $\frac{0}{10}$, *Thymol* $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$, *Menthol* $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$.

Pędzlowania:

50. *Solut. acid. citr. e* 10·00:
ad 50·00,

Resorcin 3·00,
Glycerin 30·00.

S. Co 2 godz. pędzlować.

51. *Acidi salicyl.* 0·50—1·00,
Spir. vini q. s.
Glycerin. 40·00,

Infus. fol. Eucalypti 60·00.

DS. Co godz. zwilżać watę zamoczoną w tym płynie, miejsca bł. zajęte.

52. *Acidi carbol. cryst.*
Acid. citric. cryst.
Træ jodi āā. 3—5·00,
Franz-Cognac 100·00.

MDS. Co 2 godz. pędzlować.

53. *Ferri sesquichl.*
Glycerin. āā. 10·00.

DS. Pędzlowanie 3 razy dz.

Wdychiwania (Inhalacye):

Para wodna

Acid. carbol. 2:500.

Kali chloric. 1 $\frac{0}{10}$.

Aq. calris āā. c. Aq. dest.

Acid. lacticum 1 $\frac{0}{10}$.

Sublimat 0·02:200·00.

Resorcin 1 $\frac{0}{10}$. *Glycerin* 1:4.

Wdmuchiwanie:

Cukier proszkowany — obficie i często.

Sól kuchenna (grubo nakładać).

Menthol 1·00. *Sacchari pulv.* 20.
2—4 razy dziennie.

Flor. Sulph., Chin. sulf. āā. 0·20
2 razy dziennie.

Jodoform co 3 godziny.

54. *Natr. sozjodolici* 10·00,

Flor. sulphur. 12·00.

Mfp. S. Do wdmuchiwań do ust i do nosa.

Angina pectoris zob. Stenocardia.

Angina catarrh. acuta.

Ciepłe płukania z nawaru korezeni ślazowych.

55. *Decoct. rad. Altheae* 200 0,
Trac. laud. simpl. gtt. XV,
Syr. moror. 20·0.

MDS. Płukanie.

56. *Kali chlorici* 5·0,
Aq. destill. 300·0,
Spir. menth. pip. gtt. II.

MDS. Płukanie.

57. *Acidi salicylici* 1·0,
Kali chlorici 2·0,
Aq. destill. 300·0.

MDS. Płukanie.

58. *Alum. crud.* 5·0,
Aq. destill. 200·0,
Trac. laud. simpl. 1·0,
Melis. rosat. 20·0.

MDS. Płukanie.

Angina phlegmonosa

otworzenie ropnia w stósownym czasie; dnia następnego

w razie objawów zatrzymania się ropy, należy zgłębnikiem, zerwać zlepiające się brzegi otworu.

Angina tonsill., catarrhalis, follicularis.

Ciepłe płukania; w przypadkach natury podejrzananej, leczenie miejscowe wycieraniami sublimatem 1:500, zapomocą krótko uciętego pędzelka, lub kawałków gąbki umocowanych na szczypczykach.

59. *Kali hypermang.* 1·0,
Aq. destill. 300·0.

DS. Woda do ust.

60. *Natri salicylici* 1·0,
Aq. destill. 200 0.

S. Płukanie.

61. *Aq. calcis* 200·0.
S. Płukanie.

W przypadkach przewłocznych dla zmniejszenia powiększonych migdałków:

62. *Arg. nitr. cryst.* 1·0,
Aq. destill. 30 0,
Da in vitr. nigr.

S. Pędzlowanie.

63. *Extr. sec. cornuti* 1·0,
Trac. jodi 4·0,
Glycerini 30·0.

S. Pędzlowanie.

64. *Hydrat. chloral.* 1 0,
Sacch. albi 10·0.
S. Do wdmuchiwań.

Aphthae. (Stomatitis aphthosa.)

Pędzlowanie 10 $\frac{0}{10}$ roztworem kali chloricum, 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$ roztworem acid. tannici, 5 $\frac{0}{10}$ Boraxem.

65. *Succi citri.*
Syrup rub. Id. āā. 10·00.
S. Do pędzlowań.

66. *Argenti nitrici* 1·00,
Aq. dest. 50·00.
MDS. Do pędzlowania.

Wewnętrznie:

- 67.** *Kali chlorici* 1'00,
Aq. dest. 80'00,
Syrup rubid. 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Uporczywie trzymające się plamy lapisować. Obok tego zimne napoje, podawanie kawałków lodu, unikanie gorących potraw.

Apoplexia s. Hemorrhagia cerebri.

Chorego położyć w łóżku okład lodowy na głowę, jeżeli osoba krwista, dobrze odżywiona i jest się obecnym prawie na początku udaru, to krew puścić (najwyżej 500 gram.) lub pijawki za uszami postawić. Nadto dać zaraz lewatywę z octu, mydła, lub soli tak, żeby nastąpiło silne przeczyszczenie; synapizma na łydki i piersi, nacieranie kończyn. Jeżeli tetno słabe i zapad jest, to podać wino, kawę czarną, kamforę, eter podskórnio. Gdy udar minął, to choremu nie pozwalać wstawać z łóżka, okład lodowy dalej mieć na głowie, stolce regulować, wody gorzkie Hunyadi Janos, Morszyńska, Saratica, dyetę płynną niepodniecającą, a ze środków wewnętrznych *digitalis* lub *Tinet.* *Strophanti* dla uspokojenia akeji serca.

W kilka tygodni po ataku, gdy reakcja zapalna minie, podawać kali jodatum, elektryzować kończyny porażone, masować, ruchy bierne wykonywać i działać zapobiegawczo, usuwając główną przyczynę udaru (najczęściej zmiany w sercu i tętnicach).

- 68.** *Inf. fol. Sennae* e 15'0
 ad 200'0.

Sal. amar.

Syr. rub. idaei āā. 25'0.

S. Co godz. łyżkę.

- 69.** *Tinct. Cantharid.* 5'0.

Ol. Terebinth. 25'0.

M. S. Do nacierań.

W zastarzałych przypadkach.

- 70.** *Strych. nitr.* 0'005,

Aq. dest. 10'0.

S. Codzień 1 strzyk. 1-gramow.

Arthritis vide Rheumatismus articularum.

Arthritis urica (Podagra).

Przedewszystkiem leczenie dyetetyczne. Ograniczenie się co do ilości i jakości pokarmów. Wolno jeść mięso chude, o ile możności białe tylko, mleko, jarzyn sporo, unikać tłuszczów i mącznych potraw niemniej napojów wysokowych. Do picia szczawowy lub zwykła woda z dodatkiem kwasu. Wskazany jest ruch na świeżem powietrzu, wycieczki w góry, gimnastyka. Ze środków wewnętrznych polecają: *Tinetura* lub *Vinum Colchici* po 10—20 kropli 3—4 razy na dzień, *Natrum salicylicum* lub *Antipyrina* 2—3 grm. p. die.

W razie silnych bólów wcierać maść z narkotykami, na wewnątrz morfinę lub podskórnio.

Następnie picie wód Giesshübler, Bilińska, Vichy, Kissingen, Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Dürkheim, Homburg, otyłym zaś osobom można polecić Marienbad, Karlsbad.

- 71.** *Chloroform* 10'00,

Aq. Colonien. 20'00,

Tr. Aconiti 40'00.

DS. Do nacierań.

- 72.** *Extr. Belladon.* 2'00,

Lanolini 20'00.

Mf. ung. DS. Wcieranie.

- 73.** *Lithii jodat.* 0'25,

Extr. et pulv. gent. āā. q. s.
f. pil. 20.

S. 3—4 pig. dziennie.

- 74.** *Lithii carbonici* 0·10,
Sacchari 0·20,
Mfp. d. tal. dos. 20.
 S. 3 pr. dziennie.
- 75.** *Natrii lithiosqlcyl* 1·00,
D. tal. dos. XII.
 S. 3—4 pr. dziennie.
- 76.** *Solut. Lysidini* 50% 10·0,
Aq. destillat. 200·0
in vitr. nigr.
 S. 2—6 łyżek dziennie w wodzie alkalicz. zażyć.
- 77.** *Piperazin* po 0·25 na dawkę, dziennie 1—3 gram. (najlepiej w wodzie sodowej; drogi).
- 78.** *Salol*
Aether āā. 4·00,
Collodii 30·00.
 S. Pędzlować miejsca bolesne.
- 79.** *Colchicini* 0·02,
Estr. Gent. q. s. ut f. pil. N. 40.
 S. 3—5 pigułek dziennie.
 Przy białkomoczu:
- 80.** *Extr. stigmat. maidis* 6·0,
Natri benzoici
Lithii carbonici āā. 3·0,
Ol. anis. gtt. duas
f. pill. Nr. 60.
 S. 2 pigułki przed obiadem. przez 20 dni każdego miesiąca.
- Ascaris lumbricoides.**
 Zabraniać pokarmów mącznych, natomiast mleko, mięso.
- 81.** *Santonin* 0·15 (—0·20).
Ol. ricini 50·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.
- 82.** *Santoni* 0·03,
Calomel. 0·05,
Pulv. rad. rhei 0·15,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 6.
 S. Rano i wieczór proszek.
- 83.** *Pulv. sem. cinæ* 4·00,
Pulv. rad. Jalap.
Sacchari āā. 2·00,
Mfp. divid. in dos. Nr. 4.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. proszek.

Po użyciu tych środków, do-
 brze jeszcze dawać duże lewa-
 tywy z wody, lub Sublimatu
 (1:2000).

Thymol. 0·10—0·30 pro dosi.

- 84.** *Jodoform* 0·03,
Natri bicarb. 0·25,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 5.

S. 3 razy dz. proszek.

(Na drugi dzień *Ol. ricini*).

Asthma bronchiale.

Przedewszystkiem należy usu-
 nąć przyczynę (np. polipy w no-
 sie, choroby kobiece).

Podezas samego napadu, cho-
 rego rozebrać, (zwłaszcza zdjąć
 stanik lub gorset), umieścić go
 w przestronnym pokoju, gdzie
 dobre świeże powietrze. Naj-
 prędzej działać narcotica, podać
 więc na wewnątrz albo Chloral-
 hydrat 2·00 na raz, lub wstrzyk-
 nąć morfinę. Mniej pewnie dzia-
 ła morfina na wewnątrz. Polecieć
 choremu podczas napadu mocną
 czarną kawę wypić, gorące o-
 kłady lub synapizma na klatkę
 piersiową i łydki. Kilka kropli
 Amylnitritu do wdechania, lub
 Pyridyn na spodeczek wylać i
 tem oddychać, używają też pa-
 pierosów z tytoniu według re-
 cepty Nr. 99 podanej przez
 Trousseau. Polecają też Jodka-
 lium w dawkach 1—3·00 na dzień,
 lub Extr. Quebracho. Jeżeli nar-
 coticum nie może być podane
 a wśród napadu słyhać liczne
 rżenia, świsty i furezenia, to
 podać należy emeticum n. p.
 apomorfine podskórnio lub na
 wewnątrz. W ciężkich napadach
 można się uciec do narkozy chlo-
 roformowej. Po przejęciu napadu
 leczyć chorobę główną i pozo-
 stały zwykle po napadzie niezbyt
 oskrzelowy, odpowiedniami środ-
 kami.

85. *Extr. fluid. Quebr.* 25'00.

DS. 2—3 łyżeczki dziennie.

86. *Vini stibiati.*

Tinct. lobel. infl. āā. 5'00,

Morph. mur. 0'10.

DS. 3 r. na dz. po 15 kropel.

87. *Apomorphin chlor.* 0'05,

Acidi hydrochl. dil. gtts. X

Aq. menth. pip. 50'00,

Syrup 20'00.

MDS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ łyżeczki

88. *Kali jodati* 10'00,

Tinct. Stram. 8'00,

Extr. liquir. 4'00,

Syrup Scill. 30'00,

Aqu. dest. 250'00.

S. 3 r. dz. łyżkę w szklance wody.

89. *Paraldehyd* 2'00—3'00,

Aq. destill. 100'00.

Syr. simpl. 20'00.

S. Na 2 razy użyć w przeciągu $\frac{1}{2}$ godziny.

90. *Resorcini p.* 1'00,

Aq. destill. 85'00,

Syrup cortic. aurant. 15'00.

S. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżkę.

W razie napadu:

91. *Chloral. hydrat.* 3'00.

Syr. simpl. 30'0.

DS. Na raz zażyć.

92. *Amylnitrit.* 5'00,

Ol. foenicul. 10'00.

S. W napadzie 2—5 kropel nałożyć na chustkę i wdychać.

93. *Natri nitrosi* 2'00,

Aq. dest. 120'00.

DS. 4 r. na dz. łyżeczkę.

94. *Kali jodati*

Tinct. lobel. infl. āā, 10'00,

Extr. opii 0'10,

Aq. destil. 180'00.

DS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ łyżki.

95. *Extr. Bellad.*

Pulv. Belladon. āā. 0'30,

f. pil. Nr. 30.

Na wieczór 1—2 pigulek.

96. *Lobelin* 0'01,

Extr. liquir. 5'0,

f. pill. Nr. quinque.

S. Co 2 godz. pigułkę.

Radzą też w początku napadu, pędzlować w głębi nosa;

97. *Tinct. Naregamiae*

Aq. lauroceras. āā. 10'00.

S. 2—3 razy dnia po 10 kropli.

98. *Cocain* 1'00,

Aq. dest. 20'00.

DS. Do pędzlowania.

99. *Folior. Belladon.* 0'3,

— *Hyoscym.* 0'15,

— *Stram.* 0'15,

Extr. Opii aquos 1'5,

Aq. laurocer. 0'5.

MDS. Jako tytoń do papierosów.

Atelectasis pulmonum.

U noworodków ciepła kąpiel zimne polewanie i nacieranie ciała. Dzieci takie należy często nosić, budzić ze snu, i co godzinę karmić. Obok świeżego powietrza, ogrzewać (gorącymi flaszkami w pościeli). U starszych uwzględnić przyczynę: osłabienie po wyczerpujących chorobach, biegunkach, krzywicy, ugniot przez wysięk w płucnej, niezbyt w drobnych oskrzelach. W tym ostatnim przypadku, środki wymiotne, wino, cognac, łyżeczka herbaty z paru kroplami rumu.

100. *Liquor. ammon. anis.* 1'00,

Aq. destil. 50'00,

Syrup Sacchari 15'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

101. *Aetheris sulfur.* 10'00.

DS. Jedną lub 2 krople we wodzie.

102. *Vini stibiati*

Oxym. Scillae āā. 15'00.

S. Co 10 minut łyżeczkę aż do wymiotów.

103. Camphorae rasae 0·10,*Tinct. gumm. 50·00.*

S. Co godz łyżeczkę.

Balanitis v. Balanopostitis.

Obmywanie żołądki i wewnętrznej powierzchni napletka kilka razy dziennie n. p. $3\frac{0}{10}$ rozezynem kwasu borowego, $1\frac{0}{4}$ azotanu srebrowego itp. i zasypywanie np.:

104. Zinci oxydati*Amyli puri**Dermatoli āā. 10·00.*

S. Zasyпка.

105. Nosophen 5·0.

S. Do zasypywań.

Przy równoczesnej phimosis częste przepłukiwania robione pod napletek powyższymi rozezynami.

Skoro jednak napletek silnie obrzęknie, przepłukiwania są bardzo bolesne, a z ujścia napletka wydobywa się ciecz surowicza ropna, cuchnąca, zachodzi obawa zgorzeli — przeciąć napletek w linii środkowej, grzbietowej pręcia na sondzie rowkowanej.

Blennorrhoea neonatorum

(zob. Conjunct. blen.).

Blennorrhoea urethrae

a) acuta anterior.

Leczenie poronne (Neisser) odaje dobre wyniki, jak długo wydzielina nie jest jeszcze ropną, objawy zapalne cewki bardzo słabe, a obecność gonokoków w wydzielinie śluzowej zapewnia o jej charakterze rzeżączkowym. Polecić wstrzykiwania Arg. nitr. 0·05:200—250, 4 razy dnia, płyn wstrzyknięty powinien zostać w cewce 4—5 minut.

Skoro wydzielina stała się ropną, obfitą (w takim stanie widzi się najczęściej pacjentów) objawy zapalne silne, bóle przy oddawaniu moczu znaczne, wstrzymać się od leczenia miejscowego, a ograniczyć do podania.

106. Saloli 0·75,(lub *Natr. salic.*),*D. t. d. N. XV.*

S. 3 proszki na dzień.

jako napój polecić wodę Bilińską, Kissingen etc. Kąpiele nasiadowe 26—28° R. Zabronić napojów zawierających kwas węglowy (szampan, piwo, woda sodowa), noszenie suspensorium, czyste utrzymywanie członka, zwrócić uwagę na codzienne wypróżnienia.

Kiedy okres ostry minie, co dzieje się z końcem 3-go, początkiem 4-go tygodnia (a rzeżączka nie przeniosła się na część tylną), wypływ jest śluzowo-ropny, polecić wstrzykiwanie środków, które mają na celu niszczenie i utrudnienie rozwoju gonokoków. Takimi są:

107. Argenti nitric. 0·05,*Aquae dest. 200·00.*

S. Injectio.

108. Kalii hyper. 0·05—0·15:200.**109. Ichthyoli 4—10:200·00.****110. Alumnoli 2—5:200·00.****111. Creolini 0·10.***Aquae dest. 150·0.*

S. Injectio.

112. Argentamini 0·05.*Aquae dest. 200·0.***113. Argonini 2—4:100·0.****114. Cadmii sulfurici 0·2.***Aquae destill. 100.*

S. Injectio.

115. Europhen 1·0—5·0,*Ol. Oliv.**Pulv. gum. arab. āā 10.**Aque dest. 200·0.*

Mf. Emulsio. S. Injectio.

- 116.** *Bismuthi oxyjodati* 1·0,
Aquae dest. 100·0.
 S. Injectio.

Każdy z tych środków wstrzykuje pacjent 4—5 razy na dzień.

W miarę jak wypływ staje się coraz skąpszy i śluzowy przejść do środków ściągających jak:

- 117.** *Zinci sulfurici* 1·00,
Plumbi acetici 2·00,
Aqu. dest. 200·00.

lub:

- 118.** *Zinci sulfocarbolic* 1—2:
 200·00.

lub:

- 119.** *Bism. subn.* 2—4:200·00.

b) blennorrhoea acuta anterior et posterior.

Dyeta i higiena a więc: spokój, dyeta płynna, kąpiele letnie, codzienne wypróżnienia; jako napój wodę Bilińską. Fournier przepisuje:

- 120.** *Natri bicarb.* 5·00,
Sacchari albi 30·00.
Succi citr. gtt. II.

S. Rozpuścić w litrze wody i użyć w jednym dniu.

- 121.** *Dect. Sem. Lini* 500·00,
Syrupi Diacodii 20·00.
 S. Co 2 godziny łyżkę.

- 122.** *Dect. Folior. Uvae Ursi*
Hrbae Herniariae 500·00.
 S. Użyć w ciągu dnia.

- 123.** *Saloli* 0·75.
 3—4 proszki na dzień.

W razie silnych bólów i częstej potrzeby oddawania moczu narkotyki w postaci czopków do kiszki odchodowej, wstrzyknięcie morfiny, na międzykrocze okłady ciepłe z mąki siemienia lnianego.

- 124.** *Farinae Seminum lini*
 300·00.

S. Do okładów.

Niemożliwość oddania moczu starać się usunąć kąpielami ciepłymi, podaniem narkotyków, w ostatecznym razie użyć cewnika Nelatona.

Erekcye, które w okresie ostrym bywają bolesne, a przy zajęciu części tylnej cewki częściej, łagodzić przez podanie:

- 125.** *Natri bromati* 2·00,
Camphorae rasae
Lupulini aa. 0·15.
Mfp. div. in d. N. X.

S. Jeden proszek przed pójściem spać.

Przy tem leczeniu i zachowaniu się pacjenta rzeżączka części tylnej ustępuje w 3—4 tygodnie; jeżeli to nie nastąpi, trzeba przejść do leczenia miejscowego (p. gon. posterior chronica).

Blennorrhoea chronica.

c) anterior.

Najwięcej używanym sposobem, by przekonać się o umiejscowieniu rzeżączki jest próba dwóch naczyń (Thompsona). Jest ona pewną, jeżeli wypadnie dodatnio tj. II połowa moczu zawiera składniki chorobowe (mocz metny, nitki i t. d.). Jeżeli jednak wypadnie ujemnie, to może być powodem błędnego rozpoznania co do usadowienia się rzeżączki. Dlatego w wypadkach wątpliwych lepiej użyć metody pewniejszej, jaką jest przepłukanie części przodowej cewki zgłębnikiem Nelatona ilością mniej więcej 500·0 wody (przy pełnym pęcherzu). Jeżeli po takim przepłukaniu mocz oddany będzie czysty, można wykluczyć zajęcie tylnej części cewki.

Leczenie czysto miejscowe (wstrzykiwania, przepłukiwania, instalacje). W wyborze środków kierować się zachowaniem się wydzieliny względnie nitek

w moczu co do obecności gonokoków, i w miarę tego, czy takowe są, lub ich nie ma, polecić wstrzykiwania środków, które mają za zadanie niszczenie ich, lub środków ściągających (p. gonorr. acuta anterior). Jeżeli sprawa chorobowa trwa długo (n. p. kilka lat) wtedy wstrzykiwania, jakie można dać choremu nie na wiele się przydadzą.

Wskazane są instalacje za pomocą kateteru Guyona lub Ultzmannna rozczyznów Argent. nitr. $\frac{1}{2}$ —15%, Cuprum sulfur. 5—25% robione co 2—3 dzień.

W bardzo zastarzałych wypadkach nieżyty cewki moczowej, gdzie zazwyczaj błona śluzowa jest zgrubiała, naciekła, narząd gruczołowo zajęty (urethritis follicularis) obok instalacyj wprowadzanie sond metalowych (o ile można najgrubszych).

Zwężenia rozszerzać stopniowo przez wprowadzanie miękkich bougie lub sond metalowych.

d) anterior et posterior.

Druga część moczu (lub cały mocz po przepłukaniu części przodowej) mętna, robić przepłukiwania części tylnej cewnikiem Nelatona rozczyznami Arg. nitr. 0.10—0.15:400, Cupr. sulf. 1—3:300 codziennie, później co 2—3 dzień.

Z nowych leków polecono podobne przepłukiwania rozczyznami Argonini 2—5:100.0, Argentamini 0.05—0.10:100.0.

Druga część moczu czysta zawiera tylko strzępki, nitki (sprawa chorobowa więcej zlokalizowana, trwa dłużej) instalacje Arg. nitr. 1—15%, Cupr. sulf. 5—25% za pomocą cewnika Guyona lub Ultzmannna. Ten ostatni poleca wprowadzenie za pomocą Portereméde Dittla czopków według:

126. *Argen. nitrici* 0.10,
lub *Alum. crudi* 1.00,
lub *Tannini* 0.3—0.5,
Butyri Cacao q. s. f.
supp. ureth. brev. N. V.

Zazwyczaj sprawa chorobowa ustępuje wcześniej z części tylnej i zostaje jedynie w części przodowej, naturalnie że i leczenie ogranicza się wtedy tylko do niej (patrz a).

Blennorrhoe sacci lacrym.

Objawy: łzawienie, tudzież śluz ropiasty za uciskiem okolicy woreczka łzowego, wydobywający się z punktów łzowych. Od czasu do czasu przylacza się ostre ropne zapalenie woreczka łzowego (dacryocystitis) z ogólnymi objawami abscesu, charakteryzującego się tem, że odpowiada położeniem woreczkowi łzowemu, a nie przekracza ku górze lig. canthi int. Dacryocystitis nie leczona przebiega na zewnątrz, a rezultatem jest przetoka woreczka łzowego.

Leczenie: W blennorrhoe sacci lacr., tudzież wobec przetoki niezbędne jest systematyczne sondowanie przewodu noso-łzowego sposobem Bowmana. Rozpocząć należy od Nr 2-go a skończyć na Nr 4-tych. Po każdorazowym wyjęciu sondy (sonda leży $\frac{1}{2}$ god.) przestrzykać należy przewód noso-łzowy przez kanałik łzowy, za pomocą szprycy Aneta lub dobranego zakraplacza sublimatem 1 na 5000 lub rozczyznem 1% formaldehydu. Gdy przy leczeniu tem już żadnej wydzieliny z wor. łzow. wycisnąć nie można, sondować jeszcze w rzadszych odstępach czasu dla zapobieżenia recydywie.

Przetoki granulujące, goją się pod wpływem tego leczenia same, przetoki zaś o ścianach zabliźnionych wymagają nadto o-

peracyi. Przypadki zbyt zadawnione z zarosnięciem przewodu noso-łzowego lub ze znacznym wydcieciem wor. łzow. dają wskazania do extyrpacyi woreczka łzowego.

127. *Formaldehyd 0'05,*
Aqu. dest. 50'0.

S. Do przestrzykiwania przewodu noso-łzowego.

Blepharadenitis.

W formie łuskowej i strupkowej maść z precipitatu białego lub żółtego, pilne usuwanie strupów, zmywanie brzegów powiek wacikiem zmoczonym w wodzie kolońskiej. W formie wrzodziejącej, przypalanie cum lapide mitigato. Uwzględnić nadto przyczyne (scrophulosis, blenorrhoë sacci lacr.).

Bronchiectasis.

Świeże i dobre powietrze, jeżeli można na wsi lub w górach. Odżywianie dobre chorego, odpoczynek od zajęć, unikanie kurzu i dymu.

Leczenie nieżyty oskrzelowego. Jeżeli suchy nieżyt, dawać środki wykrztuśne, apomorphin senega, ipecacuanh., stib. sulph. aurant. z dodatkiem morfiny. Jeżeli wydzielina b. obfita, to środki ściągające, jak tanina, alun, plumb. acet. na wewnątrz lub do wziewań, albo też środki balsamiczne, ol. terebinth.

128. *Bals. peruv. 5'00,*
Aq. dest. 120'00,
Syrup amygdalini,
Mucil. g. arab. aa. 10'00.

DS. Co 2 godziny łyżkę.

129. *Ol. terebinth. 0'5—2'0,*
Menthol. 0'25,
Aqu. dest. 120'00.

DS Do inhalacyi.

130. *Terpinol 3'00,*
Extr. et pulv. liquir. q. s.
ut f. pil. N. 30.
S. 4—5 pig. na dzień.

131. *Mentholi 2'00,*
Sacchari
Gum. arab. aa. 1'00,
Unguent. Glicer. q. s. f. pil.
Nr. 20 obduc. gelatin.
S. 3—4 pig. dziennie.

132. *Myrtoli 0'15,*
c. glicer. q. s.
ut f. capsul. gelat. N. 20.
S. 3—4 kapsułki na dzień.

Wreszcie pobyt nad morzem lub w miejscach klimatycznych.

Bronchitis acuta.

Wskazane jest przedewszystkiem utrzymanie jednostajnej ciepłoty ciała, u starców leżenie w łóżku; szczególnie wobec Bronchit. capillar. oraz środki odwozzące na klatkę piersiową (banki suche). Wewnętrznie środki rozdzielające, wykrztuśne, wobec silnego kaszlu suchego, środki odurzające, balsamica i wody mineralne alkaliczne: Szczawnicka, Giesshübel, Bilińska, Selterska, Emska.

133. *Natri bicarb. 5'00,*
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.

134. *Inf. rad. Ipec. 0'50:200'00,*
Syr. cort. aurant. 15'00.
MDS. Co godzina łyżkę.

135. *Inf. Seneg. e 6'00:200'00,*
Syr. simpl. 20'00.
DS. Co godzina łyżkę.

136. *Inf. rad. Quillajae*
e 5'00 ad 200'00,
Liq. ammon. anis. 2'00,
Syr. Seneg. 20'00.
DS. Co godzina łyżkę.

137. *Vini stibiat. 15'00.*
DS. 3 razy dnia po 10 kropel.

138. *Natri bicarbon.* 5'00,
Sulph. aur. antimon. 0'20,
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
 DS. 3 proszki dziennie.

139. *Morph. mur.*
Apomorphin mur. āā. 0'10,
Aqu. dest. 15'00,
MD. in vitr. nigr.
 S. 3—4 r. dnia po 10 kropel.

140. *Apocodein mur.* 0'10,
Aq. lauroc. 10'00.
 MDS. Po 10 kropli.

141. *Apomorphin hydrochl.* 0'05,
Acid. hydrochl. gtts. 10,
Aq. menth. pip. 50'00,
Syr. simpl. 15'00.
 MDS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ —1 łyżecz.

142. *Pulv. Doveri,*
Sacch. albi āā. 3'00,
Mfp. div. in dos. XII.
 DS. 3 proszki dziennie.

143. *Extr. hyosc.* 0'15,
Aq. dest. 70'00,
Syr. simpl. 20'00.
 S. Co 2 godz. łyżeczkę.

144. *Natri benzoici* 10'00,
Trae aconiti gtts. 20,
Aqu. amygd. amar. 8'00,
Syrup codeini,
Syrup. de Tolu āā. 30'00,
Aqu. dest. 110'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

145. *Natri bicarbon.* 5'00,
Terpin hydrat. 1'00,
Codein. mur. 0'24,
Fp. div. in dos. XII.

146. *Antifebrin* 0'25 *pro dosi.*
 Co 2 godziny proszek.
 Tłumi B. bardzo szybko.

B. chronica. Dobre powietrze, unikanie dymu, kurzu, pożywna dyeta, środków lekko przeczyszczające. Jeżeli można, wysłać na zimę do cieplejszego klimatu, w lecie pobyt na wsi lub zdrojowiskach. Inhalacye soli (2%)

z dodatkiem Ol. terpent. Ol. pini pumilionis. Piecie wód Szezwniczkich, Giesshübler, Selters., Ems. Expectorantia: Ipeka, Apomorphin. Przy Bronchoblenorrhoea: Ol. Terebinth. dziennie dwa razy po 5—10 kropli z mlekiem, lub w kapsułkach. W razie duszności bańki suche, synapizmy.

B. foetida:

147. *Ol. eucalypti* 15'00,
Ol. lavandul. gtts. X.
 S. Po 10 kropel do inhalacyi

148 *Tinct. eucalypti alcoh.* 2'00,
Syr. codeini 20'00,
Syr. tolu 20'00,
Aq. 80'00.

DS. Po łyżeczce wyżyć w ciągu 24 godzin.

149. *Ol. Terebinth. rectif.* 25'00,
 S. 10—20 kropel do inhalacyi.

150. *Myrtoli* 1'50,
Exhibe in caps. gelat. Nr. 10.
 S. Rano i wieczór kapsułkę.

151. *Tinct. benzoës* 1'00,
Mixt. gummos. 120'00.
 DS. Jak wyżej.

U dzieci:

Dzieciom z nieżytem oskrzeli bez gorączki, woda Szczawnicka lub Selterska z mlekiem, przy częstym kaszlu:

152. *Inf. ipecac e* 0'10 *ad* 80'00,
Ammon. muriat. 1'00,
Aq. lauroc. gtts. X.
Syrup simpl. 15'00.
 DS. Co godz. łyżeczkę.

153. *Extr. Hyoscyami* 0'10,
Sacch. lactis 5'00,
Mfp. div. in dos. Nr. X.
 S. 3 pr. dziennie.

Nieżyty oskrz. na tle krzywicy lub żółtów, wymagają użycia tranu, żelaza i jodu. Inhalacya z wód alkalicznych, pobyt w miejscach lesistych i górzystych, lub nad morzem. Dyeta posilna, ła-

two strawna (mleko, jaja, mięsa siekane). W razie n. o. z gorączką, trzymać dziecko w pokoju, środki wykrztuśne.

Jeżeli wykrztuszanie skape Natr. jodat. (0:50:100 w naparze ipeki) lub: Senega (e 5:00:100:00). Wdychiwania pary. Jeżeli wydzielina obfita, dodać do Senegi Liquor amm. anis. W razie ustania wykrztuszania, sinicy: flor. benzoës, wino mocne, Cognac, ciepłe kąpiele z zimnemi polewaniami. Dzieci małe często nosić na rękę.

154. *Det. cort. chinæ e 3'00*
ad 100'00,

Natri jodat. 1'00,
Trae bellad. gtts. duas
Syr. altheae 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Jeżeli w przebiegu n. o. pojawi się astma, podawać przetwory jodu (kali jodat. Syrup. ferri jodat.) przeciw napadom można użyć chlorału a nawet małych dawek morfiny (0'002 dzieciom 5—6 letnim).

Garcinoma uteri.

W początkach cierpienia: wycięcie macicy częściowe, a najlepiej całkowite. W przypadkach, w których zaś znachodzimy nowotworowy naciek w więzachszerokich, leczenie objawowe: utrzymanie czystości przez wstrzykiwania odrażające.

155. *Kali chloricum 1:100.*

156. *Kali hypermang. 10'00,*
Aqu. dest. 150'00.

DS. Pół łyżki na litr wody.

157. *Acidi carbol. 20'00—30'00,*
Aqu. dest. 1000'00.

DS. Do wstrzykiwań.

Gdy plamy krwawe:

158. *Ac. pyrolign. crudi 300'00.*

DS. 3—5 łyżek na litr wody do wstrzykiwań.

159. *Creolini 20'00.*

DS. 10 kropel na litr wody.

160. *Ferri sesquichl. sol. 10'00,*
Aqu. dest. 1000'00.

Nadto gdy to nie wystarcza, zakładanie gazy jodoformowej do pochwy.

W przypadkach krwotoków spokój i Tampowanie pochwy.

Gdy znaczniejsze wybujałości i częste krwawienie: wyskrobanie nowotworu i przypieczenie cum ferro candente, thermokauterem i t. d. albo środkami chemicznymi silnie żracemi. W tym celu polecają Jodphenol (1 część jodu na 4 części zgęszczonego płynnego kwasu karbolowego) na wacie, na część pochwową i do szyi. W nowszych czasach polecają 18—20% roztwór wodny ferripyriny, którym napawa się małe tampony i przykładają na miejsce krwawiące; ferripyriny można użyć też w tym celu w proszku na tamponach.

Wreszcie przeciw bólom należy podawać środki kojące: morfinę, opium i t. d. Baczyć na dobre odżywianie, środki gorzkie, pobudzające apetyt.

Garcinoma ventriculi.

W przypadkach nienadających się do zabiegu operacyjnego leczenie jest przypadkowe, zmierzające do podtrzymania sił chorego za pomocą lekko strawnej a pożywnej diety oraz usuwania bólów przez podawanie środków odurzających. Prócz tego wskazane jest podawanie kwasu solnego, którego żołądek rakowato zwyrodniały najczęściej nie wydziela, oraz podawanie przetworów Condurango, przeciw objawom dyspeptycznym. W razie towarzyszącego rozszerzenia żołądka lub krwotoków vide: Dilatatio ventriculi, Haematemesis.

161. *Acid. hydrochlor.* 3'00,
Pepsini german. solub de
Rostock 2'00,
Aq. dest. 200'00,
Syr. simpl. 15'00.
 DS. Po każdym jedzeniu 2
 łyżki zażyć.

162. *Tinct. nuc. vom.*
Acidi hydrochl. āā. 10'00.
 DS. Po każdym jedzeniu 15
 kropel w szklance wody.

163. *Tinct. chinæ comp.*
— rhei vin. āā. 30'00,
Tinct. nuc. vom. 3'00.
 3 razy dz. po 15—20 kropel.

164. *Extr. Condurango* 2'00,
Chloral. hydr. 1'00,
Aq. destill. 150'00,
Syr. cortic. aurant. 20'00.
 DS. 3—5 łyżek dziennie.

165. *Vini Condurango* 100'00.
 DS. 3 łyżeczki dziennie.

W razie wymiotów:

166. *Decoct. Condurango e* 15'00,
ad 180'00,
Trae rhei vin. 5'00,
Resorcin 2'00,
Syr. cortic. aurant. 20'00.
 S. Co 2 godz. łyżkę.

167. *Cocaini muriat.* 0'20,
Aq. dest. 10'00.
 DS. W razie wymiotów 10
 kropel zażyć.

168. *Argenti nitr.*
Extr. Bellad. āā. 0'50,
Aq. destillat. 30'00.
 DS. 3 razy dnia 15—20 kropel.

169. *Antinosin* 1'00,
Dent. tal. dos. Nr. XX.
 S. Proszek rozpuszczony w li-
 trze wody do płukania żołądka.
 W razie bólów podawać na
 wewnątrz morfinę lub co-
 deinę.

170. *Codeini mur.* 0'10—0'15,
Sacch. albi 2'0,
Mfp. div. in dos. Nr. V.
 W razie bólów 2 proszki.

Kalendarz lekarski. 1898.

Cardialgia.

Znaleść przyczynę bólu i ta-
 kową starać się usunąć. Najczę-
 ściej: *ulcus ventriculi*, *carcino-*
ma ventriculi, *chlorosis*, i u hy-
 steryczek, *neurasteników* lub
 jako *crises gastriques*.

W razie napadu ciepły okład
 na żołądek, synapizmy na dołek
 podsercowy, wstrzyknięcie pod-
 skórne morfiny, narcotica jak:
opium z *bismuth. subnitricum*,
Cocaina 0'01—0'02 p. dosi, *Bel-*
ladona, *Chloroform* i t. p. Nadto
 uregulowanie diety.

171. *Tinct. opii croc.* 5'00,
Tinct. castor. 10'00,
Tinct. valer. aeth. 15'00.
 MDS. 3 r. dz. po 10 kropel.

172. *Morphii mur.* 0'005,
Bismut. subnitr. 0'30,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 10.
 S. W razie bólu co 2 godziny
 proszek.

173. *Extr. Strychni* 0'01,
Bismut. subnitr.
Magnes. carb. āā. 0'20,
Sacch. 0'20,
Mfp. tal. dos. 10.
 S. Co 2 godz. proszek.

174. *Tinct. Strychni,*
Tinct. Opii āā. 5'00.
 DS. Co 2 godz. po 10 kropel
 w razie silnego bólu.

175. *Cocain. mur.* 0'15,
Aq. dest. 120'00,
Syr. āurant. 30'00.
 S. Co $\frac{1}{4}$ godz. łyżeczkę.

176. *Chloroformii* 1'00,
Aq. dest. 150'00.
 MDS. Co 1—2 godz. łyżkę.

177. *Bismut. valerian.*
Bismut. subnitr. āā. 2'00,
Extr. nuc. vom. 0'50,
Extr. gentian. q. s. f. pill. 50,
Obduc. gelat.
 S. 2—3 pig. na czczy żołądek.

178. *Zinci ferro hydrocyan.* 0·20,
Sacch. albi 4·00,
Mfp. div. in dos. Nr. XII.
 S. Co 2 godz. proszek.

179. *Ol. cajeput gtts.* X,
Tinct. valerian. aether. 8·00.
 S. Co 3 godz. po 30 kropel za-
 żywać.

Prąd stały z anodą na dołek
 podsercowy, lub też przerywany
 na 6—10 minut. Przepłukiwanie
 żołądka ciepłą wodą na 38—40°.

Cardiopalmus, Hyperkinesis cordis.

Usunięcie przyczyny, najczę-
 ściej stan ogólnie nerwowy, osła-
 bienie, lub zatrucie kawą, her-
 bata i tytoniem. Nadto leczenie
 błędnic, niedokrewności i ogólnie-
 go osłabienia zwykłymi środ-
 kami. Podczas napadu przy sil-
 nej akcyi serca, okład lodowy
 na serce, spokój, wstrzymanie
 się od wszelkich podniecających
 napitków, natomiast przy słab-
 em działaniu serca, podać wi-
 no, cognac, czarną kawę, her-
 batę, nadto:

180. *Coffein citrici* 0·10,
Dtur. tal. dos. N. 4.
 S. W razie napadu 1 proszek.

181. *Tinct. Veratri virid.* 1·00,
Aqu. dest. 80·00,
Syr. cort. aur. 20·00.
 S. 3 łyżki dziennie.

182. *Sparteini sulph.* 0·05,
Sacchari 0·30,
Mfp. d. tal. dos. tres.
 S. W razie napadu 1—2 pr.

183. *Theobromin* 0·10,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. 10.
 S. 4—5 pr. dziennie.

184. *Trae strophanti,*
Trae digital. āā. 5·00.
 DS. Podczas napadu 10—15
 kropel raz lub dwa dzień.

185. *Tinct. convall. maj.* 8·00,
Tr. digital. 2·00.
 DS. 3 r. dz. po 10 kropel.

186. *Trochisci nitroglyc.* 0·001.
 S. W napadzie pół pastylki
 lub całą zażyć.

187. *Nitroglycerin* 0·20,
Spir. vini 20·00.
 MDS. Zacząć od 1 kropli do 10
 kropel 3 razy dzień. (w łyż-
 ce wody).

Osobom zaś nerwowym:

188. *Kalii bromat.* 1—2 gram.
 na raz lub też:

189. *Trae Valerian. aeth.* 10·00.
 S. 3 r. dz. po 15—20 kropel.
 Podskórne wstrzyk. morfiny
 $\frac{1}{2}$ —1 cgr.

190. *Morphii muriat.* 0·10,
Aq. sterilis
Glycerini āā. 5·0
 DS. Do wstrzykiwań.

Catarrhus intestinorum.

Acutus.

Wskazane jest leżenie w łóż-
 ku, ścisła dyeta, okład ciepły
 na brzuch i środek przeczysz-
 czający, najlepiej ol. ricini. W ra-
 zie silnych bólów, leki odurza-
 jące; w razie, gdyby po kilku
 wypróżnieniach po środku czy-
 szczącym biegunka nie ustąpiła,
 przetwory makowca, także leki
 osłaniające i ściągające.

Chronicus.

Leczenie powinno być przy-
 czynowe, uważać należy na dyc-
 tę, która powinna być lekko stra-
 wną, unikać zaziębień (opaska
 flanelowa na brzuch). Woda
 karlsbadzka, Kissingen, Wildun-
 gen, w razie zaparcia środki
 lekko czyszczące (Saratika), le-
 watywy codziennie.

- 191.** *Saloli* 0'25,
Laud. puri 0'02,
Mfp. dtur tal. dos. 10.
 S. 3 proszki dziennie.
- 192.** *Bismut. salicyl.* 0'25,
Resorcin 0'15,
Laud. pur. 0'01,
Mfp. tal. dos. XII.
 S. 3 proszki dziennie.
- 193.** *Decoct. rad. Salep* 200'00,
Laudani puri 0'05,
Syr. Diacodii 20'00.
 MDS. Co godz. łyżkę.
- 194.** *Cotoini puri* 0'50,
Emuls. amygdal. 100'00.
 S. Co $\frac{1}{2}$ godz. 2 łyżki zażyć
 (Środek b. drogi).
- 195.** *Decoct. ligni Campech. e*
 20'00 ad 200'00,
Laud. liq. Syd. gtt. XX,
Syr. cort. aurant. 20'00.
 S. Co 2 godz. łyżkę.
- 196.** *Decoct. rad. ratanh. e* 15'00
 ad 150'00,
Tinct. laud. simpl. gtt. 1'00,
Syr. cinnamom. 15'00.
 S. Co 2 godz. łyżkę.
- 197.** *Tannini puri* 1'0,
Morphii mur. 0'10,
Sacch. albi 5'00,
Mfp. div. in dos. Nr. 10.
 S. 3 proszki dziennie.
- 198.** *Salicin* 0'50,
Gummi arab. 6'00,
Sacch. albi 4'00,
Mfp. div. in dos. Nr. 10.
 S. Co godz. proszek.
- 199.** *Eudoxini* 0'30—05'0,
Dent. tal. dos. Nr. XII.
 S. 3—5 r. dziennie proszek po
 jedzeniu.
- 200.** *Extr. Opii* 0'02,
Tannini 0'10,
Naphtalinalae 0'25,
Mfp. d. t. d. XII.
 DS. 2—3 proszków dziennie.

- 201.** *Pulv. Doveri* 1'00,
Extr. Colombo,
Sacch. albi aa. 2'00,
Mfp. div. in dos. X.
 DS. Co 2 godz. proszek zażyć.
- 202.** *Benzonaphthol.* 0'25—0'50,
Dent. tal. dos. in capsul.
amyl. Nr. 20.
 S. 4 proszki dziennie.
- 203.** *Tannigen* 0'30—0'50.
Dent. tal. dos. Nr. X.
 S. 3 proszki dziennie
 lub Tannalbin.

U dzieci łączy się zwykle z objawami ze strony żołądka Patrz: Gastroenteritis.

Catarrhus laryngis zob. Laryngitis.

Catarrhus pharyngis zob. Pharyngitis.

Catarrhus ventriculi acut.

Jeżeli w żołądku znachodzi się jeszcze treść, która ostry nieżyt wywołała, najstosowniej przepłukać zaraz żołądek, poczem chory powinien 2—3 dni zachować ścisłą dyetę.

Jeżeli aspiratora pod ręką nie ma, należy podać środek wymiotny.

W razie gdy przypuszczamy, że treści w żołądku nie ma, wystarczy ścisła dyeta, i tylko gdy cierpieniu temu żołądka towarzyszy ta sama zmiana w jelitach, wskazane są środki przeczyszczające. Zresztą leczenie jest czysto przypadkowe, gdy silne bóle w okolicy żołądka występują, wskazane są środki odurzające, w razie pragnienia: kwaski, woda sodowa, Giesshübelska etc.

Wobec nadmiernego pobudzenia do wymiotów przy żołądku

czeczmy polykanie kawaleczków lodu i Cocaina 0·005—0·01 na raz.

Jako środki wymiotne:

204. *Pulv. rad. Ipecac.* 2·00,
Div. in dos. VI.

DS. Co kwadrans proszek aż do wystąpienia wymiotów.

205. *Tartari stibiati* 0·05,
Aqu. dest. 50·00.

W 2-ch porcyach w przeciagu 10-ciu minut zażyć.

206. *Natr. bicarb.* 2·0,
Tinct. nucis vom. gtt. decem
Aq. destill. 150·00,
Syr. cortic. aurant. 15·00.
S. Co godz. łyżkę,

207. *Papain p.* 0·50,
Dent. tal. dōs. Nr. 10.
S. 3 proszki dziennie.

208. *Resorcin. resublim.*
Acidi muriat. dil. āā. 2·00;
Aq. destill. 200·00,
Syr. cort. aurant. 20·00.
S. Co 2 godz. łyżkę.

209. *Apomorphini mur.* 0·10,
Aqu. dest. 10·00.
DS. Podskór. $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.

Przeciw wymiotom:

210. *Cocain. mur.* 0·10,
Aq. dest. 10·00.
DS. 10—15 kropel na raz zażyć.

Przeciw bólom:

211. *Morph. mur.* 0·10,
Aq. dest. 10·00.
S. 10 kropel na raz zażyć.

Catarrhus ventriculi chronicus.

1. Acidus.

Dyeta pożywna lekko strawna z wykluczeniem potraw korzennych, kwaśnych, tłuszczów, jarzyn, napoi wysokowych i CO₂ zawierających. Wewnętrznie

wskazane są środki alkaliczne, woda Karlsbadzka, Vichy lub Szczawnica źródło Magdaleny, przepłukiwania żołądka roztworami soli alkalicznych, lub woda Karlsbadzka; w razie silniejszych bólów w dołku podsercowym środki odurzające.

2. Mucosus.

Wskazana jest dyeta lekko drażniąca, a więc nieco napojów wysokoowych, kwasków organicznych, mięso w możliwym rozdrobnieniu, najlepiej więc siekane. Wewnętrznie środki gorzkie i kwas solny. Masaż żołądka, elektryzowanie.

Ad. 1.

212. *Sal. therm. Carolin factic.*
lub *originalis* 100·00.
S. Na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody.

213. *Natrii biboracici*
Magn. ustae
Strontii bromati āā. 5·00.
MD. 3 razy na dzień na koniec noża — $\frac{1}{2}$ łyżeczki w godzinę po jedzeniu.

214. *Natri bicarb.* 15·00,
Magn. carbon. 10·00,
Calcar. carbon. 5·00,
MD. in scatula.
S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

W razie bólów:

215. *Morph. mur.* 0·10,
Aquae laurocer. 10·00,
MD. in vitr. nigro.
S. W razie bólu 10 kr. zażyć.

216. *Tinct. nuc. vom. gtt.* 10,
Aq. lauroceras 10·0.
S. Dwa razy dnia po 10 kropel.

217. *Codeini* 0·02,
Natri bicarb. 0·25,
Magnes. carb. 0·10,
Mfp. d. tal. dos. X.
S. W razie bólu 2—3 pr. dz.

Ad 2.

218. Trae Amar.*Acid. hydrochl. dil. āā. 15'00.*

MDS. Po każdym jedzeniu 20 kropel w łyżce wody zażyć.

219. Acid. hydrochl. 3'00,*Pepsin solub. german. de Ro-stock 2'00,**Aqu. dest. 200'00,**Syr. cort. aurant. 15'00.*

MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

Catarrhus vesicae zob. Cystitis.**Cephalalgia zob. Hemicrania.****Chalazeon.**

Od jęczmienia różni się brakiem objawów zapalnych, tudzież punktem wyjścia z chrzastki powiekowej (Gruczoły Meiboma). Usunięcie zapomocą nacięcia od strony spojówki powiekowej cięciem równoległym do przebiegu gruczołów Meiboma poczem galaretowatą treść wygnieść, a torebkę wyskrobać należy.

Chlorosis.

Przedewszystkiem usunięcie istniejącej przyczyny błędaczki. Pożywienie powinno być b. po silne, ale łatwo strawne. Świeże powietrze, mierny ale systematyczny ruch. Należyte wysypianie się, nieprzeciążanie chorych ani fizyczną ani umysłową pracą. Szczególną mieć uwagę na zaburzenia żołądkowe i jeżeli takowe istnieją, przedewszystkiem starać się je usunąć.

220. Tinct. malat. ferri,*Chin. comp. āā. 25'00.*

DS 2—3 łyżeczek na dzień,

221. Ferri sulfur. pur.*Kalii carbon. āā. 15'00,**Gi. Tragacanth. q. s. ut. f. pill. N. 120.**Consp. pulv. cinam.*

DS. 3 r. na dzień 2—5 pig.

(Blauda pigułki).

222. Ferri sulfur. sicc. 6'00,*Kali carbon. sic. 5'00,**P. althaeae 3'00,**Mel. crud. q. s. ut. f. pil.**N. 120.*

DS. 3 r. na dzień po 2 pig.

(Pigułki Valetti).

223. Aloes 2'00,*Ferri pulv. 8'00,**Pulv. rad. rhei 4'00,**Mucil. gum. ar. q. s.**f. pill. pond 0'10,**Consp. cinnamom.*

S. 2 razy dz. po 3 pig.

przy równoczesnem zaparciu

Przy dyspepsyi:

224. Pepsin germ. 2'50,*Ferri hydrog. reduct. 1'00,**Extr. nuc. vom. 0'10,**Sacch. lact. 3'00,**Mfp. div. in dos. 10.*

S. 3 pr. dziennie.

225. Ferri carbon. sacch.*Sacch. albi,**Natri bicarb. āā. 3'00,**Myrrh. pulv.**Pulv. rad. rhei āā. 2'00,**Mfp. D. ad scatul.*

S. 2—3 razy na dzień na koniec noża.

226. Ferri oxydati sacch. 10'00,*Pulv. rad. Gent. 5'00,**Extr. Gent. q. s. ut. f. pil.**N. 100.*

S. 3 r. po 2 pigułki następnie 3—4 do 10.

227. Ferri reducti 10'00,*Magn. carbon.**Succ. liquir. āā. 4'00,**Glyc. q. s. ut. f. pil.**N. 100.*

S. 3 r. po 2—4 pig. dziennie po jedzeniu.

228. *Ferri oxydati dialys.* 5'00,
Sol. arsen. Fowler. 1'05,
Aqu. dest. 150'00,
Aqu. menth. pip.
Syr. cinnam. āā. 15'00.

DS. 3 razy na dzień po łyżce stołowej.

229. *Ferri arsenic. cum.*
Ammon. citrico 0'02,
Sacch. albi 3'00,
Mfp. D. in dos. N. 10.

S. 2 proszki na dzień.

230. *Ferri lactici,*
Sacch. albi,
Elaeosacch. cinnamom. āā. 0'20
Mfp. D. tal. dos. N. XX. in
charta cerat.

S. 3 r. dr. proszek po jedzeniu.

231. *Pyrophosph. ferri et sodae,*
Sacch. albi āā. 0'20,
Mfp. D. tal. dos. N. XX.

S. 3—4 proszki na dzień.

232. *Liqu. ferri album.* 50'00.

DS. 3 r. po łyżeczce od kawy.

233. *Chinini ferro-citrici* 1'00,
solve in
Vin. malagens. 200'00.

DS. 3—4 łyżek dziennie.

234. *Haemol pulverati* 25'00,
Da in scatula.

S. 3 razy dnia na koniec noża żażyć.

235. *Ferratin.* 1'00,
Dent. tal. dos. Nr. XV.

S. 3 proszki dziennie.

236. *Haemogallol. pulv.* 25'00,
Do. in scatula.

S. 3 razy dnia na koniec noża żażyć.

237. *Ferropyrin.* 1'00,
Aq. destillat. 150'00,
Syr. cort. aurant. 30'00.

S. 3 łyżki dziennie.

Obok tego przetwory arsenikalne jak *Sol. Fowlera*, woda *Gubera*, *Levico*, *Roncegno* 2—3

łyżeczki na dzień, następnie i 2—3 łyżek. Wody żeleziste, Żegiestów, Krynica, Elster, Francensbad i t. d. kąpiele borowinowe (*Mattoniego* sól borowinowa).

Cholelithiasis.

Leczenie 1-mo samej choroby. 2-do napadu kolki wątrobowej.

Ad 1. Uregulowanie diety, ścisła uwaga na oddawanie stolca, z diety wykluczyć należy przede wszystkim tłuszcze i kwasy, oraz napoje wysokokowe. Prócz tego środki rozpuszczające złoży żółciowe, a tu należą wody mineralne (*Karlsbad*, *Ems*, *Vichy* etc.) i środki *Duranda*; w niektórych przypadkach radzą zrobić zabieg operacyjny.

Ad 2. Podczas napadu okład ciepły na okolicę wątroby, podskórne wstrzykiwania środków odurzających.

238. *Aether. sulph.* 15'00,
Ol. Terebinth. rectific. 10'00.
 DS. 3, r. dnia po 15—20 kropeł.
 (*Srodek Duranda*).

239. *Extr. belladon.* 0'10,
Aqu. dest. 20'00.
 MDS. W napadzie co 1/2 godz.
 po 15 kropeł.

240. *Morph. mur.* 0'10,
Aqu. dest.
Glycerini āā. 5'00.
 MDS. Do podskórnych wstrzykiwań, w jednej strzykawce 0.01 morfiny.

241. *Natri Salicyl.* 0'50,
Extr. bellad. 0'01,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
 S. 4 proszki dziennie w wodzie sodowej.

Polecają też glicerynę w dawce 20—30 grm. w razie napadu. W dawce 5—15 grm. w wodzie alkalicznej kilka razy dziennie dla zabezp. od napadu.

lub

- 242.** *Ol. olivar. optim.* 200·00,
Cognaci 20·00,
Vitelli ov. Nr. 2,
Menthol. 0·20.

DS. W przeciagu godziny na
 2 razy użyć.

- 243.** *Natri salicyl.* 1·00,
Natri sulphur. 3·00—5·00.
Mfp. Dtal. dos. N. XV.

S. 2—3 proszki dziennie stó-
 sownie do ilości wypróżnień.

Cholera.

W pierwszym okresie choroby wskazane są środki przeczyszczające, a z tych przedewszystkiem Calomel, który ma też mieć znaczenie antyseptyczne dla treści jelitowej. Po kilku obfitych wypróżnieniach, wywołanych środkiem czyszczącym, należy podawać przetwory makowca. W przypadku, gdzie są już wymioty, rozwolnienie, odrazu przejść do przetworów makowca, chorego w łóżku ułożyć, okłady rozgrzewające, środki podniecające: herbata z rumem, cognakiem i t. p. Ciepłe kąpiele b. polecane. Następnie przejść do enteroclysmy według Cantanigo: w wodzie przegotowanej o ciepłocie 30—40° C. rozpuszcza się tanninę 10·000:1000·00 lub też Acid. salicyl. 1‰; lejką Hegara wlewa się do kiszek 1—2 litrów z wysokości 2 metrów. Powtarzać co kilka godzin. Jeżeli pomimo tego następuje zapad (stad. algidum) stosować hypodermoklyzę z wody destylowanej i sterylizowanej (wodę trzeba w tym celu 1/2 godziny gotować w kolbie zatkaanej korkiem z waty.) Na 2 litry takiej wody daje się 6·00 Natri carbon. i 8·00 Natri chlorati ogrzewa do 40° C. (zachować ostrożność co do antyseptyki). Zresztą leczenie przypadkowe,

rozcierania, wyskokiem spir. camphoratus; przeciw kurczom inj. morfiny (1—2 ctgr.) w razie wymiotów: wino szampańskie, zimna woda sodowa kwaśna, kawa czarna, polykanie lodu, Cocaina. W razie zapadu środki podniecające, inj. podsk. eteru, ol. camphor. Desinfekcyja stolców i wymiocin.

Krople Botkina:

- 244.** *Trae chinæ comp.* 25·00,
Chinin mur. 1·00,
Acid. mur. 1·50,
Trae Opii 6·00,
 — *Valer. aeth.* 12·00,
 — *nuc. vom.* 1·50,
Ol. menth. 0·50.

DS. Co godz. 15 kropel.

- 245.** *Cocain mur.* 0·30,
Aqu. dest. 130·00,
Creozoti gtt. 15,
Acid. mur. dil. gtt. 50,
Syr. simpl. 30·00.

S. Co 2 godz. łyżkę

- 246.** *Acid. hydrochl.* 2·00,
Cocain. mur. 0·12,
Tinct. Opii 2·00,
Aq. dest. 170·00,
Syr. simpl. 30·00.

DS. Co godz. łyżeczkę, dopóki wymioty trwają, później rzadziej (lekarstwo trzymać w lodzie).

- 247.** *Tinct. Cinnamom.* 20·00,
 — *Opii croc.* 0·75,
Bismut. subn. 5·00,
Mixt. gum. 100·00.
 S. Co godz. łyżkę (w biegunkach początk.).

- 248.** *Tinct. opii croc.* 6·00,
Vini ipecac. 4·00,
Trae Valerian. aeth. 12·00,
Ol. menthae pip. 1·00.

DS. 15 kr. w herbacie z mięty

- 249.** *Camphor.* 1·00,
Aether. acet. 15·00,
Trae opii 3·00.

DS. Co 1/2 godz. 10 kropel.

Dujardin Beaumetz radzi:

1) aby chorego ogrzać napojami, kawa, herbatą z rumem i t. p. 2) przeciw bieguncce:

250. *Acidi lactici* 10·00,
Syr. simpl. 20·00,
Tinct. cort. aur. 2·00.

Całość wlać do litra wody i co kwadrans 3 łyżki podać.
3) Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub:

251. *Tinct. valerian.* 5·00,
Laudan. Sydenham. 1·00,
Liquor Hoffmann 5·00,
Aq. menth. pip. gtts. V.

MDS. Po 25 kropel, ile razy przychodzi skłonność do wymiotów lub parcia na stolec.

Bucquoy poleca przeciw bieguncce:

252. *Tinct. canellae* 10·00,
Bismut. subnit. 4·00,
Laudan. Sydenham. 0·75,
Mixt. gummos. 100·00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Cholera infantum zob. Gastroenter. acuta i acutiss.

Chorda.

1) Dyeta mleczna. 2) Uregulowanie stolca. 3) Zimne okłady i kąpiele systematycznie przeprowadzane, gdyż chwilowo użyte, działają raczej rozdrażniająco; *Antiphrodisiaca*:

253. *Camphor. rasae* 0·20,
Mixt. gummosae 100·00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

254. *Lupulini puri* 0·10,
Camphor. rasae 0·01,
Extr. Lupuli q. s. ut. f. pill.
dtr. tal. dos. N. XII.

DS. 6 pigulek dziennie. Gdy to bezskuteczne, iniekcya morfiny (0·01--0·02).

255. *Lupulini puri* 0·10,
Sacchari 0·30,
Mfp. dtr. tal. dos. N. 10.
DS. 3 proszki dziennie.

256. *Extr. opii aq.* 0·10,
Butyri Cacao q. s. ut f.
supp. Nr. 5.
S. Wieczór 1—2 czopki.

257. *Extr. Belladonn.* 1·0,
Lanolin 8·0,
Vaselin 2·0.
S. Maść.

258. *Amylenhydrat* 5·0,
Aquae flor. aur. 50·0,
Syr. cort. aur. 30·0.
S. Na noc zażyć połowę.

Chorea minor.

Dobre odżywianie, pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka lecznicza, chociaż w cięższych przypadkach w samym początku, lepiej dzieci trzymać w łóżku. Zabronić nauki, dozwoić dużo spać. Jeżeli na tle niedokrwistości, blednicy, reumatyzmu; podawać przetwory chininy i żelaza, w ostatnim przypadku, przetwory salicylu. Kąpiele letnie, siarczane, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa) (24—26°) prąd stały. Rozpylanie eteru na kręgosłup. W cięższych przypadkach, w celu uspokojenia można podawać chloral, Urethan, Sulfonal, aby wywołać dłuższy sen.

259. *Solut. arsen. Fowleri,*
Trae ferri pomati aa. 5·00.
DS. 3 r. dnia po 2—3 kropli po jedzeniu. Można postąpić do 5-ciu kropel.

Wody arsenowe: Gubera 2—3 łyżek, Levico i t. d.

260. *Chloral. hydrat.* 4·00,
Natri bromati 2·00,
Aqu. dest.
Syr. aurant. aa. 25·00.
MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

- 261.** *Kali jodati* 2'50,
Aq. dest. 150'00.
 DS. 3 r. dz. łyżkę.
- 262.** *Natri bromati* 0'20,
Chinini ferrocitrlici 0'10,
Sacch. 0'20,
Mfp. Dtr. tal. dos. N. XV.
 DS. 3 pr. dziennie.
- 263.** *Sulfonali* 0'25—0'50,
Dtur. tal. dos. N. V.
 S. Na noc proszek.
- 264.** *Zinci valerian.* 0'50,
Sacch. alb. 2'0.
M. f. p. div. in pp. V.
 S. 3 proszki dziennie.
- 265.** *Flor. Zinci* 0'50,
Pulv. Valerian. 0'25,
Pulv. gum. 10'0.
Mfp. Div. pp. N. XXX.
 S. 3 proszki dziennie.
- 266.** *Chinini ferrocitrlici.* 1'0
Elaeosacch. calam. 3'0.
Mfp. Div. in pp. N. X.
 S. 3 pr. dziennie.
- Prócz tych środków, zachwalano w ostatnich czasach antipyrinę po 2—3 gram. dziennie (0'50 pro dosi).
- 267.** *Propylamini* 1'00,
Aqu. menth. pip. 50'00,
Syrup simpl. 20'00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.
 (Przez 3—4 dni).
- 268.** *Ferri carbon. sacch.* 2'0,
Oxyd. Zinci 1'0
Sacch. alb. 10'0.
 Mfp. S. 3 r. d. na koniec noża.
- 269.** *Exalgin* 1'00,
Solve in spir. menth. pip. 5'00,
Aquae tiliae 120'00,
Syrup aurant. 30'00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.
- Ostatniemi czasy polecają:
- 270.** *Physostigm. sulf.* 0'01,
Aq. dest. 10'0.
 S. Wstrzykiwać początkowo $\frac{1}{2}$ strzykawki później 1—2 strz.

- 271.** *Hyoscin. muriat.* 0'01,
Aq. dest. 10'0.

S. Do zastrzykiwania, jak poprzedzający.

Chorioiditis zob. Iridocho- rioiditis.

Cirrhosis hepatis.

Leczenie polega na podawaniu środków lekko czyszczących, najlepiej solnych, uregulowanie diety, z której napoje wysokie wykluczyć należy, polecając też ścisłą dietę mleczną; jeżeli chory przebył kile, to należy zastosować wciierki szaruchy a po tem kal. jodatum.

Przeciw nagromadzeniu się płynu w jamie brzusznej, środki moczopędne, gdy te nie są dostateczne i wobec indicatio vitalis, nakłucie powłok brzusznych i wypuszczenie płynu.

Jako moczopędne:

- 272.** *Calomelanos* 0'10,
Sacch. albi 0'30,
Mfp. Dtur. tal. dos. N. XV.
 DS. 5 proszków dziennie.
- Przychem jednak należy zwrócić baczną uwagę na działą.
- 273.** *Theobromini natriosalicyl.*
(vel Diuretin) 0'50,
D. tal. dos. N. XV.
 DS. 5 proszków dziennie.
- 274.** *Inf. fol. Digit.* 1'00:200'00,
Liqu. Kali acet. 20'00,
Trae cort. aurant. 25'00.
 MDS. Co godz. łyżkę.
- 275.** *Inf. Juniperi* 15'00:200'00,
Syr. simpl. 15'00.
 DS. Co godz. łyżkę.
- 276.** *Kali jodati* 10'00,
Aq. dest. 200'00.
 MDS. 2 łyżki dziennie.

Colica flatulenta.

Najczęstszą przyczyną niestrawności i kolki jest za częste podawanie piersi i uspakajanie dziecka piersią, polecić regularne karmienie co 3 godz. w dzień i 2 razy w ciągu nocy.

W napadzie: wilgotne ciepłe okłady na brzuch, smarowanie ciepłą oliwą, lub maściami aromatycznymi. Wprowadzić do kiszki stolcowej kateter (powyżej sphincter internus). Lewatywy z ciepłej wody z oliwą. Rumianek lub herbata z mięty, łyżeczkami. Starszym dzieciom przykładać płatki nakrapiane rumem, synapizma.

277. *Calomel.* 0·01—0·03,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. V.
S. Co godz. proszek.

278. *Natri benzoici* 0·20,
Aqu. dest.
Aqu. foenicul. āā. 30·00,
Trae laudani gtl. duas.
Syrup simpl. 15·00.
DS. Co godz. łyżeczkę.

279. *Chloral hydrat v. Urethan*
0·50,
Aqu. dest. 80·00,
Mucilag. gum. arab. 20·00.
MDS. Na 2 lewatywy w razie bólei lub drgawek.
(Wrazie długotrwałych bólei ub wystąpienia drgawek).

Colica menstrualis vide Dysmenorrhea.

Combustio.

Jeśli niewielka przestrzeń oparzona, okłady z zimnej wody l. z wody Goularda. Jeśli wytworzyły się pęcherze, nakłucie tychże i opatrunek jodoformowy zmieniany co kilka dni. Przy oparzeniu twarzy maść jodoform.

codziennie świeży opatrunek. Jeżeli zajęta jest większa powierzchnia, zastosować można stałą kąpiel letnia, przeciw bóloom pędzlowanie 5% l. 10% chlo-
ralem lub 2% kokainą.

280. *Ol. lini,*
Aq. calcis āā. 50.
S. Zewnętrznie.

281. *Jodoformi* 2·00,
Vasellini 20·00,
Lanolini 30·00.
Mf. ung. S. Maść.

282. *Jodoformi* 10·00,
Ol. Olivar.
Boli albi āā. 30·00,
Plumb. subacet. 20·00.
Mf. past. S. Maść.

283. *Europhen.* 3·00,
Ol. Olivar. 7·00,
Vasellini flavi 60·00,
Lanolini 30·00.
Mf. ung. S. Maść.

284. *Acidi borici,*
Cerae albae āā. 10·00,
Paraffini,
Ol. amygd. dulc. āā. 200·00.
Mf. ung. S. Maść.

285. *Creolini* 1·50,
Vasellini 50·00.
Mf. ung. S. Maść.

286. *Aristoli* 3·00,
Ol. Olivar. 20·00,
Lanolini 100·00.
Mf. ung. S. Maść.

287. *Nosophen* 1·00,
Vasel. alb. 10·00.
Mf. ung. S. Maść.

Condylomata accuminata.

Jeżeli małe, miękkie starać się usunąć przez polecenie zasypywania 2—3 razy dnia:

288. *Pulv. frond. Sabinæ*
Alum. crudi āā. 10·00.
S. Zasyпка.

289. Resorcini*Acidi salicyl.**Plv. frond. Sabin. āā. 10'00.*

S. Zasyпка.

Rozrosłe o szerokich podsta-
wach usunąć nożyczkami, na-
stępnie przyżęgać Paquelinem
lub odpalić samym Paquelinem.

**Condylomata lata zob. Sy-
philis.****Congelatio.**

Indiw. niedokrewnym, skłon-
nym do odmrożeń, polecić od-
powiednie zachowanie się, w le-
cie hydroterapię. W świeżem
odmrożeniu nacieranie śniegiem,
zimną wodą.

290. Aq. Goulardi 300'00.

S. Do okładów.

291. Plumb. acet. basic. sol. 5'00,*Aq. destill. 200'00.*

S. Do okładów.

292. Hydrarg. pp. albi 2'00,*Vaselini fl. 30'00.*

Mf. ung. S. Maść.

293. Kreosoti 2'00,*Ung. simplic. 20'00.*

Mf. ung. S. Maść.

Wobec zgorzeli okłady z płynu
kwaśnego (Liquor Burowi) aż do
wytworzenia się linii demarka-
cyjnej.

294. Alum. crudi 70'00,*solve in**Aq. destillat. 280'00,**Plumb. acet. cryst. 28'00,**solve in**Aq. destillat. 280'00,**M. f. et dil. ad pond. 800'00,**D. in vitr. bene clauso.*

S. Do okładów.

Wobec zgorzeli suchej:

295. Kali hyperm.*Argil. alb.**Calcar. carbon. āā. 10'00.*

S. Zasyпка.

Wobec pęcherzy (perniones)
możliwy spokój i osłanianie
miejsc chorych.

296. Hydrarg. pp. albi 5'00,*Ung. emoll. 50'00.*

Mf. ung. S. Maść.

297. Arg. nitr. cr. 0'20,*Vaselini fl. 10'00.*

Mf. ung. S. Maść.

298. Acidi carbol. 1'00,*Ung. plumbi,**Lanolini āā. 2'00,**Ol. amygd. 10'00,**Ol. lavandul. gtt. XXX.*

Mf. ung. S. Maść.

299. Medul. ossium 14'00,*Acid. mur. concentr. 10'00,**Ung. althaeae 42'00,**Extr. opii aquos 1'00,**Camphor. ras. 3'00,**Terebinth. venet. 7'00.*

Mf. ung. S. Maść.

300. Jodoformi 2'00,*Aether. sulph. 15'00,**Collodii 50'00.*

S. Pędzlowanie.

301. Collodii 50'00,*Ol. ricini 2'00,**Terebinth. 7'50.*

S. Pędzlowanie.

302. Ol. camphor. 2'00,*Lanolini 20'00.*

Mf. ung. S. Maść.

303. Alum. crud.*Borac. āā. 5'00,**Trae benzoës 20'00.*

S. Pędzlowanie.

304. Spir. camphor.*Trae laud. simpl. āā. 7'50,**Acid. carbol. p. 0.60,**Spir. vini.**Aq. dest. āā. 15'0.*

S. Pędzlowanie.

305. Methylchlorid. 7'50.*Cocain. mur. 0'50,**Linim. camphor. 10'00,**Linim. sapon. 20'00,*

S. Pędzlowanie.

Conj. blennorrhöica acuta adultorum.

Śluzoropotok ostry jest zawsze następstwem zakażenia spojówki jadem trypra (2—4 dni po infekcyi). W obrazie choroby góruje 1) silny obrzęk powiek zwłaszcza górnej, 2) poduszkowate obrzmienie spojówki gałki (chemosis), 3) znaczne rozpułchnienie i jednodajne ciemno czerwone przekrwienie spojówki, przez co zacierają się kontury gruczołów Meiboma, 4) obfita wydzielina, która w pierwszych 2—3 dniach bywa brudno krwawa, łatwo krzepnąca, do opłuczyn mięsnych podobna, później zmienia się na ropną. Wydzielina ropna w odróżnieniu od kataralnej nie uклада się w nitki, ale miesza się jednodajnie ze łzami. W wątpliwych przypadkach rozstrzyga obecność rzerzączki części rodných lub wykazanie gonokoków w wydzielinie spojówkowej.

Rokowanie zawsze wątpliwe, grozi bowiem zropienie rogówki przebiegające pod formą wrzodu lub abscesu. Rzadszą i mniej niebezpieczną komplikacją jest łuszcza, wydarzająca się jednak w późniejszych dopiero okresach.

Leczenie: Przedewszystkiem uchronić drugie oko od infekcyi suchym opatrunkiem (na oko zwitek waty, który pokrywa się owalnym płatkami borlintu, od biedy zwykłego płótna lub ce ratki, brzegi przytwierdzić do skóry kolodyonem, na to założyć zwykły monoculus). Opatrunek ten zmieniać należy co dzień tak długo, dopóki przez leczenie nie usuniemy wydzieliny ropnej z oka chorego.

W okresie I (wydzielina surowicza) wskazane przepłukiwanie co $\frac{1}{2}$ godziny worka spoj.

sublim. 1:5000 tudzież okłady lodowe stosowane przez dzień i noc, a zmieniane co parę minut. Wobec gwałtownych bólów 6—8 pijawek na skroni.

Z chwilą, gdy wydzielina przybiera charakter ropny (II lub III dzień choroby) przystąpić do energicznego kauteryzowania 2%—3% roztworem nitr. argenti. Lapisować wystarcza 1 raz dziennie — w cięższych przypadkach, gdy strup po lapisie się oddzielił, nawet 2 razy dnia. Gdy nastąpił wrzód lub absces rog. zrazu (obok lapisowania) atropinę, gdyby jednak wrzód głęboki groził przebicciem $\frac{1}{2}$ % eserynę lub 2% pilocarpinę.

Przy odwijaniu powiek zachować jak największą ostrożność, unikać ugniecenia oka lub dotykania rogówki. Gdyby delikatne odwiniecie powiek wobec wrzodu rogówki było niemożliwe, ułatwi to i na przebieg wrzodu korzystnie wpłynie rozcięcie zewnętrznego kącika powiek (kantoplastyka prowizoryczna).

W przypadkach lekkich, lapisowanie usuwa doszczętnie chorobę, w cięższych, pozostaje przerost spojówki znany pod nazwą: conjunctivitis blennorrhöica chronica, przypominający trachoma papillare. Wówczas przejść należy do tuszowania siarkanem miedzi.

306. Arg. nitr. crist. 2'00—3'00,
Aqu. dest. 100'00.
Dtr. in vitro nigro.

DS. Lapis.

Conjunctivitis blennorrhöica neonatorum.

Śluzoropotok noworodków różni się od takiejże choroby dorosłych tylko łżejszym stopniem objawów zapalnych i łagodniej-

szym przebiegiem. Czas występowania 2—5 dni po urodzeniu się. Charakterystycznym jest tylko brak okresu wydzieliny surowiczej. Wydzielina jawi się tu odrazu w formie ropnej, do gęstej śmietany podobna. Leczenie jak u dorosłych.

Dla zapobieżenia chorobie w każdym przypadku fluor albus urodzących, antyseptyczne przestrzykiwania pochwy, u noworodków zaś wnet po przyjściu na świat zapuszczenie do oczu kropli 1—2⁰/₁₀ lapisu.

Conjunctivitis blennorrhöica chron. aegypt. (Trachoma).

Leczenie: w formie ostrej, względnie rzadkiej (obrzęk powiek, chemosis, w rozpułchnionej spojówce powiek drobne, głęboko ukryte ziarna jaglicowe) okłady lodowe, częste przepłukiwanie roztworem sublimatu (1:5000) głównie jednak lapisowanie 1—2⁰/₁₀ roztworem. Po ustąpieniu objawów ostrych leczyć, jak formę chroniczną.

Leczenie jaglicy chronicznej zależy od każdorazowego okresu choroby. W każdym przypadku, gdy spojówka jest rozpułchniona a wydzielina obfita, należy rozpocząć od lapisowania. Z ustąpieniem zbytniej wydzieliny przechodzi się o usunięcie zmian przerostowych (ziarna i przerosty brodaweczki). Środki do tego służące są następujące:

1) Systematyczne tuszowanie cum cupr. sulf. in subst. tak długo, aż spojówka nie stanie się gładką i bladą. Środek ten jednak może być przeciwwskazany chwilowo, jeżeli wystąpi świeży infiltrat, wrzód lub ostra łuszcza wśród żywego nastrzykania rzęskowego. Wówczas wrócić do lapisu, aż do

ustąpienia nastrzykania rzęskowego.

2) Gdzie przeważają ziarna jaglicowe a są powierzchowne, najkorzystniej zastosować wygniatanie bądź to przez uciskanie ziarenka chwyczonego pomiędzy paznogiowe powierzchnie obu palców dużych, bądź też osobną „ad hoc” pensetą Knapa. Po wygnieceniu, które czasem wypadnie powtórzyć, okłady lodowe, przestrzykiwanie sublimatem a po kilku dniach powrót do leczenia zwykłego (lapis względnie cuprum).

3) Nielicznie rozsiane a do wygniecenia za głębokie lub zbyt młode ziarna jaglicowe, można pojedynczo wypalać galwanocauterem Sattler-Niedena.

4) W przypadkach ciężkich, opierających się leczeniu powyższymi środkami przy znacznym przerostcie załamka, skraca znacznie przebieg wycięcie częściowe załamka wedle Heisratha. Metoda ta, jakkolwiek ma swoich przeciwników, wolna jest przy umiejętnym wykonaniu od wszelkich szkodliwych następstw.

W przypadkach lekkich lub na ukończeniu leczenia, można pędzlować cum plumb. acet. (cave przy wrzodach) lub zasypywać proszek tanninowy z kw. berylowym w stosunku 1:3. Gdzie niemożliwym jest leczenie przez lekarza, wskazanem jest przynajmniej zapuszczenie roztworu cupr. sulf. lub tanniny.

307. *Cupr. sulf. 1⁰⁰,*

Glycerini puri 15—20⁰⁰.

DS. Krople do oczu.

(1—2 kropel raz dziennie).

Lub też gdzie wskazana ostrożność:

308. *Tannini puri 1⁰⁰,*

Glycerini puri 8—15⁰⁰.

DS. Krople do oczu.

(1—2 kropel raz dziennie).

Dobrze jest zmieniać te środki, aby wykluczyć wpływ przyzwyczajenia. Komplikacje, jak łuszczyca i wrzody nie wymagają zazwyczaj osobnego leczenia. Przyczyną przewleknięcia się komplikacji mogą być następstwa jaglicy, jak distichiasis, trichiasis, blepharophimosis, entropium. Stany te wymagają operacji. Aż do chwili oper. należy baczną zwracać uwagę na rzęsy i często epilować wadliwie rosnące lub wkręcone.

Conjunctivitis catarrhalis.

W przypadkach ostrych i silniejszego stopnia chronicznych, ze znaczniejszym rozpułchnieniem spojówki i wydzieliną obfitą, lapisowanie 1% roztworem nitr. arg. Obecność następowego wrzodu rogówki (ulcus corn. catarrh.) nie zmienia tego leczenia, a nakazuje prócz tego zapuszczać atropinę dla zapobieżenia następowej iritis. Opaska, jak w ogóle w zapaleniach spojówki, przeciwwskazana.

W przypadkach chronicznych, lżejszych, o wydzielinie skąpej, zapuszczenie 2—3 razy dziennie jednej z następujących wód ocznych:

309. *Acidi borici* 1:50,
Aqu. dest. fer. 50:00,
Zinci sulfur. 0:25.

MDS. Woda do ocz.

310. *Collyr. adstr. lut.* 30:00,
Aqu. dest. 20:00,
Detr. ad vitr. nigr.

DS. Woda do ocz. *)

*) Jakkolwiek *Collyr. adstr. lut.* wedle ostatniej farmakopei austr. o połowę jest słabsze niż dawniej, przecież dzięki różnorodnym swym częściom składowym (*Zinc. sulf., ammon. chlor., camphora, spir. vin., crocus*) bez rozcieńczenia za nadto jeszcze silne sprawia pieczenie.

311. *Plumbi acet. perf. neutr.*
0:50—1:00,

Aqu. dest. 100:00.

Solv. filtra.

DS. Woda do ocz.

Octan ołowiu jest przeciwwskazany wobec wrzodów lub złuszczeń przybłonka rogówki, powstałyby bowiem nieuleczalne białe zaćmienia z inkrustacją ołowiem. Używając jakichkolwiek wód ocznych, należy unikać zapuszczania późnym wieczorem.

Wskazanie przyczynowe nakazuje wystrzegać się wszelkich zewnętrznych szkodliwości, jak: kurzu, dymu itp., nadto w przypadkach chronicznych zwrócić uwagę, czy katar spojówki nie ma lokalnej przyczyny w innych cierpieniach, jak blepharadenitis, blennorrhoe sacci lacr., ectropium, distichiasis, u starszych wreszcie złogi wapniste w gruczołach Meiboma. Wówczas obok zwykłego, wskazane leczenie przyczynowe.

Conjunctivitis crouposa.

Jest to tylko silniejszy katar oczny z wypociną krępną w postaci szarej błonki włóknikowej na powierzchni spojówki. Wydarza się wyłącznie niemal u dzieci.

W okresie tworzenia się błonek unikać kauteryzowania, a polecić tylko zapuszczanie co 2—3 godz. roztworem sublimatu 1:5000 lub 3% kwasu borowego obok okładów lodowych (3—6 razy dziennie po 1 godz.). Gdy po kilku dniach błonki się oddzielią, leczyć jak zwykły katar ostry.

312. *Acidi borici* 3:00,
Aqu. dest. 100:00.

DS. Woda do ocz.

313. *Sublim. corros. 0·02,*
Aqu. dest. 100·00.
 DS. Woda do 6cz.

Conjunctivitis diphtheritica.

Jest to najniebezpieczniejsza z chorób ocznych, u nas na szczęście rzadka, częstsza w północnych Niemczech.

Leczenie: pierwszym zadaniem odosobnienie chorego dziecka. W okresie infiltracji (deskowato twardy obrzęk powiek, naciek brudno szary w spojówce, zdjąć się nie dający) leczenie przeciwzapalne i antyseptyczne, jak w conjunctivitis blenorrhoeica: przestrzykiwanie pilne sublimatem i okłady lodowe, jednak mierne i bez przesady stosowane. Francuscy okuliści radzą nadto pomazywanie spojówki sokiem cytrynowym. W okresie ropienia i exfoliacji błon dyft., lapisowanie 2% roztworem lub co lepiej cum lapide mitigato w miejscach już od błon wolnych. W stadium zbliźniowacenia zmniejszają dolegliwości środki osłonne, jak mleko i maść borowa.

Conjunctivitis follicularis.

Cierpienie to przypominające I okres jaglicy da się jednak odróżnić na podstawie:

1) umiejscowienia na dolnej tylko spojówce, 2) dla regularnego ułożenia mieszków limf. wszeregach, 3) powierzchownego ułożenia i barwy różowawej.

Leczenie: pędzlowanie 2% Acet. plumb., po czym obficie wodą spłukiwać. W łżejszych przypadkach zapuszczanie 2—3 razy dnia 1/2% plumb. acet.

314. *Plumb. acet. neutr. 2·00,*
Aqu. dest. 100·00.
Filtra.

DS. Do pędzlowania.

Conjunctivitis e combustione cum calce.

Sparzenie wapnem przedstawia obraz podobny do dyfterii spojówki. Charakterystycznym jest mleczno białe zazwyczaj nie wyjaśniające się zaćmienie rogówki, o ile ta sparszona została. Pierwszym zadaniem lek. jest wydobyć starannie łyżeczką Daviela szczątki wapna, kryjące się w fałdach spojówki, przy czem unikać wszelkiego splókiwania, prócz chyba roztworem cukru trzcinowego, który zubożnia wapno. Dla usunięcia bólów i objawów zapalnych okłady lodowe obok zapuszczania w pierwszych dniach 3—5% kokainy, w razie potrzeby z dodatkiem atropinu, na strupy zaś oparzelinowe zasypywanie jodoformu.

315. *Cocaini mur. 0·3—0·5,*
Aqu. dest. 10·00.

DS. Krople do 6cz.

316. *Jodoformi subtil. pulv.*
5·00.

DS. Proszek do 6cz.

W okresie zabliźniania rozrywać końcem tępej sondy świeżo powstające zrąsty, aby zapobiec symblepharon. W razie, gdyby takowe mimo to wystąpiło, operacya.

Croup vide Laryngitis croup.

Cystitis.

Spokój, ciepłe okłady, ciepłe kąpiele. Przeciw gorączce chinin, w dreszczach napoje rozgrzewające (herbata, odwar lipowego kwiatu), wobec silnych bólów na międzykrocze pijawki; w parciu na mocznicy w suppositoriach lub lewatywach. Unikanie drażniących na-

pojów i potraw. Uważać na codzienne wypróżnienia. Za napój mleko, Salvator, Giesshübler. Ścisłe przestrzeganie antyseptyki w razie potrzeby katetyzowania.

W ostrych stanach:

317. *Decoct. sem. lini e 10'00*
ad 200'0,

Trae laud. simplic. gtt. XIV,

Aq. laurocer. 10'0,

Syr. diacodii 20'0.

MDS. Co godz. łyżkę.

318. *Aq. calcis 100'0.*

S. Pół na pół z mlekiem wypić 3 r. dnia.

319. *Mixt. gummos. 20'0,*
Trae laud. simpl. gtt. XV,
Aq. dest. 100'0.

SM. DS. Co 2 godz. łyżkę.

320. *Fol. urae ursi*
Herb. herniar āā. 20'0.

M. f. s. S. Herbata.

321. *Lupulini 0'20,*
Tannini p. 1'0,
Sacch. albi 2'0,
Mfp. div. in dos. Nr. V.

S. S. Co 3 godz. proszek.

322. *Plumbi tannici 1'0,*
Sacch. alb. 5'0,
Mfp. div. in pp. aeq. Nr. X.

S. Co 3 godz. proszek.

323. *Extr. aq. Arenar. rubr. 4'0,*
Pulv. liquir. q. s. ut f. pill.
Nr. 20.

S. 3 pigułki dziennie.

Przy silnych bólach i parciu na mocz:

324. *Morphii muriat. 0'05,*
Butyri Cacao q. s. ut f. supp.
Nr. III.

S. Czopki.

225. *Cocaini muriat. 0'10,*
Butyr. Cacao q. s. ut f. supp.
Nr. III.

S. Czopki.

326. *Tannini puri 1'0,*
Camphor. rasae 0'50,
Sacch. albi 2'0,
Mfp. div. in dos. Nr. X.

S. 3 proszki dziennie.

Gdy opiaty i garbnikowe przetwory są źle znoszone — wtedy

327. *Extr. cannab. indic. 0'30,*
Sacch. alb. 5'0,
Mfp. div. in dos. aeq. Nr. X.

S. Co 3 godz. proszek.

328. *Extr. hyoscyami 0'50,*
Sacch. alb. 5'0,
Mfp. div. in dos. Nr. X.

S. Co 3 godz. proszek,

329. *Saloli,*
Sacch. alb. āā. 5'0,
Mfp. div. in dos. Nr. V.

S. Co 2 godz. proszek.

330. *Betoli 0'40,*
Dent. tal. dos. Nr. X.

S. 3 pr. dziennie.

331. *Natrii salicylici 1'0,*
Dent. tal. dos. Nr. X.

S. 4 pr. dziennie.

Jeśli cystitis powstała w przebiegu wiewióra — wtedy

332. *Ol. ligni santali gtt. X,*
Da in capsal. gelatin tal. dos.
Nr. XXX.

S. 3 r. dnia po 2 kapsułki.

333. *Bals. Copaivae.*
Ol. Terebinth. āā. 5'0,
Magn. carb. q. s. ut f. pill.
Nr. 50.

S. 2 r. dnia po 3 pig.

334. *Arbutini p. 4'0,*
Aq. destill. 150'0,
Syr. aurant. 15'0.
MDS. W ciągu dnia wyżyć.

W przypadkach przewlekłych po wypróżnieniu zupełnem pęcherza z moczem, przepłukiwania pęcherza zapomocą kateteru następującymi środkami:

334. *Acidi carbolici* 1'0,*Aq. destill.* 200'0.

S. Do przestrzykiwań.

336. *Acidi borici* 3'0,*Aq. dest.* 200'0.

S. Do przestrzykiwań.

337. *Kali hypermang.* 0'10,*Aq. destill.* 200'0,

S. Do przestrzykiwań.

338. *Zinci sulfur.**Alum. crud. pulv.**Acid. carbolici* āā. 5'0,*Aq. destill.* 500'0.

S. Do przestrzykiwań.

339. *Borac. venet.* 5'0,*Aq. dest.* 200'0.

S. Do przestrzykiwań.

340. *Pyoctanini coerul.* 1'0,*Aq. destill.* 500'0.

S. Do przestrzykiwań.

Wobec cystitis ropnej:

341. *Argenti nitr.* 0'20—0'40,*Aq. destill.* 400'0,

S. Do przestrzykiwań.

342. *Resorcini* 3'0 5'0,*Aq. destill.* 100'0.

S. Do przestrzykiwań.

343. *Antinosini* 1'0,*Aq. dest.* 500'0—1000'0.

S. Do przepłukiwań pęcherza.

Wobec przewłocznego nieżytu szczy pęcherza, leczenie miejscowe zapomocą kateteru Ultzmana, lub zapomocą supposit. wprowadzanych zapomocą przyrządu Dittla (porte remede) n. p.:

344. *Arg. nitrici* 0'10,*Butyri Cacao q. s. ut f. supp. urethr. brev.* Nr. V.

S. Czopki.

Delirium tremens pot. zob. alcoholismus.

*Kalendarz lekarski. 1898.***Diabetes insipidus.**

Pożywna dyeta, mierne użycie napojów. Leczenie hydropatyczne, pobyt w górach. Kąpiele morskie, przetwory bromowe.

345. *Infus Valerian* e 5'00,

ad 100'00,

Natri bromati 1'00,*Syrup* 15'00.

MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

346. *Codeini phosphor.* 0'10,*Syr. simpl.* 30'00.

MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.

(Dla dziecka 10 lat).

347. *Camphor. monobrom.**Extr. Valer. āā.* 5'00,

ut f. l. ar. pil. N. 30.

S. 2—3 pigułek dziennie.

Diabetes mellitus.

Tylko pożywienie złożone z mięsa, jaj i mleka, to ostatnie jeżeli procent cukru nie wysoki. Tłuszcze nie są zabronione.

Chleba najwyżej 100—150 grm. na dzień, z jarzyn wolno szpinak, sałatę, zielony groszek i fasolkę, kalafior, szparagi, kapustę; z mącznych jedynie trochę ryżu. Do picia: kawa, herbata osłodzona saccharyną, która nawet w większych ilościach nie szkodzi, kwaskowate wina, wódka, cognac, woda.

Jeżeli przy dyecie mięsnej występują zapady i grozi choremu coma diabeticum (badać mocz półtorachlorkiem żelaza), to podawać wtedy większe ilości sody w wodzie sodowej lub Gieshüblerze.

Z lekarstw najlepiej jeszcze działa woda Karlsbadzka, potem Vichy, Neuenahr, spore dawki opium do 1'0—2'0 pro die.

348. *Acid. lacticum* 5'00—10'00
pro die.

349. *Acid. carbol.* 5'00,
Aqu. dest. 150'00,
Aqu. menth. pip. 50'00.
DS. 3—4 łyżeczki na dzień.

Według Ebsteina:

350. *Antipyrina* 2—3'00 pro die.

351. *Codeini* 0'10,
Dtal. dos. N. XX.
S. Na dzień 3—4

lub

352. *Opii puri* 0'50,
Natr. bicarb. 5'00.
Mfp. Div. in dos. N. XV.
S. 3—4 na dzień.

353. *Extr. fol. Myrtillor* 5'00,
Extr. et pulv. Gentian q. s.
f. pil. N. 50.
S. Od 3 pig. dzien. do 10—12
lub (*Pill. Myritill. Jasper*).

354. *Jodoformii*
Extr. lactucae sativ. āā. 1'00,
Cumarin 0'10,
M. ut f. pill. N. XX.
S. 2—3 pigułki na dzień.

355. *Pilocarpini mur.* 0'10,
Aqu. dest. 10'00.
DS. Podskórnice $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.
Do osłodzenia płynów używa
się pigułek z saccharyny.

356. *Saccharini* 3'00,
Natri carb. sicc. 2'00,
Manniti 50'00,
f. pill. N. 100.
S. Pigułek na $\frac{1}{2}$ —1 szklankę
płynu.

357. *Lith. salicyl.* 5'0,
Lith. benzoic. 10'0,
Succ. et pulv. liquizit. q. s.
ut f. pill. N. centum.
S. 5—6 pigułek dziennie.

358. *Flor. benzoos*
Pulv. gummos. āā. 2'0,
M. u. f. p. Div. in dos. N. X.
S. Co 3 godz. proszek.

W razie coma diabeticum środków podniecające, wstrzykiwanie eteru, ciepła kąpiel ze zlewaniem głowy zimną wodą.

Diathesis urica zob. Arthritis urica.

Dilatatio ventriculi.

Gdy przyczyną cierpienia jest zwężenie odźwiernika bliznowate, lub nowotworowe, wskazany jest zabieg operacyjny.

Chwilową poprawę osiągnąć można przez systematycznie, dłuższy czas stosowane przepłukiwanie żołądka, raz lub 2 razy dziennie rozczynem kw. borowego lub salicyl. resorcyny, lub w razie oddziaływ. kwaśnego rozczynem sody, soli lub wody karlsbadzkiej.

W razie bólów wskazane są środki odurzające i to lepiej podskórnice niż wewnętrznie, gdyż w wypełnionym i rozszerzonym żołądku trudno ulegają wessaniu.

W razie, gdy przyczyną cierpienia jest zwioteżenie ścian żołądka, należy przepisać dietę pożywną, w małych ilościach a często podawaną z wykluczeniem o ile możliwości płynów; co dzień na czczo uwolnić żołądek zapomocą aspiratora żołądkowego od zalegającej treści, a w razie towarzyszącego nieżytu żołądka, takowy stosownie leczyć.

Skutecznie też działają zabiegi wodolecznicze, mięsienie i prąd indukcyjny, w okolicę żołądka stosowane.

W celu wzmocnienia mięśni żołądka: *ipecacuanha* 0'02—0'05 w przeciągu 24 godz., raz w pół godziny po jedzeniu, drugą dawkę (0'01) po całej godz. *Extr. Belladon.* po 0'01—0'02 na dawkę.

Przy zaparciu stolca: przed jedzeniem dwie łyżeczki: Sul-

phat Magnes., Cremor tartari, et flor. sulphur. aa. p. aeq. Lewatywy z gliceryny. Jeżeli po jedzeniu występują bóleści, poleca się 2—4 łyżek wody chloroformowej lub morfinę z magnezją lub sodą. Przeciwnie wzdęciu: kre-
da, węgiel, magnesia w bardzo małych ilościach.

Diphtheritis zob. angina diphtheritica.

Dysmenorrhoe.

Wykazanie przyczyny (przyczyna mechaniczna, dalej, czy przyczyna w macicy; czy w jajnikach). Unikać ruchu bezpośrednio przed i podczas peryodu, zaziębienia, szkodliwych wpływów moralnych. Regulować dietę. Jeżeli chora niedokrewna lub skrofaliczna, odpowiednie leczenie stanu chorobowego ogólnego. Leczenie kąpielowe: Iwonicz, Rabka, Krynica, kąpiele borowinowe, (Mattoniego sól borowinowa).

Podczas bóleści spokój, suche ciepło na okolicę podbrzusza, środki kojące jak: lewatywa z Tra. opii simpl. (15 kropli na lewatywę albo Chloral hydrat (1'0) na lewatywę). Czopki do kiszek stolcowej, zawierające opium lub morphium, wstrzyknięcie morphiny pod skórę, u osób silnych, krwistych, po jed-
nej pijawce, na wewnętrznej powierzchni obu ud.

W cięższych przypadkach należy zbadać dokładnie miejscowo narząd płciowy przez odbytnicę, albo jeżeli możebne przez pochwę i leczyć, jak u osób zamężnych.

Najczęstsza przyczyna bole-
snego miesiączkowania, bywa niedrożność przewodu szyi ma-
cicy.

Niedrożność pochodzi może ze zmiany położenia macicy jak np. zagięcia tejże, z wrodzonej wąskości przewodu, z krętego przebiegu tegoż.

W tych razach u mężatek zazwyczaj napotykamy równocześnie niepłodność.

W przypadkach takich wskazanem jest leczenie mechaniczne, polegające na wyrównywaniu zagięcia macicy, na rozszerzaniu przewodu szyi macicy sposobem łętym, wprowadzaniu zgłęb-
nika lub rozszerzaczy na ten cel zbudowanych, do jamy macicy. Jeżeli te sposoby nie prowadzą do celu, wskazanem jest rozszerzenie macicy sposobem krwawym (Hysterostomia).

W ostatnim czasie polecają:
Elektryzowanie według metody Apostolego.

359. *Extr. hydrast. canad. fluid.*

2 razy dziennie po 25 kropli na 8 dni przed regularnością.

360. *Chloral hydrat. 8'00,*

Kali brom. 16'00,

Aqu. camphor. 200'00.

S. Co 2 lub 4 godz. łyżeczkę.

361. *Trae thebaicae*

„ *belladonae*

„ *hyoscyami*

„ *valerianae*

„ *Stramoni aa. 10'00.*

S. 3—4 razy dnia po 15—20 kropel.

Francuscy autorowie polecają:

362. *Kali bromati*

Antipyrini aa 10'0,

Extr. viburni prunifol. fluid. 20'0,

Aq. destill. 120'0

Syr. cort. aurantiae aa. 30'0.

DS. 2—4 łyżek dziennie.

Polecają też czopki.

- 363.** *Extr. opii aquos.* 0·02,
Extr. belladonnae 0·01,
F. st. art. supposit.
 S. Czopki.

Dysenteria.

W czasie epidemii unikać nie-
 stosownego pożywienia. Ścisła
 desinfekcja wypróżnień. Chorzy
 powinni leżeć w łóżku, miesz-
 kanie przewietrzać.

Dyeta ścisła, kleik, rosół, mle-
 ko. Słabszym można dozwolić
 bulion z jajem, wyciągów mię-
 snych, wina.

Oseski zostawić przy piersi,
 karmiąc regularnie co 3 godziny.

Leczenie rozpocząć należy od
 środków przeczyszczających, Ca-
 lomel. Ol. ricini, dorosłym 2—4
 łyżek dziennie.

Później środki ściągające, miej-
 scowe przepłukiwania kiszki le-
 tniemi rozcżynami. Starcia około
 odbytnicy troskliwie oczyszczać
 i zasypywać pudrem salicylo-
 wym.

Codziennie kąpiel ciepła, do-
 rośli jedną dziennie. Ciepłota ką-
 pieli 27° przez 5—10 minut. Ó-
 kłady wysychające, kataplazmy,
 zawijania ciepłe sprawiają ulgę.

- 364.** *Ol. ricini* 50·0,
 MDS. Dwie łyżki zażyć.

- 365.** *Calomelanos* 0·05,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtr. tal. dos. N. VI.
 S. Co godz. proszek.

Jeżeli stolce nie zawierają już
 kału, można podawać opium ze
 środkami ściągającymi, jednak
 po paru dniach znowu środek
 przeczyszczający.

- 366.** *Acidi Salicyl* 10·00,
Opii pulv. 0·20,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. 3—4 proszki dziennie.

- 367.** *Natri Salicyl* 0·50,
Laudani 0·05,
Mfp. Dent. tal. dos. N. X.
 DS. 3 pr. dziennie.

- 368.** *Natri Salicyl* 5·00,
Aqu. dest. 80·00,
Trae laud. gtts. X.
Syrup simpl. 20·00.
 MDS. Co 3 godz. łyżkę.

- 369.** *Saloli p.* 5·0,
Bismuth. salic. 2·0,
Mfp. Div. in dos. N. X.
 S. 3 proszki dziennie.

- 370.** *Rad. Rhei* 6·0,
Rad. ipec. 2·0,
Inf. Aq. fervid. q. s. ad
colat. 120·0
adde

Gumi arab. 4·0,
Syr. althaeae 30·0.
 S. Co godz. łyżkę.

Do lewatywy używa się: sól
 kuchenna (0·5%), *Acid. salicyl.*
 (0·5%), *Thymol* (0·10%).

- 371.** *Argenti nitrici* 0·05,
Aqu. dest. 200·00.
 DS. Na 2 razy w lewatywie
 zastosować
 lub

- 372.** *Tannini* 5·00,
Aqu. dest. 500·00.
 S. Na 2 lewatywy.

- 373.** *Liquor. alum acet.*
Aqu. dest. aa. 100·00.
 DS. Na 2 lewatywy.

Po lewatywach jakoteż w ra-
 zie silnego parcia dać czopki:

- 374.** *Butyri Cacao* 0·50,
Trae opii guttam
Mf. supposit.
 S. 2—3 r. dziennie.

- 375.** *Extr. bellad.* 0·10,
Morphii mur. 0·05,
Butyr Cacao q. s. f. sup.
N. V.
 S. 1—2 czopków dziennie (do-
 rośłym).

W przypadkach przewlekłych podawać dalej lewatywy i środki lekko ściągające.

W razie zapadu: Cognac, wino, kamfora, eter.

W okresie zdrowienia przechodzić z wolna do pokarmów: jaja, skrobane mięso itd.

Dziecom:

376. *Bismut. Salicyl* 1'00,
Pulv. Doveri 0'20,
Sacchari 2'00,
Mfp. div. in dos. N. X.
DS. 3 pr. dziennie.

377. *Chinini tannici*
Bismuti salicyl. āā. 1'00,
Laudani 0'10.
Mfp. div. in dos. N. X.
S. 3 pr. dziennie.

Dyspepsia.

Przedewszystkiem wykryć przyczynę cierpienia i dokładnie zbadać funkcyę żołądka i kiszek.

Cierpienie to najczęściej stoi w związku z czynnościowem, nadmiernem wydzielaniem soku żołądkowego, lub z niedomogą wydzielniczą żołądka.

Stosownie do tego w 1-szym przypadku wskazane są środki alkaliczne, wody: Karlsbad, Vichy, Szczawnicka Magdalenka, w 2-gim kwas solny i środki gorzkie.

W innych razach zboczenia w wydzielaniu soku żołądkowego nie ma, tylko błona śluzowa żołądka jest nadezulą, a w tych przypadkach należy przed jedzeniem podawać środki znieczulające (cocaina) i zapomocą przepłukiwań żołądka zmniejszać przeczulicę błony śluzowej, można też podawać przetwory bromowe.

Prócz tego należy zwrócić uwagę na ogólny stan chorego,

u anemicznych wskazane są środki żelaziste (Krynica, Żegiestów, Francensbad i t. d.) u neurastyków i hysteryczek skutecznem bywa leczenie wodolecznicze, wyjazd nad morze lub w góry.

378. *Natri bicarbon.*

Magn. carbon.

Kali carbon. āā. 5'00,

Pulv. rad. Rhei 7'00,

MD. in scatula.

S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć, w razie jeżeli jest nadmierne wydzielanie soku żołądkowego.

379. *Sal. therm. Carolin* 100'00.

DS. Co dzień rano łyżeczkę w pół szklance ciepłej wody.

380. *Strontium brom.* 2—3'00.

Po obiedzie i po kolacyi.

W razach niedomogi wydzielniczej:

381. *Acid. hydrochl.* 3'00.

Pepsini German. solub de
Rostock 2'00,

Aqu. dest. 150'00,

Syr. simpl. 15'00.

MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

382. *Acid. hydrochl. dilut.*

Trae absinthi āā. 15'00.

DS. Po każdym jedzeniu 20 kropel w łyżce wody zażyć.

383. *Orexin basic.* 0'30,

Dent. tal. dos. N. 5.

S. Jeden proszek rano zażyć.

U anemicznych z niedomogą wydzielniczą:

384. *Sol. Fowleri* 5'00,

Tinct. mal. ferri 10'00.

DS. Po obiedzie i kolacyi od 10—30 kropel.

385. *Trae ferri pomati* 25'00,

Trae Rhei vinosae

Trae amarac āā. 15'00.

MDS. 3 razy dnia po łyżeczkę zażyć.

- 386.** *Ferri carb. sacchar.* 5'00,
Extr. nucis vomicae 0'50,
Pulv. et extr. Rhei āā. q. s.
ut f. pill. N. 100.
 DS. 3 razy dnia po 2 pigułki
 zażyć.

u osesków

Regularne karmienie, jeżeli przyczyną mleko krowie, wrócić do piersi, lub w miejsce tego kleik jęczmienny, owsiany, woda cukrzona z białkiem, rosół cielecy.

Z poprawą stolców zwiększać ilość mleka. Jeżeli są odbijania, czuć kwas z ust, wymioty, stolce serowate: *Calomel* (0'01—0'03) lub *Natrum benzoic.* (3%) co 2 godziny łyżeczkę.

W razie wzdęcia bolesnego, wprowadzić kankę lub kateter do odbytnicy. Jeżeli wymioty nie serowate, cuchnące, wskazują na brak kwasów: *Acid. mur.* (0'30:50'0) lub:

- 387.** *Pepsin* 1'00,
Ac. muriat. gtts. tres.
Aqu. dest. 90'00,
Syr. simpl. 15'00.
 S. Przed pokarmem łyżeczkę.
Papayotin 0'25,
Acidi lactici 1'00,
Aq. dest. 80'00,
Syr. simpl. 30'00.

MDS. łyżeczkę po ssaniu.

- 388.** *Pepsin* 10'00,
Vini Xerens. 300'00,
Acidi mur. 1'00,
Sacch. 20'00.
 MDS. Co 4 godz. łyżeczkę.

W razie nagromadzenia się kału w jelitach. Ol. ricini.

Przy Intertrigo towarzyszącym zmywanie wodą mydlaną.

- 389.** *Magnes ustae* 5'00,
Talci praepar. 20'00,
Acid. salicyl. 0'20.
 MDS. Do posypywań.

U starszych dzieci:

- 390.** *Trae Colombo*
Trae cascarillae āā. 5'00,
Trae bellad. 2'00,
Trae opii gtts. IV.
 S. 5—10 kropel przed jedzeniem.

Eclampsia infantum.

Uwzględnić przyczyny: Początki chorób ostrych i zakaźnych, zimnica, wpływ przestrażu, użycie środków odurzających, przepalenie głowy, kolki brzuszne, niestrawność, robaki, choroby dróg moczowych (phimososis), koklusz, skurez głosiń, ciała obce w nosie, zranienia.

Wśród samego napadu zimne okłady (woda z octem) na głowę co parę minut, lewatywy, gorczyczniki na kark i łydki, w razie długotrwałych drgawek wdychanie chloroformu (ostrożnie!) kilka kropel na chusteczkę trzymać pod nosem. Lewatywy z chlorału.

W razie powtarzających się napadów:

- 391.** *Chloral hydratis* 1'00,
Natri bromati 1'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup sacchari 15'00.
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

- 392.** *Chloral hydratis* 0'50,
Aqu. dest. 80'00,
Mucilag. gum. ar. 20'00.
 MDS. Połowę do jednej lewatywy.

- 393.** *Urethani*
Sacchari āā. 0'20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. V.
 S. Co 2 godziny proszek w łyżeczce wody.

Jeżeli stolce zaparty:

- 394.** *Calomelanos* 0'30,
Sacchari 2'00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 DS. Co godzina proszek.

395. *Kali bromat.* 2'0,
Ammoni brom. 1'0,
Aqua dest. 100'0,
Syr. simpl. 30'0.
 MDS, 4 łyżeczki dziennie.

396. *Moschii* 0'30,
Mirt. gum. 60'0.
 MDS. S. Co $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ godz. łyżecz.

Eclampsia parturent. (Drgawki porodowe).

U ciężarnych okazujących cierpienie nerek, znaczniejsze obrzęki, podawać środki moczopędne (kali aceticum, Acidum benzoicum) środki wypróżniające, środki napotne, mleczna dyeta. Kąpiele ciepłe (36°—38° C.) ostrożnie.

Podczas napadu ułożenie w łóżku otoczonym materacami, aby chorą uchronić od obrażeń; przed wystąpieniem szczękowości, wsunąć język do jamy ust i między szczęki wsunąć kawałek drzewa okrytego płótnem. Ruchów nie krępować. Znieczulić chorą silnymi dawkami narkotyków, morfin podskórnie 0.02—0.03 lub chloral w lewatywie (2'0). Gdy się chora budzi lub napad występuje, ponowić dawkę. Można użyć chloroformu do wdychania, ale tylko wtedy, jeżeli stwierdzić możemy pewną okresowość w występowaniu napadów np. napady występują regularnie co 20 lub 15—10 minut, wtedy minutę naprzód podać chloroform. Po napadzie kąpiel ciepła 30° R., potem zawinąć w prześcieradło i koc, aby wywołać poty.

Podczas ciąży napady mogą ustać i ciąża być donoszona, dlatego tylko w razach, gdy powyższe leczenie niepomaga, napady występują zbyt często, albo grozi obrzęk płuc, wzniecenie porodu przedwczesnego (założe-

nie świeczki elastycznej do macicy, niektórzy radzą przebicie pęcherza płodowego).

Jeżeli napady występują podczas porodu najlepiej chloroformować, można użyć i narkotyków jak wyżej i kombinować jedno z drugim. Podaje się narkotyk, a oprócz tego, ilekrotnie występują objawy zwiastunowe napadu, chloroform. Unikać częstego badania wewnętrznego, aby nie drażnić chorej. Jeżeli są warunki do łagodnego ukończenia porodu, to takowy ukończyć. Zabiegów gwałtownych, w celu rozwiązania rodzącej używać nie należy. Jeżeli napady występują w połogu, postępowanie jak podczas ciąży.

397. *Amyleni nitrosi* 5'0,
Ol. foeniculi 10'0.

MDS. 2—5 kropel do wdychowań na chustec (amylnitrit)

398. *Laudani p.* 0'20,
Sacch. albi 5'0,
Mfp. div. in dos. Nr X.
 S. Co $\frac{1}{2}$ godz. proszek.

Eczema acutum.

Jeżeli można wyszukać przyczynę wyprysku, starać się ją usunąć (pasorzyty skórne, pot, żyłaki, drażnienie skóry środkami żrącymi i t. d.). Zabronić zmywania miejsc chorych wodą. Polecieć obmywanie (eczema papulosum).

399. *Acidi salicyl* 1'00,
Spir. vin. gall. 100'00.

następnie zapudrowanie

400. *Amyli tritici*
Zinci oxydati aa.

Kilka razy dnia.

Jeżeli skóra w obrębie wyprysku obrzękła, zaczerwieniona, okłady:

401. *Liquor Burrowi* 10—25·00,
Aqu. dest. 200·00.

które zmieniać należy co 2—3 godziny.

Te same okłady stosować przy

Eczema madidans.

lub ząstąpić je maściami.

402. *Zinci oxydati*
Amyli tritici āā. 10·00,
Vaselini 40·00.

403. *Acidi borici* 5—10·00,
Vaselini 100·00.

404. *Dermatol* 10·00,
Lanolini 20·00,
Vaselini 70·00.

S. Maść.

405. *Dermatol*
Zinci oxyd. albi āā. 2·00,
Vaselini fl. 20·00.

S. Maść.

406. *Dermatol* 2·00,
Zinci oxyd. albi
Amyli āā. 24·00,
Vaselini fl. 50.

S. Maść.

407. *Tumenol* 5·00,
Flor. Zinci
Bismuti subnit. āā. 2·50,
Unguenti lenientis.
Unguent. simpl. āā. 25·00.

S. Maść.

408. *Alumnol* 10·00,
Lanolini 50·00,
Paraffini liquidi 35·00,
Cerae alb. 5·00.

Mf. ung. S. Maść.

409. *Formalini* 0·25—0·50,
Zinci oxydati,
Talc. venet. āā. 2·50,
Vaselini 50·00.

Mf. ung. S. Maść.

410. *Acidi salicylici* 1·00,
Ung. Zinci oxydati 15·00,
Vaselini fl.,
Lanolini āā. 25·00.

Mf. ung. S. Maść (Lassar).

411. *Amonii sulf. ichthyol* 1·00—
3·00,

Aq. destill.,
Glycerini p.,
Dextrini āā. 10·00.

M. Leni calor. S. Pasta.

W okresie eczema crustosum usunąć strupy zapomocą oliwy waseliny i t. d. Po odpadnięciu strupów, przykładanie maści dw. razy dziennie.

412. *Ung. Diachyli Hebrae.*

lub

413. *Emplastri Diachyli simpl.*
Vaselini āā. 50·00.
S. Maść.

414. *Nosopheni* 2·00,
Zinci oxydati,
Amyl. oryz. āā. 4·00,
Vaselini albi 20·00.
Mf. ung. S. Maść.

W okresie końcowym (stadium squamosum) ograniczyć się do smarowania miejsc zajętych obojętnymi tłuszczami 2—3 razy na dzień i pudru. Jako tłuszczu użyć można: Ungu. emoll. Vaselinum, Glicerynę. W okresie tym można również użyć dziegciu (*Oleum rusci*), jednak uważać trzeba, by nie było nigdzie miejsc sączących; po nasmarowaniu dziegciem, zaopatrzyć jąkaś obojętną maścią.

Eczema chronicum.

Wskazania:

- 1) Usunięcie strupów i warstwy zgrubiałego przyskórka.
- 2) Usunięcie przekrwienia.

W tym celu polecamy ungu. diachylon Hebrae, unguent. emolliens przykładane na kawałkach płótna, które należy dokładnie przymocować za pomocą opasek; dalej empl. saponato-salicylicum 10—20%. Kiedy strupy i zgrubiały przyskórek roz-

miękną, usunąć je przez zmycie spirytusem mydlanym, mydłem szarem i t. d.

W celu usunięcia przekrwienia:

415. *Olei rusci* 20'00,
Spirit. sapon. kalin. 50'00,
Glycerini 10'00.
S. Zewnętrznie.

416. *Olei fagi* 10'00,
Glycerini 5'00,
Unguenti emoll. 50'00,
Balsami peruv. 2'50.
S. Zewnętrznie.

ównie dobrze można polecić *Tinctura rusci*.

Eczema capillitii.

Strupy rozmiękczyć przez smarowanie głowy tranem, oliwą; rozmięczone usunąć przez codziennie umywanie głowy c. spirit. sapon. Kalinus. Kiedy wyprysk przejdzie w stadium squamosum *tinctura rusci*, ungu. praecipit. albi 1:10.

Eczema seborrhoicum.

Najczęstsza jego siedzibą jest skóra czaszki, przechodzi jednak na części sąsiednie jak: kark, szyję, twarz. Miejsca zajęte polecić zmywać mydłem np. sapo resorcino-sulfuricum lub resorcino-salicylicum (Eichhoffa), następnie zaopatrzenie maścią:

417. *Resorcini* 1'00,
Ungu. emoll. 50'00.

Eczema impetiginosum faciei.

Usunąć strupy; kiedy sączenie ustąpi, maść Wilsona.

418. *Benzoës pulverisati* 5'00,
Azungiae porci 160'00,
digere, cola, adde
Zinci oxydati 25'00.
Mf. ung. S. Maść.

Emphysema pulmonum.

Przeważnie leczenie symptomatyczne.

Unikanie zaziębień, przemoczenia nóg, w ogóle wszystkiego, co może spowodować lub powiększyć nieżyt oskrzelowy. Główne zadanie leczyć nieżyt oskrzelowy przez pobyt na świeżem górskim powietrzu, picie wód w Ems, Reichenhall, Nauheim, Szczawnicy; na wewnątrz Pulv. Doveri, Amonium muriat, Tannina z morfiną, Stibium sulphurat. aurant. z morfiną, apomorfina, Inf. Ipecacuanhae lub radix Senegae, przetwory balsamiczne jak: Balsam peruv. toltanum, ol. terebinth. terpinol, terpinhydrat (3'00: na 30 pigulek, z tego 1—3 pig. dziennie).

Leczenie w gabinetach pneumatycznych lub za pomocą przyrządów Waldenbura lub Geigla i Majera (Würzburg) lub Schnitzlera, lub w Truskawcu w zakładzie inhalacyjnym.

U ludzi otyłych można polecić picie wód Karlsbadzkich lub Kissingen. Przy osłabieniu akcji serca, podawać obok środków wykrztuśnych i nasercowe. Uważać na wypróżnienia, w razie braku tychże, podać odpowiednie środki.

Dyeta pożywna, ale nie wzdymająca.

419. *Terpinoli* 3'00,
Extr. et pulv. liquor. q. s.
ut. f. pil. N. 30.
S 3—4 pig. dziennie.

420. *Apomorph. hydrochl.* 0.05,
Morphii mur. 0'03,
Acidi mur. gtts. X.
Aqu. dest. 180'00,
Da in vitro nigro.
S. Co 3 godziny łyżkę.

421. *Stibii sulph. aurant.* 0'30,
Morph. mur. 0'10,
Natrii bicarb. 5'00,
Mfp. div. in dos. N. XV.
 S. 2—3 proszki dziennie.

422. *Gutti*
Fol. digit.
Bulb. Scillae,
Stibii sulphur. aurant.
āā. 1'50,
Extr. Pimpinellae q. s. ut. f.
pil. N. 60.

DS. Co 2 godziny pigułkę.

423. *Ol. terebinth.* 2'00,
Aq. menth. pip. 15'00,
Mucil. g. arab. 30'00.
 DS. Co 2—3 godz. łyżkę.

424. *Extr. Belladon.* 0'1,
Pulv. rad. Ipec. 0'2,
Sacch. alb. 3'0,
Mfp. Div. in dos. N. X.
 S. 3 proszki dziennie.

425. *Extr. Hyoscyam.* 0'15,
Aqu. dest. 70'00,
Syr. simpl. 10'00.
 DS. Co 2—3 godz. łyżeczkę.

Przy dyspnoe:

426. *Extr. Quebracho aq.* 5'00,
Aq. destill. 25'00.
 S. Co 3 godz. łyżeczkę zażyć.

427. *Quebrachin* 0'50,
Extr. Glycyrrhizae q. s. ut. f.
pil. N. X.
 S. 4—5 pigulek dziennie.

Endocarditis.

Leczenie objawowe a więc:

Spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna, niepodniecająca. Na okolicę serca okłady zimne lub worek z lodem.

Na wewnątrz cardiaca, zwłaszcza digitalis, strophantus, wraz z bólu mierne dawki morfiny.

Przy znacznem osłabieniu: kawa czarna z cognakiem, wino mocne, kamfora lub eter podskórnym wstrzyknięty. Coffeina

lub Theobromina po 0'10 na dawkę, 1'00 pro die, obok innych środków nasercowych jak Convalaria, Sparteina i t. d.

Przy gorączce wysokiej, mierne dawki antypyretyków, z obawy groźnego zapadu najlepiej razem z Coffeiną lub Theobrominą.

428. *Infus. fol. digit. e* 1'50
ad 150'00,
Coffeini citrici 5'00,
Liquor. Kali acet. 50'00,
Succ. liquir. 10'00.
 S. W ciągu 2 dni użyć.

429. *Tinct. Strophanti*
Aq. lauroc. āā. 10'00.
 S. 3 r. dz. po 10—20 kropel.

W zaparciu stolca:

430. *Pulv. fol. digit.*
Calomelanos āā. 0'40,
Sacchari 3'00,
Mpf. div. in dos. 10.
 S. C 3 godz. proszek (dla dzieci).

Endometritis.

a) Ostry nieżył: spokojne leżenie w łóżku, środki lekko wypróżniające, okłady wysychające na brzuch, wstrzykiwania letnie, zawierające środki desinfekcyjne: Acidum borie. (3:100) Ac. carbolicum (2:100) i t. d. W razie bólów, czopki cum laudano lub cum morphio.

b) Przewlekły nieżyt wymaga jużto leczenia ogólnego w przypadkach niedokrewności, żołądów i t. d., już też leczenia miejscowego.

W tym celu można używać wprowadzania środków żrących przypiekadłem Chiarego, albo za pomocą sondy owiniętej watą i napojonej n. p. cum Tra jodii cum liquore ferri sesquichl. itd. Przeplukiwania macicy za pomocą cewnika Bozemanna, Ols-

hausena, itd. rozczykami: kwasu borowego, karbolowego jak wyżej. Schulze radzi przedtem rozszerzyć macię sposobem tęnym. Wprowadzenie rozczyków silniejszych, jak kwas karbolowy 4%, Cuprum sulphuricum 10% za pomocą rurki Bandla w jego wzierniku do jamy macicy. Wprowadzanie przecika Spiegelberga lub Fritscha owiniętego watą napojoną rozczykiem chloru cynku 10—50%, przyczem należy pod tylną wargę macicy podłożyć watę napojoną 10% rozczykiem sody, aby spływający chlorek cynku nie sparzył bł. śluz. pochwy.

Dawniej wstrzykiwano rozczyzny do jamy macicy strzykawkami Brauna, Mađurowicza. Wprowadzenie do jamy macicy przecików zawierających jodoform, taninę itd. Wprowadzanie do jamy macicy gazy jodoformowej w postaci długiego paska, którego jedna część wypełnia macię, druga zaś sterczy do pochwy.

Gdy te sposoby nie wystarczają, wyskrobanie jamy macicy (Abrasio mucosae).

Owzrodczenia części pochwowej należy goić przyżeganiem zapomocą: nastoju jodowego, azotanu srebrowego w laseczce, Cuprum sulphuricum w kryształach, Acidum nitricum fumans, który się stosuje ostrożnie za pomocą przecika szklanego albo asbestowego. W ostatnich czasach polecają zakładać do pochwy gałki składu:

- 431.** *Europhen* 0.05,
Ol. amygdal. gtt. nonnull.,
Butyr. cacao 2.50,
Mf. globulus vagin. N. I.
(frigid parat).

lub tampony posypane proszkiem

- 432.** *Europhen* 5.00,
Aristol. 4.00,
Mf. pulv. D. in scatul.
 S. Proszek do tamponów.

W przypadkach dawnych owzrodczeń z przerostem gruczołowym, najlepiej wyskrobać ostrą łyżeczką dno wrzodu i przypieć następnie, do czego użyć można ferrum candens, thermocauter Paquelina, Galvanocauter.

Enteritis follicularis.

Odstawione dzieci wrócić do piersi. Śmietana Biederta lub zupa Liebiga za pokarm. Kleik jęczmienny, kawa żółędz., kakao.

Przeplukiwanie jelit 1% wodą słoną, Liquorem alum. acetici aa. c. Aq. Toż i na wewnątrz.

- 433.** *Liquor. alum. acet.* 30.00,
Aq. dest. 50.00,
Syrup 20.00.

S. Co 2 godz. łyżeczkę.

- 434.** *Bismut.* 0.10—0.20 pro dosi
 3—4 r. dziennie.

- 435.** *Chinin tannic.* 0.05—0.10
 pro dosi.

W razie bólesci i parcia Extr. opii aq. 0.01 pr. dosi, 3—4 r. dz., Tra opii według wieku.

Enterocatarrchus zob. Catarrhus intestini.

Enuresis nocturna.

Uwzględnić powody: Ascaridy, Oxyuris, Phimosi, pavor nocturnus, zboczenia w odżywieniu, Onania.

Zimne obmywania, kąpiele nasiadowe chłodne od 5—20 minut, na wieczór, wstrzymywać od napojów. Polecać przez dzień wstrzymywać moc.

Polecają unikać spania na wznak, lub tak ułożyć pacjenta,

aby była podwyższoną miednica. Prąd stały, a mianowicie wprowadzić wazką elektrodę metalową (nasmarowaną oliwą) do odbytnicy (u dziewcząt do pochwy) drugą elektrodę zwilżoną na spojenie kości łonowych lub perineum, prąd słaby można zwolna wzmacniać — elektryzować przez 5 minut. Antypyrina po 0:50—1:00 na noc między 9 a 11 godziną przez 14 dni z rzędu.

436. *Atropin sulphur.* 0:05,
Aqu. dest. 30:00.

DS. Po tyle kropel ile dziecko ma lat, o 4 i 7 g. wieczorem.

437. *Extr. chinæ aqu. sic.* 5:00,
solve in
Aqu. dest. 100:00,
Natri bromati 2:00,
Trac bellad. gtt. X.
Syrup sacchari 20:00.

MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

438. *Extr. bellad.* 0:05,
Extr. nuc. vomic. 0:10,
Sacchari 2:00,
Mfp. div. in dos. N. X.

DS. Na noc jeden proszek.

439. *Strychnini nitrici* 0:001,
Sacchari 10:00,
Mfp. div. in dos. aequal.
N. XX.

S. Na noc proszek.

440. *Extr. fluid rhuris arom.*
10:00.

S. 5—10 kropel 2 razy dziennie podawać we wodzie.

441. *Trac rhuris arom.* 10:00.
S. 2 razy dnia 10—15 kropel.

W razie nadezłości pęcherza, podać na noc Chloral na wewnątrz lub też w lewatywie. Polecają też przyszczydła przyłożyć na kark.

Skrofulicznych i źle odżywionych leczyć zarazem chininą i środkami żelazistymi.

442. *Ferratini* 0:20,
in pastill. compress. fabric.
L. Marcisiewicz (Cracoviae).
S. 1—2 past. dziennie.

Ephelides (piegi).

Cheąc piegi szybko usunąć, należy przez 4 godziny miejsca zajęte piegami zmywać sublimatem.

443. *Mercur. sublim. corros.*
0:50,
Aq. destillat. 50:00.

S. Do zmywania.

A objawy zapalenia skóry leczyć następnie zasypywaniem pudru ryżowego. Zamiast tego można polecić zmywanie twarzy mydłem sublimat. 1% i wcieranie na noc:

444. *Acidi salicylici* 2:00,
Sapon virid. 3:00,
Vasellini fl. 20:00.
Mfp. S. Maść.

Można użyć także:

445. *Natrii biboracici* 15:00,
Kali carbonici 5:00,
Aq. rosar.
Spir. Colon. āā. 80:00.
Nacierać na noc — rano zmyć.

446. *Zinci oxydati*
Mag. Bismuth.
Hydrarg. praec. alb. āā. 3:00,
Lanolini 5:00,
Vasellini 35:00.
Mf. ung. S. Maść.

447. *Merc. praec. alb.*
Borac. venet. āā. 5:00,
Ung. emoll. 50:00,
Ol. rosar.
Ol. naphae āā. gtt. V.
Mf. ung. S. Maść.

448. *Naphtoli* 2:00,
Glycerini 1:00,
Spir. sap. kal. 50:00,
MDS. Zewnętrznie.

449. *Boracis* 15·00,
Kali carbon. 5·00,
Aq. Aur. flor.
Spir. Colon. āā. 75·00,
Talci praep.
Zinci oxyd. āā. 3·00,
 MDS. Zewnętrznie.

450. *Sulfur. praecip.* 10·00,
Camphor. 1·00,
Muc. q. arab.
Aq. calcis,
Aq. rosar. āā. 100·00.
 S. Zewnętrznie.

Epididymitis.

Zaprzestać leczenia miejscowego rzeżączki. Spokój w łóżku, ustalenie i podniesienie jąder zapomocą ręcznika, chustki; dyjeta, wolne wypróżnienia. W razie bardzo silnych bólów wstrzyknięcie morfiny. Miejscowo okłady zimne, jeżeli ich chory nie znosi, a nawet bóle się wzmagają, przejść do okładów ciepłych z maki siemienia lnianego. Przy lżejszych stopniach zapalenia przyjadrza chory nie potrzebuje leżeć. Polecieć suspensorium Horand-Langleberta, które ustalając bardzo dokładnie jądra, chroni od bólów i pozwala pacjentowi oddawać się swoim zajęciom. Przy tem leczeniu objawy zapalenia ostrego mijają zwykle w ciągu 4—6 dni. Dalszem zadaniem leczenia jest usunięcie nacieku przyjadrza. W tym celu okłady wysychające z *Liquor Burrowii* (uważać, by nie wywołać wyprysku na skórze moszen), kąpiele nasiadowe 28—30° — pędzlowanie c. *Tinctura jodi*, *Unguent. kali jodati*, maść ichtyolowa 10—20%.

451. *Extr. Belladonae* 2·00,
Vaselini fl. 20·00.
 Mfng. S. Maść.

452. *Extr. Bellad.* 5·00,
Ung. lythargyri 30·00.
 Mfng. S. Maść.

Kiedy okres ostrego zapalenia przeminął rozpocząć leczenie rzeżączki miejscowe.

Epilepsia.

Przedewszystkiem starać się wykryć przyczynę padaczki i takową o ile można usunąć, zwłaszcza przy epilepsyi odruchowej.

Chory nie powinien fizycznie lub umysłowo nateżać się, unikać napojów wysokokowych, żyć higienicznie, uważać na regularny stolec, nie pijać kawy, herbaty, mało lub wcale nie palić, unikać wszelkich gwałtownych wzruszeń.

Podezas aury położyć chorego do łóżka, porozpinać ubranie a podczas napadu czuwać przy nim. Nieraz kilka wdechów parą amylnitritu, podanie cognacu, wina, może wstrzymać napad. Podczas bardzo silnego napadu można robić inhalacye chloroformowe.

Jako środki polecane przeciw epilepsyi przedewszystkiem: kali bromatum po 2—5 do 10 i 15 grm. na dzień, lub mieszanki bromowe:

453. *Ammon. bromati,*
Natri brom.
Kali brom. āā. 3·00—5·00,
Aqu. dest. 200·00.

DS. 2—3 łyżek dziennie, dalej *Curara* podskórnio (0·005).

454. *Curare* 0·10,
Aqu. dest. 10·00,
Acid. muriat. gtt. unam.

DS. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki na raz.

455. *Argenti nitrici* 0·50,
Pulv. et extr. Acor. q. s. ut
f. pil. Nr. 50.

S. 4—10 pigułek dziennie.

456. *Amylenhydrat* 5·00—10·00,
Aq. destill. 100·00.
 MDS. 2—3 łyżki dziennie.

Polecano też:

- 457.** *Decoct. artemisiae*
e 15'00 ad 25'00,
Kali bromati 10'00—20'00.

Podawać też można *Valerianę* w proszku (0'50—2'00) pro die, albo jako infusum e 10—15'00 na 200'00. *Belladona* w pigułkach np.:

- 458.** *Extr. Belladon.*
Fol. Bellad. āā. 1'00,
Extr. et pulv. liquir. q. s. u.
f. pill. N. 100.
S. Codziennie 2—3 do 6—7 pigułek.

Następnie *Zincum oxyd.* od 0'05—0'20 p. dosi, w połączeniu z innymi środkami, lub *atropinę* na wewnątrz:

- 459.** *Zinci oxydati* 0'05,
Rad. Valer. 2'00,
Extr. Hyoscyam. 0'06,
Ol. Valerianae 0'05,
Mfp. D. tal. dos. N. X.
Da in charta cerata.
S. 3 proszki na dzień.

- 460.** *Atropini sulphur.* 0'01,
Aqu. dest. 10'00.
DS. 2—3 razy na dzień po 10 kropel (uważać na żrenice!).

- 461.** *Bromalin* 10'00,
Div. in dos. Nr. X.
S. 2—4 proszki dziennie.

Dalej przetwory arsenikalne jak: *Sol. Fowleri*, woda *Levico*, *Roncegno*.

Przytem można zastosować procedury hydropatyczne i elektryzowanie prądem stałym głowy n. *sympaticus*. Podczas *status epilepticus* można robić inhalacje chloroformowe lub eterowe.

- 462.** *Aethyleni brom.*
Spir. vini rectific. āā. 5'00,
Aquae menth. pip. gutt. II.
S. 3 razy dziennie po 5—10 kropli w $\frac{1}{3}$ szklanki mleka.

Epistaxis.

Kauteryzacja broczącego naczyń, najlepiej cum *acido nitrico fumante*, zapomocą przecika drewnianego zakończonego dość ostro, następnie tamponada gazą taninowo-jodoformową. Tamponada od przodu dobrze wykonana zupełnie wystarcza.

- 463.** *Ferri sesquichlor. sol.* 5'00,
Aq. destillat. 500'00.
DS. Do przepłukiwania nosa.

Dla chorych cierpiących na drobne częste krwawienia:

- 464.** *Alum. crud pulv.* 10'00,
Aq. dest. 500'00.

DS. Codziennie nos przepłukiwać.

Erysipelas.

Leczenie ogólne niczem nie różni się od leczenia innych chorób gorączkowych. Przy leczeniu miejscowym, przedewszystkiem wysledzić punkt wyjścia róży, a więc przy róży twarzy, zbadać czy nie ma abscessu z powodu *periodontitis* i takowy przeciąć, osobiwie zaś dokładnie zbadać jamę nosa i jeżeli tamże znajdują się *exkoryacje* strupami pokryte, takowe rozmiękczyć przez wkładanie tamponów, napojonych oliwą karbolową 1⁰/₀, wkładać waciki z maścią: *Hydrarg. praecipit. flavi* (0'15:15'00).

Miejsce uległe zapaleniu okłada się suchą watą, lub robi się okład z *Plumbum acet. basicum solut.* 1⁰/₀, 2⁰/₀ roztwór ichtyolu lub z płynu *Burrowa*. Najpowszechniejszym środkiem jest maść kamforowa. Polecają również: *Nacierania* 4—5 r. dz. ol. *therebint. rectific.* zapomocą pedzla lub wacika po poprzedniem zmyciu alkoholem lub eterem miejsca schorzonego. *Nacieranie* dośrodkowo, by zarazka na skórę

rę zdrową nie przenieść. Leczenie to przy białkomoczu nie może być użytem. Cavarri pędzuje 10% rozczyznem alkoholowym Fuchsiny.

Lodowych okładów używa się tylko przy róży głowy, połączonej z majaczeniami i utratą przytomności.

465. *Acidi tannici*

Camphorae āā. 2'00,
Aether 15'00.

MDS. Zewnętrznie.

Miejsca zajęte pędzlować co 3—4 godzin.

466. *Ichthyoli*

Vaselini āā. 25'00.

Mfung. DS. Maść.

467. *Plumb. acet. bas. sol.* 10'00, *Aq. destill.* 200'00.

S. Do okładów.

468. *Sulfoichthyol. ammon.*

Aether sulf. āā. 5'00,
Collod. elast. 10'00.

S. Zewnętrznie.

469. *Ol. pini*

Ol. fagi
Ol. olivar. āā. 10'00.

S. Zewnętrznie,

470. *Acidi carbolici* 2'50,

Camphor. 1'00,
Vaselini 50'00.

Mfung. DS. Maść lub też zrobić na rękę lub nodze opaskę z plastru lepkiego tak, żeby się róża nie posuwała dalej (Wölfler) — co się jednak nie zawsze udaje.

Erythema exsudativum multiforme. — Erythema nodosum.

Przeciw swędzeniu i pieczeniu zmywania:

471. *Acidi salicylici* 2'00,

Spir. vini gallici 100'00.

S. Zewnętrznie.

następnie puder. Wewnętrznie *Natrium salicylic.* 3'00—5'00 pro die. W razie towarzyszącej gorączki pacjent powinien zostać w łóżku; polecić dyetę, antifebrilia.

Favus.

Po usunięciu strupów za pomocą oliwy i zmyciu mydłem epilacye włosów; następnie wcieranie środków, które mają niszczyć grzybki. Epilacye muszą być powtórzone tak długo, jak długo znajdują się włosy chorobowo zajęte (trwa to zwykle miesiąc). Do wcierania, które winno być robione codziennie, polecić:

472. *Naphtol* 10'00,

Vaselini 100'00.

S. Maść.

473. *Lactis sulfuris* 5'00,

Olei rusci

Spir. lavand. āā. 50'00.

S. Zewnętrznie.

474. *Ichthyoli* 5'00,

Acidi salicylici 3'00,

Spir. vini

Glycerini āā. 50'00.

MDS. Zewnętrznie.

475. *Acidi pyrogallici* 2'00,

Vaselini fl. 20'00.

Mf. ung. S. Maść.

476. *Petrolei* 100'00,

Bals. Peruv. 10'00.

MDS. Nacieranie.

477. *Chrysarobin.* 5'00,

Acidi salicyl. 2'00,

Collodii 30'00.

MDS. Zewnętrznie.

Febris intermittens zob. intermittens.

Fluor albus, blenorhoea vaginalis, leukorrhoea, catarrhus vaginae.

Zwrócić uwagę na przyczyny wywołujące, lub podtrzymujące zapalenie (gwałtowne spółkowanie, pasożyty, ciała obce, jak tampony, krażki, zapalenie wyższych dróg rodnych).

Ostry okres: Polecieć spokój, środek wypróżniający, nie używać środków drażniących do przepłukiwań. Letnie przestrzykiwania z wody przegotowanej z dodatkiem soli, lub kwasu borowego 2—3%.

Przewlekły nieżyt: Leczyć choroby ogólne: Niedokrwistość, zolży, bladaczkę. Wstrzykiwania środkami ściągającymi 1, 2, 3 razy dziennie.

478. *Plumbi acet. b. pur.* 2'00.

D. t. dos. X.

S. Proszek do litra wody.

479. *Plumb. acet. b. solut.* 100'00.

S. 2 łyżki na litr wody.

480. *Acidi salicylici* 20'00,

Alum. crudi 10'00,

Zinci sulphur. 5'00.

Mfpul. D. in scatula.

S. Na koniec noża do $\frac{1}{2}$ litra wody.

481. *Creolini* 15'00.

S. 5—10 kropli na litr wody do wstrzykiwań.

482. *Sulphat. zinci*

Alum. pulver aa.

S. $\frac{1}{2}$ łyżeczki na litr wody do wstrzykiwań.

483. *Acidi salicylici* 1'00.

D. t. dos. X.

S. Proszek na litr wody.

484. *Aceti pyrolig. crudi* 300'00.

S. 2—3 łyżek na litr wody.

Lub

485. *Solveoli* 50'00.

S. 2 łyżeczki na litr wody.

486. *Sol. Formalini* 10⁰/₁₀ 100'0.

S. Łyżkę na litr wody.

487. *Alumnol* 1'50,

D. t. pulv. X.

S. proszek na litr wody.

W ostatnim czasie Lirola poleca:

488. *Acidi tannici* 60'00,

Alcohol absolut.

Creosoti aa. 30'00,

Aq. destill. 240'00.

S. Łyżkę na litr wody ciepłej do wystrzykiwania.

Do przysposabiania rozczy-nów należy użyć wody przegotowanej. Gdy powyższe wstrzykiwania nie usuwają cierpienia, można we wzierniku oczyścić pochwę i zapędzlować n. p. octem drzewnym, półtorachlorkiem żelaza, siarkanem miedziowym 10% i to można powtarzać kilkakrotnie, ale nie częściej, jak raz na 3 dni, w ogóle, gdy już odczyn po poprzednim zabiegu minął. Po zapędzlowaniu nadmiar leku splukuje się letnią wodą i zakłada tampony z waty. Można też zakładać na tamponach w kształcie walców proszki: acid. salicilicum, alumen, jodofarm z dermatolem, zincum sulphur. w połączeniu z amylum.

Wreszcie zalecają tampony napojone lekami.

489. *Amon. sulfoichthylol* 5'00,

Glycerini 100'00.

S. Płyn do tamponowania.

490. *Glycerini* 100'00,

Tannini 3'00.

S. Do tamponowania.

Gangraena pulmonum.

Świeże powietrze, częste przewietrzanie pokoju; chory powinien leżeć w łóżku na boku chorego, dyeta pożywna i podniecająca (przetwory wyskokuwe), jeżeli niema przeciwwskazań.

Podawać na wewnątrz środki wykrztuśne i balsamiczne (bals. peruv. bals. tolutan.) obok niewielkich dawek chininy, oraz robić częste wziewania z ol. terebinth. 1,0—3,0 na 200 wody lub ol. pini pumilionis polonicae po 10—15 kropli na kieliszek wody do maszynki inhalacyjnej Sieglego. Lub też kwas karbolowy 2⁰/₁₀ do wziewań, ale w takim razie uważać na mocz, czy nie wystąpi zabarwienie ciemne. Również wziewania z Thymolu 0·20 z dodatkiem kwasu borowego 3·0 na 100 wody.

491. *Kreosoti fagi opt.* 2·00,
Tinct. absynth. comp.
Spir. Vini Cognac 50·00,
Vini malac. 150·00.

S. 3 razy dnia łyżkę w wodzie ocukrzonej zażyć.

492. *Cortic. Chin. reg.* 20·00,
Macera p. horas sex cum vin. gallic. 180·00,
dein filtra et adde
Tinct. nervin. ton. Bestuscheff 2·00,

Aq. Cinnamomi
Syr. cort. aurant. aa. 20·00.
S. Co 2 godz. łyżkę.

493. *Terpinol.* 3·00,
Natr. benzoici 2·00,
Sacch. albi q. s. ut f. pil. N. 30.

S. Co 2 godziny pigułkę.

494. *Menthol.* 3·00,
Sacch. albi
Gum. arab. aa. 2·00,
Aqu. dest. q. s. ut. f. pil. N. XX.

S. Co godzinę pigułkę.

Lub menthol podawać w kapsułkach wyrobu Zahradnika po 1·0 grm. z dodatkiem ol. oliwar. 2·0.

495. *Myrtoli* 0·20,
Dtal. dos. N. X. in caps. gel.
S. 3 razy dn. po jednej kap.

Kalendarz lekarski. 1898.

496. *Ol. terebinth. rect.* 3·00,
Mucil. gum. arab.
Syr. simpl. aa. 25·00.
Sensim terendo affunde
Aqu. dest. ad 150·00.
S. Co 2 godziny łyżkę.

Do spluwaczki przykrywanej szczelnie wlewać 5⁰/₁₀ kw. karbolowy lub 2⁰/₁₀ kreoline.

Gastrektasia zob. Dilatio ventriculi.

Gastroenteritis u dorosłych patrz Catarrh. ventriculi, Catarrh. intestinorum.

Gastroenteritis u dzieci.

Zapobieganie: przestrzegać czystości i świeżości mleka, nie odłączać dzieci w miesiącach letnich. W chwili wybuchu choroby nie dawać żadnego pokarmu, nawet piersi, przez 24—48 godzin, a podawać przegotowaną wodę, lekki odwar herbaty na zimno z dodatkiem kilku kropli koniaku. Celem nsunięcia wymiotów przepłukanie żołądka wodą przegotowaną z dodatkiem soli (1⁰/₁₀), natr. benzoicum lub bicarbonicum. Równocześnie podawać:

497. *Acidi mur. diluti gtt. X,*
Aq. destill. 100·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

498. *Acidi lactici* 1·00,
Aq. destill. 100·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

Jeżeli obok wymiotów są silne rozwolnienia, wtedy do herbaty dodawać czerwonego wina, odwar z borówek suszonych. Można też z początku podać:

499. *Calomelanos* 0·01—0·02,
Sacch. lactis 0·15,
Mfp. dent. tal. dos. N. VI.
S. Co godzina łyżeczkę.

Gdy stwierdzimy znaczne wzdęcia brzucha, stolce mocno cuchnące, wtedy stosować można

500. *Kreosoti gtt. II,*
Aq. Cinnamomi 80'00,
Syr. simpl. 20'00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

501. *Natri benzoici 2'50,*
Aq. destill. 90'00,
Syr. simpl. 10'00.
S. Co 3 godz. łyżeczkę.

502. *Resorcini 0'20,*
Aq. Chamomill. 80'00,
Syr. simpl. 20'00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

503. *Benzonaphtol*
Sacch. albi āā. 0'05—0'20,
Dent. tal. dos. Nr. X.
S. Co 3 godz. proszek.

504. *Saloli*
Bismuthi salicylici āā. 0'10,
Sacch. albi 0'20,
Mfp. dent. tal. dos. Nr. X.
S. Co 4 godz. proszek.

Jeśli rozwolnienie nie ustaje, należy przy ścisłej diecie stosować.

505. *Trae Coto gtt. V,*
Aq. destill. 50'00,
Trae laud. simpl. gtt. II.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

506. *Inf. herb. Melissae*
e 5'00—100'00,
Resorcini 0'30,
Trae opii simpl. gtt. II.
Syr. sacch. 15'00.
MDS. Co godz. łyżeczkę.

507. *Bismuthi subnitrici*
Sacch. albi āā. 0'10,
Pulv. Doveri 0'01—0'02,
Mfp. dent. tal. dos. Nr. XII.
S. Co 3 godz. proszek.

Jeżeli wymioty i rozwolnienie nie ustają i wytwarzają się objawy, które nazywamy *Cholera infantum*, wtedy: czarna kawa, herbata z rumem lub koniakiem,

szampan co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę. Kąpiele ciepłe, lub kąpiele gorące (łyżkę *farinae sinapis* w woreczku płóciennym), nacieranie dzieci aż do zaczerwienienia skóry, ogrzewania kończyn i pościeli, wstrzykiwania podskórne eteru.

508. *Cognaci 10'00,*
Aq. dest. 180'00,
Syr. sacch. 20'00.
MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę.

509. *Liquir. ammon. anisati,*
Spir. aether. āā. 10'00.
MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 3—5 kropel.

510. *Aether sulfur. 2'00,*
Mixt. gummos. 100'00,
Aq. Cinnamom.
Syr. simplic. āā. 10'00.
MDS. Co godz. łyżeczkę.

511. *Coffeini n. benzoic. 0'10,*
Cognaci opt. 10'00,
Liquor. amm. anis. gutt. XV,
Syr. simpl. 20'00,
Aquae cham. 80'00.
Co godzinę łyżeczkę.

Gdy stan ostry przeminie, wracać powoli do podawania pokarmów początkowo płynnych i klejkich.

Nadto można stosować lewatywy lub wysokle wlewania 3% kw. borowego, tanniny 1:000 lub

512. *Argenti nitr. cryst. 0'10,*
Decoct. tub Salep. 50'0.
DS. połowę na 1 lewatywę.

Lewatywy można także robić z krochmalu z dodatkiem *Natr. Salicyl.* w razie parcia z dodatkiem *Trae laud.* 1—2 kropel. Jeżeli po przebyciu ostrego stanu wytwarza się zaparcie, zob. *obstipatio alvi.*

Gastroent. chronica.

Dzieciom sztucznie żywionym podawać mieszanek śmietankową ($\frac{1}{4}$ litra śmietanki, $\frac{3}{8}$ litra

przegotowanej wody, 15·0 cukru mlecznego) co 3 godziny nie częściej, starszym rosóły mocne, Cacao. Wzbronić tłuszczów, jarzyn. W celu zmniejszenia wzdęcia i pobudzenia do lepszego krążenia okłady wysychające. Wody: Kissingen, Carlsbad, Wildungen.

513. *Aq. foeniculi* 75·00,
Bismut subnitr. 2·00,
Aq. calcis 6·00,
Syr. flor. aurant. 15·00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

514. *Infus. rad. colombo*
e 0·50:75·00,
Bismut subnitr. 2·00,
Syr. flor. aurant. 15·00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

515. *Fol. Jugland.* 100·00,
Vini burgund. 500·00,
Macera per 48 horas, adde
Syr. sple. 30·00.
S. Co 3 godz. 1—2 łyżeczki.

516. *Chinin tannici* 0·05—0·10,
Pulv. Doveri 0·01—0·02,
Sacchari 0·15.
Mfp. tal. dos. N. 10. S. 3 pr. dziennie.

517. *Bismut. salic.* 0·05—0·10,
Pulv. Doveri 0·02,
Sacchari 0·15,
Mfp. dt. tal. dos. 10.
S. 3 proszki dziennie.

518. *Saloli* 0·30,
Pulv. Doveri 0·15,
Bismut. salicyl. 1·70,
Mfp. div. in dos. 10.
S. 4. proszki dziennie.

Przeciw anaemii woda pyrophosforan. żelazista.

519. *Tannin.* 0·20,
Aq. dest. 80·00,
Vini Tokay 15·00,
Glycerin. 10·00,
Trae Opil gtts. tres.
S. Co 3 godz. łyżeczkę.
(Miész. Gerhardtta).

520. *Tannigen.* 0·20,
Dt. d. Nr. VI.
S. 3 proszki dziennie.

521. *Tannalbin* 0·50,
Dt. d. Nr. VI.
S. 2 proszki dziennie.

Starsze dzieci mogą używać wody Karlsbadzkiej na ciepło (Sprudel), wina chinowego przetworów żelaza.

Gingivitis.

Leczenie przyczyn (Periodontitis, epulis, stomatitis mercurialis, stomacace). Częste płukanie ust.

522. *Kali hypermang.* 0·05,
Aqu. fontis 200·00.
DS. Płukanie.

523. *Boracis venet.* 5·0,
Aq. destill. 200·0.
S. Płukanie.

524. *Kali chlorici* 2·0,
Aq. destill. 200·0,
Syr. rub. idaci 20·0.
S. Płukanie.

525. *Tannini* 3·00,
Spirit. vini rectif. 80·00,
Bals. Hoffman. 20·00.
MDS. łyżeczkę na szklankę do płukania.

526. *Tinct. Ratanhae*
Tinct. Gallar. aa. 10·00,
Tinct. opii 1·00.
MDS. Do pędzlowania.

527. *Borac. venet.* 5·00,
Mel. Rosar. 50·00.
S. Do pędzlowania.

Glaucoma (Jaskra).

Niebezpieczna ta choroba nakłada na lekarza obowiązek wczesnego rozpoznania, aby nie zaniedbać odpowiedniej chwili do operacji. W samym początku (okres zwiastunów) występują przelotne zamglenia wzroku,

widzenia kół barwnych do koła światła, wreszcie mniej lub więcej wyraźne bóle w czole i głowie. Przedmiotowo w chwili napadu można już stwierdzić pewne objawy jaskry, które jednak po pewnym czasie ustępują. Gdy jaskra przechodzi w okres 2-gi (*Glauc. evolutum*) nie ma już przerw pomiędzy pojedynczymi napadami — oko stale okazuje wybitne zmiany:

1) Przekrwienie przednich żył rzęskowych.

2) Zamglenie rogówki, rozlane głównie w środku o powierzchni jakby pokłutej.

3) Komórka przednia płytka.

4) Tęczęwka łupkowo szara.

5) Żrenica szeroka, często owalna, na bodźce nie oddziałująca.

6) Jako przyczyna wszystkich tych objawów, a zarazem jako najgłówniejszy objaw przedmiotowy — podniesienie ucisku śródocznego.

Zwolna wśród chwilowych remisji i zaostrzeń, wzrok co raz niżej podupada, wreszcie poezucie światła ginie (*Glauc. absolutum*). Przebieg bywa ostry lub chroniczny. W pierwszym przypadku do opisanych objawów przyłącza się silniejsze nastrzykanie rzęskowe czasem chemosis, podmiotowo zaś gwałtowne bóle w okolicy oka i w głowie.

Jaskra prosta przebiega tylko z lekkim stwardnieniem oka bez objawów zapalnych, bez bólów, wziernik zaś wykazuje exkawację tarczy dobrzeżną.

Leczenie: Środkiem radykalnym jest wczesne wykonanie iridectomii obwodowej i szerokiej. Mniej pewną jest sclerotomy. Aż do chwili operacji wskazane są środki obniżające ucisk śródoczny jak: zapuszczanie $\frac{1}{2}\%$ eseryny lub 2% policar-

piny, które w miarę ciężkości przypadku zapuszczać należy co 3 do 2 godzin dziennie. Działanie ich jest bardzo korzystne, jednak tylko przemijające. Nadto nie działają one tam, gdzie żrenica n. p. z powodu atrofi tęczęwki nie zwięża się.

528. *Eserini salicyl.* 0.025,
Aqu. dest. 5.00.

DS. Krople do ocz.

529. *Pilocarpini mur.* 0.1,
Aqu. dest. 5.00.

DS. Woda do ocz.

Gonorrhoe zob. Blenorrhoea.

Haematemesis.

Przedewszystkiem należy uwzględnić przyczynę krwotoku. Chory powinien jak najspokojniej leżeć i wstrzymać się od przyjmowania pokarmów przynajmniej 24 godzin, a nieraz 1—2 tygodni.

Jeżeli osłabienie jest znaczne, lub chory od pokarmów wstrzymuje się dłużej, należy podawać odżywcze lewatywy.

Na okolicę żołądka okład lodowy, kawałki lodu do polykania i środki przeciw-krwotoczne, obok laudanum, cocainy lub morfiny w takich dawkach, aby znieść całkiem pobudliwość żołądka.

W razie zapadu eter podskórnie, lub ol. camphoratum lub też roztwór soli jako hypodermokliza.

Gdy wzmagająca się ostra niedokrewność wskazuje, że krwotok nie ustępuje, wtrzykiwania podskórne przetworów sporyszowych.

Poustąpieniu krwotoków dłuższy czas spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna, mleko zimne łyżkami, a obok tego leczenie przyczynowe.

530. *Tannini puri* 0·50,
Opii puri 0·10,
Sacchar. albi 3·00,
Mfp. div. in dos. N. V.
 S. Co 2 godziny proszek, lub
 opium w czopkach.

531. *Liqu. ferri sesquichlor.*
guttas 10.

Aqu. dest. 200·00,
Morph. mur. 0·05,
Syr. simpl. 15·00.

MDS. Co godzina łyżkę.

532. *Alum. crud.* 1·00,
Extr. opii aq. 0·20,
Elaeosacch. Menth. pip. 3·00,
Mfp. div. in dos. Nr. 10.
 S. Co 3 godz. proszek.

533. *Extr. Secal. cornut* 2·00,
Spir. dilut.
Glycerini āā. 5·00.
 DS. $\frac{1}{4}$ do jednej strzykawki
 podskórnice.

534. *Tinct. haemostyptica* 15·00.
 DS. 3 razy po 15 kropel.

Haemoptoe.

Bezwzględny spokój, ułożenie chorego na wznak w łóżku, w pokoju o miernej ciepłocie, przykryć chorego lekko.

Nie pozwolić mu się ruszać i mówić — zwolna oddychać.

Pokarmy tylko płynne, zupełnie chłodne (najlepiej mleko). Wstrzymywać się od kaszlu, a jeżeli kaszel trwa, to spore dawki morfiny 1—2 ctg. na raz. Chorego nie badać. Na piersi лёд w worku gumowym lub pęcherzu; połykać małe kawałki lodu. Obok tego do zażywania: *Plumb. acetium* z opium aa. 0·03 na dawkę, lub też *Liq. terri sesquichl.* 25 kropli na $\frac{1}{2}$ szklanki wody, z tego łyżkami; lub też *Extr. Secal. cornuti. Pulv. Secal. corn. aa.* 2·00 na 30 pigułek, z tego co 2 godz. pigułkę.

W cięższych krwotokach wstrzyknąć ergotynę *Bombelon* $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki na raz lub podać atropinę w dawce 0·0002 lub wstrzyknąć $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki roztworu 0·01:10·0.

Przy podniesionej akcyi serca, radzą *Inf. digitalis*, przez *Leydena* jednak przeciwwskazane.

535. *Extr. secal cornuti,*
Acidi tannici āā. 1·20,
Pulv. et extr. gent. āā. q. s.
ut f. pill. Nr. 20

DS. Co 2 godziny pigułkę zażywać.

536. *Acid. sclerotin.* 1·00,
Aq. destill. 25·00.
 S. 3 strzykawki dziennie
 wstrzyknąć.

537. *Inf. Secal. corn. e* 1·00 *ad*
 150·00,
Tinct. laud. simpl. gtt. V,
Syr. capill. vener 2·00.
 S. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżka.

538. *Ergotini puri*
Acidi tannici āā. 1·50,
Extr. opii aquos 0·05,
Extr. liquor. q. s. ut f. pill.
 Nr. 20,
 S. Co 3 godz. pigułkę.

539. *Extr. haemostat.* 1·00,
Morphii muriat. 0·10,
Elaeosacch. foenicul. 2·00,
Mfp. div. in dos. Nr. X.
 S. Co 2 godz. proszek.

540. *Hydrastinini* 0·25,
Sacch. lact. 3·00,
Mfp. div. in dos. X.
d. in charta cerat.
 S. 3 pr. dziennie (następnie 2—1).

541. *Ergotin dialys. Bombelon*
 2·00,
Aqu. dest. 20·00,
Acid. carbol. gtt. tres.

MDS. Do wstrzykiwań (1 strzykawka *Prawaza* zawiera 1 decigr.).

542. Extr. fluidi Hydr. canad.

10'00.

S. Po 20—30 kropel, kilka razy dziennie.

543. Ergotin

Chinin. sulph. āā. 2'00,

Pulv. fol. Digit.

Extr. hyosc. āā. 0'20,

Mf. pil. N. XX.

S. Co 2 godziny pigułkę.

Polecają też wstrzykiwania z Atropiny np.

544. Atrop. sulfur. 0'01,

Morph. mur. 0'20,

Aqu. dest. 10'00.

D. $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki wstrzyknąć.

545. Ol. terebinth. 0'30,

Dtal. dos. N. XX. in caps. gelat.

S. Co 2 godz. kapsułkę.

546. Plumb. acet. 0'5,

Morph. mur. 0'05,

Sacch. q. s.

ut f. p. div. in dos. N. X.

S. Co 2—3 godz. proszek.

Haemorrhoids.

Należy się starać codziennie o należyte wypróżnienie przez podawanie środków lekko przeczyszczających, wodę karlsbadzką, wodę gorzką Saratica i t p

Gorące kąpiele nasiadowe, kąpiele borowin. (Mattoni) irygacye odbytnicy usuwają czasami cierpienie.

W niektórych znów razach nadaje się bardzo sonda chłodząca t. zw. przyrząd Arzbergera.

Oprócz tego można próbować czopków z ergotyny, chrysorabinu, lewatyw ściągających, wstrzykiwań czystego kwasu karbolowego do gazów.

Jedynie pewnym środkiem jest tylko operacya. Guzy wypadnięte należy odprowadzić do wne-

trza, jeżeli jednak już przeszły w stan zapalny lub zgorzelinowy, najlepiej ograniczyć się do posypywania proszkiem jodoformowym i okładów z octanu glinowego.

Przeciwno uporczywemu swędzeniu najskuteczniejsze są zmywania wysokiem.

547. Pulv. liquir. comp. 50'00.

S. Łyzeczkę wieczór zażyć.

548. Sal. thermar. Carolinens.

50'00.

S. Łyzeczkę w szklance letniej wody rozpuścić.

549. Etr. Secal. corn. 2'00,

Butyr Cacao q. s. f. l. a.

supposit. N. 10.

550. Chrysarobin 0'80,

Jodoformii 0'30,

Extr. Bellad. 0'60,

Vaselin. 15'00.

Mf. ung. S. Maść.

551. Plumb. acetici 0'25,

Extr. Opii aquos 0'05,

But. Cacao q. s. ut f. supp.

Dtal. dos. N. X

S. 2—3 czopki przez dzień.

552. Calomel 2'00,

Morphini 0'15,

Bism subnitr.

Vasellini āā. 25'00,

Glycerini 8'00,

M. f. ung.

S. Zewnętrznie.

553. Cocain hydrochl. 1'00,

Morphii sulf. 0'20,

Atropin sulfur. 0'10,

Tannin. 0'20,

Vaselin 30'00.

Mf. ung. S. Po wypróżnieniu posmarować.

554. Extr. Hamamel. virg. fluid

0'20,

Butyri Cacao 10'00,

Ol. amygdal. 7'50.

Mfung. S. W razie krwotoków posmarować.

Helminthiasis zob. *Ascaris lumbr*, *Oxyuris*, *Taenia*.

Hemicrania.

Uwzględnić: ogólne osłabienie, choroby nerwów, chor. narządów trawienia, zboczenia pleców. W czasie napadu spokój. Masowanie czoła i skroni (można użyć maści z mentolem lub kokaïną). Smarowanie przecikiem z mentolu.

555. *Chinin. muriat.* 0·25,
Coffeini natro salic. 0·10,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

DS. W czasie napadu co godzinę proszek (użyć 2 lub 3).

556. *Antipyrini* 0·10,
Coff. natr. sal. 0·10,
Dtal. dos. N. X.

S. 1—2 proszki na dzień w czasie migreny.

557. *Phenacetin* 0·50,
Chinin. 0·20,
Mfp. dtr. tal. dos. N. 10.
S. Jak wyżej.

558. *Natri Salicyl.* 0·10,
Dtur. tal. dos. N. 10.
DS. Jak wyżej.

559. *Euphorin* 4·00,
Div. in dos. N. 10.
S. 3 proszki dziennie.

560. *Coffeini citrici* 1·00,
Phenacetin 2·00,
Sacchari 1·00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
DS. Co 2 godziny proszek.

561. *Antinervin.*
Sacch. albi āā 0·50,
Dent. tal. dos. N. X.
S. Co 2 godz. proszek.

Podskórne zastrzyknięcie Ergotyny (Bombellon) 0·25. Chlorkwadrhydraz 1—2 gram. w lewatywie.

W razie, jeżeli głowa przy migrenie jest chłodna — robić gorące kompresy.

562. *Pastae Guarana*
Sacch. albi āā. 2·00.
Mfp. Div. in dos. N. 5.

S. Jeden lub dwa proszki podczas migreny.

563. *Mentholi* 0·50,
Spir. vin. gal. 10·00.

DS. Do nacierania skroni.

Do dalszego leczenia można użyć:

564. *Chinin. muriat.* 5·00,
Pulv. fol. Digital. 1·50,
Extr. gent. et pulv. q. s.
f. pil. N. 30.

DS. Na noc pigułkę.

565. *Solut. arsen. Fowleri* 5·00,
Trae ferri pomat. 10·00.

MDS. Rano i wieczór po 5 do 10 kropli.

566. *Ferratini* 0·20,
Chinin. mur. 0·10,
Sol. ars. Fowleri gtt.
in past. compress.
Fabric. L. Marcisiewicz
Cracoviae.

S. Dwie pastylki dziennie.

Woda arsenikalna Gubera.

567. *Ammon. bromati* 1·00,
Kali bromati
Natri bromati āā. 2·00,
Aqu. dest. 180·00,
Syr. aurant. 20·00.
MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

568. *Migraenini* 1·10.
D. T. dos. III.

W razie bólu 1 proszek zażyć.

Herpes tonsurans capillitii.

Włosy ostrzyżz krótko. W obrębie i w otoczeniu miejsc zajętych chorobą, pilne usuwanie włosów przez epilację, następnie wcieranie środków, celem zniszczenia grzybka w toreb-

kach włosowych (maść: naphтол. 10⁰/₀, chrysarobinowa 5⁰/₀).

569. *Acid. salicil.*,
Spir. lavand. āā 2·0,
Spir. vini gal. 100·0.
S. Weierania.

570. *Anthrarobin* 10·0,
Glycerini 50·0.
 S. Pedzlowanie.

Herpes tonsurans maculosus
(Pityriasis rosea Gibert).

Według Hebry:

Przez 6 dni 2 r. dziennie nacieranie i zmywanie powierzchni ciała mydłem szarem, przez następne 6 dni pozostawić warstwę mydła z poprzednich zmywań, 12-go dnia kąpiel.

Kaposi poleca 2—3-krotne nasmarowanie.

571. *Resorcini*
Ichtyoli āā. 10·00,
Vaselinī 100·00.

następnie kapiel.

Hordeolum.

W razie, gdy już widnieje czop ropny — nacięcie. U osób bojaźliwych ciepłe okłady. Przy nawykowej skłonności do jęczmieni, dłuższe używanie maści z praecipitatu białego lub żółtego.

572. *Hydrarg. praec. albi*
0.15—0.2,
Vasellini flavi 5.00.
DS. Maść na powieki.

Lub tež:

573. *Mercuri praecip. flav.* 0.15
—0.2,
Vaselini flav. 5.00.

MDS. Maść na powieki (do smarowania przed ułożeniem się do snu, w wielkości ziarna grochu między rzęsy).

Hydrocephalus.

H. acutus. Zimne okłady, wcieranie szaruchy (po 2·0–4·0 dziennie na głowę i kark), wewnętrznie podać Calomel, (0·01–0·03 co godzinę).

Dzieciom silnym można po-
stawić 2—4 pijawek.

W razie drgawek chloral (0.50—1.0 pro dosi). Synapizm na łydki i kark.

Leczenie krzywicy i zółtów.

H. chronicus. Maść n. p. 10% jodoformowa. Leki moczopędne (Kali aceticum, Juniperus) leki przeczyszczające. Wypuszczenie płynu przez nakłócie lędźwiowe (punctio lumbalis) dające się kilkakrotnie wykonać bez niebezpieczeństwa, usuwa objawy pochodzące od wzmożonego ucisku śródczaszkowego. Somma radzi leczyć działaniem słońca na głowę: codziennie 1/2 godziny do 50 minut.

Hyperemesis gravidarum (wymioty u ciężarnych).

Zbadać dokładnie ciężarną w celu, czy się nie da wykazać przyczynowe cierpienie: tyłopochylenie, tyłozgięcie ciężarnej macicy, lub inne zmiany narządu płciowego, lub innych organów jak niezbyt żołądka, białkomocz, i w takich razach leczenie przyczynowe.

W przypadkach, gdzie żadne zmiany wyraźnie wykazać się nie dadzą, należy używać środków zrazu łagodniejszych, później coraz silniejszych, z tych, które bywają zalecane. Uregulowanie i zmiana diety, picie śniadania w łóżku, jedzenie z rana pokarmów ostrych jak n. p. kawałek śledzia, albo picie koniaku zaraz po przebudzeniu. Dieta mleczna, podawanie pokarmów chłodnych, woda sodowa, wody mineralne

alkaliczne, połykanie kawałeczków lodu. Kawa mrożona, lody, wino szampańskie przy jedzeniu. Stomachica, pepsyna, kwas solny.

- 574.** *Mag. Bismuth* 1·50,
Natri bicarb.
Sacch. albi āā. 2·00,
Mf. pulv. div. in dos. X.
 DS. 3 razy dnia proszek.
- 575.** *Kali bromati*
Natri bromati
Ammon. bromati āā. 3·00,
Aqu. dest. 200·00,
D. in vitr. nigro.
 S. Rano i wieczorem po łyżce w wodzie sodowej.
- 576.** *Cerii oxalici* 0·05.
 S. 1—2 pig. na dzień.
- 577.** *Cerii valerianici* 0·05.
 S. 5 pigulek dziennie.
- 578.** *Cocain. muriat* 0·03,
Antipyrini 1·0,
Aqu. destill. 100·0.
 S. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę.
- 579.** *Trac. jodi*
Chloroformi āā. 5·0.
 S. Rano i wieczór wśród jedzenia 5 kropel z wodą.
- 580.** *Kreosoti*
Ol. amygd. dulc. āā. 2·50.
 S. 3—4 razy dnia 5 kropel w mleku.
- 581.** *Cocaini muriat.* 0·10,
Aqu. dest. 1·0·00.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. pół łyżecz.
- 582.** *Cocaini muriatici* 0·10,
Aqu. dest. 10·00.
 DS. 3—4 razy dziennie 10—15 kropel.
- 583.** *Menthol* 1 00,
Spiritus vini 20·00,
Aqu. dest. 150·00.
 S. Co godzinę łyżkę.
- 584.** *Aqu. laurocer.* 10·00,
D. in v. nigro.
 S. Kilka razy dnia po 10 kropel na lodzie.

Narkotyki jak opium, morfin, chloral, jużto przez usta, jużteż podskórnio lub w lewatywach.

Lodowe okłady, synapizma, rozpylanie eteru na okolicę żołądka.

W cięższych przypadkach odżywianie przez odbytnicę.

Gdy te środki nie prowadzą do celu, pomazywanie części pochwowej rozcynem azotanu srebrowego (1:40) lub laseczką. Stosowanie na część pochwową belladonny lub kokainy w postaci maści.

- 585.** *Cocaini muriat* 1·0,
Extr. Belladonn. 0·25,
Vasellini 15·0.
 Mfung. S. Do smarowania cz. pochwowej i ujścia.

Rozszerzenie palcem szyi macicy, w sposób aseptyczny, (zabieg ten ostrożnie, gdyż grozi poronieniem).

Gdy chora nie zatrzymuje zupełnie pokarmów i zachodzi obawa o życie, wskazanem jest, wzniesienie poronienia co jednak ex consilio winno być postanowione.

Hyperidrosis.

Ogranicza się najczęściej do dłoni, stóp i pach. U dziewcząt częstą przyczyną bywa blednica, która należy w leczeniu uwzględnić.

Miejscowo polecić zmywania.

- 586.** *Tannini* 1·00,
Spir. vini gallici 250·00.
 S. Zewnętrznie.
- 587.** *Decoct. cort. Quercus*
e 20·00 *ad* 500·00.
 S. Zewnętrznie.
- Kaposi poleca zmywanie rano i wieczór.

588. *Naphtol* 5'00,
Glycerini 10'00,
 • *Alcoholi* 100'00.

S. Zewnętrznie,
 następnie puder.

589. *Naphtoli pulverisati* 2'00,
Amyli 180'00.

S. Puder.

590. *Talci subtil. pulv.* 40'00,
Bismuthi subnitrici 45'00,
Kali hyperm. 3'00,
Natri salicylici 2'00.

S. Puder.

591. *Ammonii sulfoichthyol.*
Terebinth. aa. 5'0,
Ung. Zinci 10'0.

S. Weierać w nogi poprzednio
 zmyte c. spir. camphor.

Metoda Hebry przeciwko po-
 ceni się nóg polega na tem, że
 pacjent obwija dokładnie stopy
 płótnem, nasmarowanym c. ung.
 diachyl. Hebrae, między palce
 wsuwa masę za pomocą kawa-
 łeczków płótna odpowiednio
 przyciętych. Co 24 godzin
 zmienia ten opatrunek, usuwa-
 jąc resztki poprzednio użytej
 masei. Tak postępuje przez 10
 —14 dni, po czem przyskórek
 w całych płatach odpada, a dal-
 sze postępowanie ogranicza się
 do użycia pudru.

Hysteria.

Zwrócić uwagę na zmiany w po-
 szczególnych organach, zwłasz-
 cza w narządzie moczowo-płci-
 wym i starać się istniejące zło-
 żenia usunąć.

Chorą leczyć psychicznie i sta-
 rać się zyskać zaufanie. Jeżeli
 jest anaemia, chlorosa, to odpo-
 wiednio leczyć. U osób wynędz-
 niałych dobre skutki daje me-
 toda Weir-Mitchella.

W cięższych przypadkach, cho-
 rego umieścić w odpowiednim
 zakładzie i leczenie systematycz-
 nie przeprowadzić.

W mniej wybitnych, leczenie
 w zakładach wodoleczniczych,
 zimne nacierania, kąpiele letnie,
 kąpiele borowinowe (sól boro-
 winowa Mattoniego) i inne pro-
 cedury. Elektryzowanie prądem
 stałym, lub faradycznym daje
 nieraz dobre skutki.

Ze środków wewnętrznych
 wszystkie nerwina, jak *Asa fo-
 tida*, *Castoreum*, *Valeriana*, *Cam-
 phora bromata*, *Zincum valeria-
 nicum* i wiele innych. Obok te-
 go pobyt na wsi, w górach lub
 kąpielach morskich, higieniczne
 życie, dyeta pożywna niepodnie-
 cająca.

Podczas napadu hysterycznego
 raptowne zlanie wodą twarzą,
 silny prąd elektryczny, chłodna
 kąpiel, Chloral w lewatywie lub
 na wewnątrz. W razie bezsen-
 ności *Sulphonal* 1—2 grm. lub
Chloralamid 2—3 grm. na noc.
Amylenhydrat 2—3 gramy w wo-
 dzie.

Obok tego zalecaną bywa mię-
 szanka bromowa.

592. *Somnali* 10'0,
Aq. dest. 45'0,
Syr. rub. id. 20'0.

MDS. Na noc łyżkę zażyć.

593. *Trionali* 1'0,
Dent. tal. dos N. V.
 S. Na noc 1—2 proszki.

594. *Amon. bromat.*
Natr. bromat.
Kalii brom. aa. 3'50,
Aqu. dest. 200'00.

DS. Rano i wieczór po $\frac{1}{2}$ —1
 łyżce w herbacie lub mleku.

595. *Tinct. nuc. vom.* 1'00,
Tinct. castorei 2'00,
Aqu. lauroc. 10'00.
 DS. 3 razy po 10 kropel.

596. *Castorei mosc.* 0'50,
Sacch. alb. 2'0.
M. f. p. Div. in dos. N. X.
 S. Dwa proszki dziennie.

597. Tinct. castorei*Tinct. Valerian. āā. 2·0,**Tinct. Asae foetid. 5·0,**Tinct. opii croc. 1·0.*S. 3 razy dnia po 10 kropel
zażył.**Icterus.**

Leczenie powinno być przede wszystkim zastosowane do przyczyny cierpienia, (vide Catarrhus gastro-duodenalis, Cholelithiasis, Cirrhosis hepatis, Carcinoma hepatis etc.). Zresztą leczenie przypadkowe, w razie bólów w okolicy wątroby, okład ciepły i wstrzykiwanie podskórne morfiny.

Swędzenie skóry łagodzają ciepłe kąpiele z dodatkiem sody i zmywania 2% kwasem karbowym, z dodatkiem sody lub rozczyn:

598. Acidi carbol. 10·00,*Chloralhydr. 5·00,**Aq. dest. 500·00.*

S. Do nacierai.

599. Menthol 2·00,*Spir. vini 50·00.*

S. Do nacierai.

Dyeta przeważnie mleczna i rosółowa (unikać mięsa).

600. Infus. rad. Rhei e 10·00*ad 180·00,**Magnes. ustae 5·00,**Syr. simpl. 20·00.*

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

W chronicz. przyp. wody Karlsbad, Maryenbad. Przeciw biegunce Bismut, Dover, opium. Przytem amara np.:

601. Fol. Trifol. fibrin*Hb. Millefolii**Centaur. min.**Fol. menth. pip.**Fruct. foenicul. āā. 30·00,**Mf. Species.*S. Herbata: 1—2 łyżek na 1/2
litra wody.

W nowszych czasach używano z dobrym skutkiem wlewania zimnej wody w 1-szym dniu na 12—13° R., w 2-gim 15—16° 3 i 4-go dnia 18—20° w ilości 1—2 litrów.

602. Natri salicyl. 1·00,*Natri sulfur. 3·00.**Dtal. dos. N. XII.*S. Na dzień 1—2 proszki, żeby
wypróżnienie wywołać.**603. Podophyllin 0·015,***Extr. Bellad. 0·01,**Extr. Nuc. vom. 0·02,**f. pill. dent. tales Nr. 20.*S. 2—3 pig. na noc w ciągu
godziny użyć.**Ileus.**

Jeżeli przyczyną niedrożności jelit jest zwięźlenie, okręcenie, uwiąznięta przepuklina, nie wiele można się spodziewać z leczenia środkami wewnętrznymi, należy przystąpić do zabiegu operacyjnego, przedtem jednak należy przez podawanie przetworów makowca uspokoić gwałtowne ruchy jelit i zapomocą dużych lewatyw próbować przywrócić drożność. Lewatywy z wody sodowej: łączy się syfon z sondą do odbytnicy włożoną i powoli wypróżnia. Gdy powodem niedrożności jelit jest uwiąznięta przepuklina, należy starać się ją odprowadzić. Jeżeli niedrożność jelit pochodzi z wgłobienia, udaje się często zapomocą przetworów makowca i lewatyw drożność przywrócić. W nowszych czasach polecają prócz tego, wypróżnienie żołądka zapomocą aspiratora żołądkowego.

Gdy te środki nie skutkują, nie należy długo zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Gdy przyczyną cierpienia jest zaparcie kału, a nie ma objawów zadrażnienia otrzewnej, na-

leży podawać środki przeczyszczające w dużych dawkach, w razie przeciwnym lub, gdy środki czyszczące nie skutkują, przetwory mاکowca, okład lodowy na brzuch, kawałki lodu do połknięcia, zręszta leczenie przypadowe.

604. *Magnes. sulphur.* 150·00,
Aq. fontis 500·00.
S. Do lewatyw.

Impetigo patrz Eczema impetiginosum.

Influenza.

W czasie epidemii zapobiegawczo brać po 0·25 chininy. Gdy choroba wybuchnie, środek przeczyszczający (*Calomel* 0·50 pro dosi, dzieciom 0·05—0·10). Dalej leczenie objawów, środki przeciwgorączkowe. *Chinina*, *Antipyrina*, *Phenacetin*, *Coffeina*, szczególnie, gdy bóle głowy zbyt silne. *Natr. salicylicum* (zwłaszcza dzieciom).

Przeciw nieżytom oskrzeli *Inf. Ipec. cum Natro benz.*, *Codein*.

Starcom zaraz podać wina i środki wzmacniające

605. *Chinini mur.* 0·35,
Salipyrin 0·50,
D. t. dos. XII.

S. 3 proszki dziennie.

606. *Phenacetini B.* 0·50,
Dent. tal. dos. Nr. X
in past. compress.
fabric. L. Marcisiewicz Cracoviae.

S. 3 pastylki dziennie.

Intermittens.

W czasie napadu leżenie w łóżku. Podczas dreszczu ogrzewanie, wśród gorączki chłodzenie. Przed napadem wiadomym, na 5 godzin *chinina*.

Częste napady wymagają zmiany miejscowości.

607. *Chinin muriatici* 0·50,
Dtur. tal. dos. N. V.
S. Przed napadem proszek.

Przez kilka dni, chociażby napad się nie powtórzył, rano i wieczór po proszku.

Jeżeli chory chininę wymiotuje, można ją dać w lewatywie z krochmalem lub :

608. *Chinini muriat.* 0·50,
Glycerin.
Aqu. dest. āā. 2·00,
(Disp. sine acido).
S. Wstrzyknąć pod skórę.

609. *Phenocolli hydrochl.* 1·00,
Dtur. tal. dos. VI.
S. Przed napadem na kilka godzin proszek i przez kilka dni podawać.

Przy dłuższem trwaniu:

610. *Decoct. cort. chinæ*
e 10·00 ad 180·00,
Sol. arsen. Fowleri 1·00,
Syrup. Sacchari 20·00.
MDS. 4 łyżki dziennie.

611. *Sol. arsen. Fowleri* 5·00,
Trae chinæ comp. 15·00.
S. Rano i wieczór po 5 kropel, postępować co dzień o jedną kroplę, aż do 20-tu.

612. *Decoct. fol. Eucalypt. gl.*
e 10·00—20·00 ad 150·00,
Syr. cort. aurant. 20·00.
S. Co godz. łyżkę.

613. *Resorcini puri* 0·30,
Dent. tal. dos. N. VI.
S. Co 3 godz. proszek.

614. *Sol. Fowleri*
Tinct. Eucalypt. glob. āā. 10·00.
DS. Po obiedzie i kolacyi 6—20 kropel w kieliszku wody.

615. *Ferratini* 0·20,
Sol. Fowleri gtt. 1—3,
Dent. tal. dos. X, *in past. compress.*
fabric. L. Marcisiewicz Cracoviae.
S. 2—3 pastylki dziennie.

Dzieciom:

Chinini muriat. 0:30—0:50.

Jeżeli wymiotują, dać w lewatywie lub czopkach

- 616.** *Chinin muriatici* 0:25,
Butyri Cacao 0:50,
Mf. supposit. dtur. tal. N. V.
 S. Przed napadem na 3 godz.
 czopek, a później po jednym
 przez kilka dni.

Intertrigo.

W lżejszych przypadkach obok przemywań wodą, zasyпки:

- 617.** *Zinci oxydati* 5:00,
Amyli puri 50:00.
Mfp. S. Zasyпка.
- 618.** *Magn. ust. pulv.* 5:00,
Talc. venet. 20:00,
Acidi salicyl. 0:20.
Mfp. S. Zasyпка.

W razie nadżerek maści:

- 619.** *Zinci oxydati* 5:00,
Vaselini fl. 50:00.
Mfung. S. Maść.
- 620.** *Acidi salicylici* 2:00,
Vaselini 50:00,
Zinci oxydati
Amyl. pur. āā. 25:00.
Mfung. S. Maść.
- 621.** *Nosopheni*
Talc. āā. 5:00.
Fp. S. Zasyпка.

Iridochorioiditis suppur. Panophthalmitis.

Oba cierpienia te dla oka bezwzględnie zgubne, kończą się z reguły zanikiem gałki ocznej. Pierwsze charakteryzuje się obrzmieniem powiek wysokiego stopnia, obecnością chemosis, hypopion, tudzież reflexem żółtawym z głębi oka. Gdy choroba wzmogła się do panophthalmitis, do powyższych objawów przyłą-

cza się wysadzenie gałki ku przodowi, nie rzadko także gorączka. Przyczyną bywa infekcja ropna, bądź to po urazie przebijającym gałkę, bądź też metastaza na tle pyemii, endocarditis ulcerosa, meningitis cerebrospinalis.

Leczenie: W samym początku można próbować leczenia wstrzykiwaniami podskórnymi sublimatu (0:01:20:0). Najczęściej jednak wobec właściwego przebiegu rozchodzi się tylko o złagodzenie bólów i skrócenie choroby. Polecieć więc należy ciepłe okłady, na noc iniekcję morfiny; wobec rozwiniętej panophthalmitis, gdy zbliża się czas przebiecia ropy, incizya w twardówce w okolicy równika cięciem równoległym do brzegu rogówki. Erukacya przeciwwskazana z powodu niebezpieczeństwa meningitis.

Iritis, iridoklitis.

Prosta iritis zdradza się:

- 1) nastrzykaniem rzęskowem.
 - 2) często zmetnieniem cieczy wodnej, czasem obecnością ropy w przedniej komórce (iritis suppur.).
 - 3) Zmiana barwy tęczówki (porównaj z okiem drugim).
 - 4) Zatarciem promienistego rysunku właściwego tęczówce.
 - 5) Obecnością tylnych przyczepień łatwo uwidaczniających się po zapuszczeniu atropiny. Jestto najczęstszy objaw iritis.
 - 6) W pewnych przypadkach szaremi osadami na tylnej ścianie rogówki (Iritis serosa).
- Nie rzadko przychodzi zapalenie na ciało rzęskowe, co przynajmniej w ostrych przypadkach zdradza się silnym bólem przy dotykaniu okolicy ciała rzęskowego (Iridoklitis).

Leczenie. Ponieważ iritis, pomijając wrzody i zapalenia rogówki, jest zawsze niemal następstwem chorób ogólnych (syphilis w około 70% przypadków, rheumatismus, diabetes melitus, tuberculosis, gonorrhoe) więc przedewszystkiem leczenie ogólne zależenie od etiologii a więc: weierania ung. ciner., kalium jod. interne, natr. salicyl. i t. d. W przypadkach ostrych ciemny pokój, w lżejszych okulary ciemne. Lokalnie: zapuszczanie atropiny tak często, aby źrenicę do maximum rozszerzyć, w pierwszych dniach zatem co 2 do 3 godz., później rzadziej. Przy większej ilości tylnych przyczepień zapuszczanie atropiny z kokainą. Jeżeli źrenica opiera się rozszerzeniu, 6—7 pijawek na skroni. Z powodu bólów tudzież dla pobudzenia szybszej resorbeyi, ciepłe okłady (zimne przeciwskazane z wyjątkiem świeżej iritis traumatica). Wobec idiosynkrazyi do atropiny zapuszczanie duboizyny, jak powyżej.

622. *Atropini sulf.* 0·05,
Aqu. dest. 5·00.

DS. Krople do ocz.

623. *Atropini sulf.* 0·05,
Cocaini mur. 0·15,
Aqu. dest. 5·00.

DS. Krople do ocz.

624. *Duboisini sulfur.* 0·025,
Aqu. dest. 5·00.

DS. Krople do ocz.

625. *Scopolamini hydrobrom.* 0·01,
Aqu. dest. 5·00.

DS. Krople do ocz.

Ischias.

Przyczynę wynaleść i takową starać się usunąć.

Jeżeli na tle malaryi, to chinina, arsen; jeżeli wskutek zaziębienia: kąpiele ciepłe, łaźnia parowa, leżenie w łóżku, ciepłe utrzymywanie nóg, środki odwodzące, wzdłuż nerwu kulszowego, jak: suche bańki, Tinct jodi, synapizma, vesicatoria, obok tego masaż, prąd elektryczny stały (anoda na miejsce bolesne), rozpylanie eteru przyrządem Richardsona, na wewnątrz antipiryna. Natr. Salicylicum, phenacetyne, salipyrinę, salol, betol, kali jodatium w dawkach kilkagramowych dziennie.

W razie silnych bólów iniekcye morfiny. Można też wstrzykiwać:

626. *Acid. hyperosmici* 0·10,
Aqu. dest. 10·00.

S. $\frac{1}{4}$ strzykawki Prawaza.

Jeżeli neuralgia się zmniejszy i chorego można wysłać do kąpiel to: Swośzowice, Krzeszowice, Lubień, Cieplice, czeskie, Trenczyn, Piszczany, Busk, Truskawiec, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa). Polecane też bywają z dobrym skutkiem kąpiele w limanie odeskim (Zakład Dra Jachimowicza).

W przypadkach ciężkich ucłec się można do naciągania nerwu.

627. *Antipyrin.*
Chinini muriat. āā. 0·50.

S. 3 proszki dziennie.

628. *Euphorin* 0·40,
Dtur. tal. dos. 20.

S. 2—3 razy dziennie.

629. *Salophen* 1·00,
D. tal. dos. Nr. 10.

S. Co 2 godziny proszek.

630. *Analgeni* 0·50,
D. tal. dos. N. 10.

S. 3—5 pr. dziennie.

631. *Betoli* 3'00—5'00,
Sacchari 3'00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. 4 proszki dziennie.

632. *Salol* 0'50—1'00,
Sacchari 3'00.
Dtr. in capsul. amylac.
 S. 3 proszki dziennie.

633. *Antinervin* 0'20—0'30.
 Kilka razy dziennie.

Keratitis parenchym. diffusa.

Obraz choroby na szczycie rozwoju może nasunąć niewprawnym myśl łuszczyki. Dla odróżnienia pamiętać należy, że naczynia nowo wytworzone w cierpieniu tem leżą w głębszych warstwach rog. ztąd też przez zaćmienie rogówki wydają się brudno-czerwone podczas, gdy w łuszcze leżą powierzchownie, rozgałęziają się widocznie, a barwy są żywo czerwonej.

Leczenie musi uwzględnić tło, a więc w *lues congen.* *Natrum* lub *kal. jodat.* wewnętrźnie, w kile nabytej wcierania szaruchy. W okresie zapalnym (nastrzykanie rzęsk. i łzawienie) lokalnie po-przestać należy na zapuszczaniu *atropinu* dla zapobieżenia *iritis*. Zresztą posilne pożywienie, pobyt na świeżem powietrzu a tylko wobec ciężkiej komplikacji z *Iridokykklitis* lub *Iridochoroiditis*, ciemny pokój. Po ustąpieniu objawów zapalnych, przejść należy do środków wyjaśniających, jak *kalomel*, maść *Pagenstechera*, tra. *opii crocata* lub *Ol. terebintinae cum glicerin. āā* do zapuszczania 1 raz dziennie. W szeregu środków tych *Calomel* jest najłagodniejszym, *Ol. teribint.* najsilniej drażniącym środkiem. Od *Kalomelu* więc zacząć należy i zwolna

do co raz silniejszych przechodzić.

634. *Natr. jod.* 5—8'00,
Aqu. dest. 200'00.
 DS. Po 2 łyżki dziennie.

635. *Ung. Ciner.* 1'50—2'00.
D. t. d. Nr. 30.
 DS. Po 2 pak. uż. do wcier.

636. *Ol. terebint. rectific.*
Glycerini āā.
 DS. Jedną kroplę raz dziennie zapuszczać do oka.

Kerato conjunctivitis phlyctenulosa.

Wspólną cechą wszystkich postaci tego cierpienia, występującego pod formą pryszczyków na spojówce, lub rogówce, łuszczyki, czy też miotelki naczyniowej, jest ich tło żółtawe.

Leczenie musi więc być nie tylko lokalne ale i ogólne: posilna dyeta (pokarmy mięsne, jaja, mleko, zdrowe suche mieszkanie, zażywanie tranu, w lecie kąpiele słone (Rabka, Iwonicz, Truskawiec, Rymanów). Lokalnie: zasypywanie *kalomelu* przez czas dłuższy, nawet z parę tygodni po ustąpieniu cierpienia.

637. *Calomel. vap. p. alcoholis.*
subt. pulv. 5'00.
 DS. Proszek do ocz.
 Pędzelek.

Wobec znaczniejszej wydzieliny spojówkowej, lepiej zacząć leczenie od *lapisu* a później dopiero przejść do *kalomelu*. Unikać *kalomelu* przy równoczesnem podawaniu *jodku potasu*, wywiązujące się bowiem przy tem połączenia jodu z rtęcią, działają silnie gryząco. W formie złośliwej (infiltrat głębszy, barwy szaro-żółtej) dążyć wpiertw do oczyszczenia się nacieku za pomocą środków podanych w leczeniu wrzodów rogówkowych.

Energiczniej jeszcze niż kalomel działa zmodyfikowana maść Pagenstechera.

638. *Mercur. praecip. flav.*
0.15—0.2,
Vaselini flavi 5.00.
Mfung. DS. Maść do oka.

Środek ten wprowadza się bądź grubszą sondą okul., bądź przecikiem szklanym pod powiekę, po czym z lekka masuje się palcem przez powiekę. Maść ta nadaje się szczególnie w formach naczyniowych keratophlyet. Gdzieby postępowanie to nie wstrzymało progresji miotłki naczyniowej, najlepiej przypalić galwanokauterem brzeg wrzodu znajdującego się na szczycie miotłki.

Laryngitis acuta.

Środki napotne, okłady wysychające, w samym początku wzięwanie zimne rozpylaczem Richardsona, lub też wzięwania z przyrządu Sieglego, używając do tychże ałunu czystego 1⁰/₁₀ z dodatkiem 0.10% morfiny; podobnież boraksu lub soli kuchennej.

U dzieci: *Pseudocrup.*

Wzięwanie pary wodnej lub słabych rozczyńw soli, Natr. carbon., Ammon. mur. jużto z inhalatora, jużto trzymając dzieci nad parą. Ciepłe okłady na szyję, kataplaizmy. Podawać dużo ciepłych napojów, herbaty, mleka, w ostateczności środki wymiotne.

639. *Inf. ipecac. e* 2.00 ad 40.00,
Tart. stib. 0.05,
Syrup 10.00.
MDS. Co 10 minut łyżeczkę.

640. *Cupri sulphur.* 0.20,
Aqu. dest. 40.00,
Syrup 15.00.
DS. Co 10 minut łyżeczkę.

641. *Extr. Hyoscyam.* 0.20,
Aquae amygd. amar. 5.00,
Mucil. gummi arab. 20.00,
Syrup emulsiv. 30.00,
F. Linctus.

S. Co 2 godziny łyżeczkę dla złagodzenia kaszlu.

642. *Det. Altheae* 100.0,
Sal. ammon. depur. 1.0,
Syr. capilli Vener. 10.0.
DS. Co godz. łyżeczkę.

Dzieci skłonne do P. w czasie niepogody trzymać w domu.

Laryngitis chronica.

Leczenie wzięwaniami nie wystarcza, należy stosować leczenie miejscowe, zwracając równocześnie uwagę na zachowanie się gardła, jamy noso-gardłowej i nosa. Pobyt nad morzem lub w górach, płukanie i picie Szczawnicką Józefinkę, Emską. W przypadkach lżejszych za dmuchiwanie do krtani z czystego ałunu, lub ałunu z morfiną.

643. *Alum. crudi*
Sacch. lactis aa. 5.00,
Morphii mur. 0.10.

DS. Do zadmuchiwań krtaniowych.

Laryngitis crouposo-diphtheritica.

Ponieważ dławiec (krup prawdziwy) jest prawie zawsze tylko błonicą krtani, przeto stosować należy surowieć przeciwbłoniczną — wyniki tego leczenia w dławcu są bardzo dobre.

Nie używać ani upustu krwi, ani pijawek, pryszczydeł. Lekkie środki przeczyszczające.

Inhalacje z aparatu Sieglego, jużto z wody wapiennej, jużto z podanych niżej środków, z początku co 3 godziny.

Obok tego improwizowana parówka t. j. okrywa się pewną małą przestrzeń pokoju przesćcieradłami szczelnie. W takiej budce trzyma ktoś dziecko, aby wdychało parę, zrobioną przez puszczanie rozpalonego żelaza do wody w naczyniu na podłodze stojącym — powtórzyć parę razy dziennie.

W celu pobudzania do rychlejszego odrywania się błon, robi się wcierania z szaruchy 3 razy dziennie, a to można połączyć z mięsieniem krtani. Podawać obficie napoje. Inhalacye częste, w pokoju utrzymywać dużo pary.

W razie silnej gorączki chinina, po 0:20—0:30 już to w proszkach, w roztworze do wewnątrz, już to w lewatywie, dawszy poprzednio lewatywę odczyszczającą. Gdy występują objawy ścieśnienia krtani, (stenosis) przyczem i błony zaczynają się odrywać, dawać środki wykrztuśne.

W razie upadku sił: wino, cognac, czarna kawa z rumem, kamfora. Jeżeli przy wdychu i wydechu słychać rżenia z odrywających się błon, wtenczas można dać środek wymiotny.

Gdy się jednak ścieśnienie krtani wzmaga, występuje zapadanie dołków nadobojczykowych, zaciąganie się dołka podsercowego, bezgłos i napady duszności — nie zwlekać z wykonaniem Tracheotomii lub Intubacyi.

644. *Inf. Ipecac. e 0:20 ad 80:00*
Kali chlorici 1:00,
Syrup rubid. 20:00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

645. *Ungu. hydrgr. ciner.*
Lanolin aa. 6:00,
Mfung. div. in dos. N. VI.
S. 3 razy dnia po jednej sztuce wetrzeć w szyję.

Kalendarz lekarski. 1898.

646. *Ammon. muriatici 1:00,*
Aqu. dest. 200:00.

DS. Do inhalacyi.

647. *Acidi lactici 2:00,*
Aqu. dest. 300:00.

DS. Do inhalacyi.

648. *Sublim. corrosivi 0:05,*
Aqu. dest. 300:00.

DS. Do inhalacyi.

Używa się również do inhalacyi:

Kali chlorici 2 $\frac{1}{2}$ %, Acid. borici 2 $\frac{1}{2}$ %, Resorcini 1 $\frac{1}{2}$ %.

649. *Infus. Ipecac. e 0:20 ad 100:00,*

Pilocarp. muriat. 0:02,

Syr. Rubi idaei 15:00.

MDS. Co pół godz. łyżeczkę

650. *Pilocarpin 0:02,*

Ammon. carb. 2:00,

Kali chlor. 2:00,

Cognaci 20:00,

Syr. Senegae 25:00,

Aqu. dest. 170:00.

DS. Co godz. 2 łyżeczki.

651. *Inf. Senegae e 3:00 ad 80:00,*

Liquor amon. anisati 1:00,

Syrup simpl. 15:00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

652. *Inf. Ipecac.*

e 1:00 ad 50:00,

Tart. emetic. 0:05,

Syrup rubid. 10:00.

MDS. Co 5 minut łyżeczkę aż do wymiotów.

Laryngospasmus.

Leczenie przyczynowe krzywicy, zolzów, pobyt na świeżem powietrzu, kąpiele słone i t. d. W razie napadu zbryzgiwania twarzy zimną wodą i wewnętrznie, celem zapobiegnięcia napadom.

653. *Kali bromati 3:00,*
Aq. destill. 80:00,

Syr. simpl. 20:00.

MDS. Co 3—4 godz. łyżkę.

W razie częstych napadów:

654. Chloral hydrat 2'0.

Aq. destill.

Mucilag. gum. arab. āā. 50' 00.

S. Co 2 godz. łyżeczkę aż do ustania napadów.

Leukaemia.

Przyczyna niewiadoma. Leczenie prawie zawsze bez skutku.

Podawać należy chininę z żelazem, lub dodatkiem arszeniku. Po dłuższem użyciu zmienić na ol. eucalyptusowy i piperynę, lub polecić pić wodę Gubera, Levico lub Roncegno, kąpiele borowinowe (Mattoni). Krynica Żegiestów, St. Moritz, Francensbad.

Próbowano robić wstrzykiwania do miększu śledziony:

Ergotyny 0'50—1'0, Sol. arsen. Fowleri lub Tra Eucalypti. Żywić chorego forsownie, pobyt na świeżem powietrzu najlepiej górskim, mierny ruch, zresztą leczenie symptomatyczne.

Radzono inhalacye z tlenu 30—50 litrów dziennie.

655. Piperini 5'00,

Ol. Eucalypti e fol. rec1. 0'00,

Chinin muriat. 4'00,

Extr. et pulv. liquir q. s. ut f. pil. N. 100.

S. 4—8 pigulek dziennie.

656. Chin. mur. 5'00,

Ferri carbon. sacch. 4'00,

Natri arsenicosi 0'10,

Extr. et pulv. Gent. q. s. ut f. pill. N. 100.

S. 1—2—5 na dzień.

Lupus.

Wyskrobanie łyżeczką miejsc zajętych, nacięcia przy miejscowym znieczuleniu, przyżeganie 2 razy w tygodniu dobrze zaostrzoną laseczką lapisu, therkauterem i t. d. Dzieciom wewnętrznie tran, kal. jodat., że-

lazo. Także przyżeganie z acid. lacticum lub pędzlowanie np.

657. Kali hydrojod. 10'00,

Jodi puri 5'00,

Glycerini 20'00.

S. 3 r. w tygodniu pędzlować.

658. Hydroxylamin. muriat.

0'10,

Spir. vini,

Glycerini āā. 50'00.

DS. Pędzlowanie.

Malaria vide intermittens.

Mania.

Odosobnienie zabezpiecza chorego i otoczenie. Unikać alkoholu, dyeta pożywna mięsna obok żelaza, arsenu i t. p.

Tylko w razie silnego podrażnienia mózgu (zrywań, zgrzytania zębami, przy zweżeniu źrenic) można stawiać pijawki i podać środki przeczyszczające. Kąpiel, lodowe okłady. Jeżeli przeważa podrażnienie płciowe Kali bromat 4—10'0. Jeżeli mania skutkiem opilstwa: morfina, opium.

Przy objawach anaemii mózgu wino, piwo, chloral lub Secal. corn. np.

659. Ergotini bis dep. 0'06,

Aqu. dest. 180'00,

Syr. rubi idaei 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

Melancholia.

Największy spokój, położyć chorego do łóżka.

Czuwać, aby chory sobie lub otoczeniu szkody nie zrobił. Dyeta pożywna, w razie potrzeby sztuczne karmienie. Środki nasenne, opium, letnia kąpiel 26—28 R., chloral w lewatywie 3—4 grm., lub Somnal 2—3 grm. pro dosi, lub sulfonalu 1 grm. w gorącym mleku.

- 660.** *Paraldehyd.* 3'0—6'0,
Tinct. aurant 20'0.
 S. Na raz użyć.

Meningitis Cerebro-spinalis epidem.

Leczenie objawów. Rozpocząć podaniem Calomelu, w dużych dawkach, a następnie dbać, by były dobre codzienne wypróżnienia. Łód na głowę i na kark, lub zastosować przyrząd Leitera, pijawki, bańki wzdłuż kręgosłupa. Wcieranie szaruchy na ogoloną głowę lub maści jodoformowej. Wstrzykiwanie morfiny, chloral i natrum bromatum. Natrum jodatum (1—2 gramów dziennie). Przeciw gorączce: Antipiryna, wobec obrzęku stawów acid. Salicyl., Salipyr.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe, Cocain. muriatic. (1:10, po 5 kropli).

- 661.** *Jodoformii* 5'00,
Vasellini 50'00.

Mfung. DS. Wcierać 2 razy na dzień w głowę.

- 662.** *Chloral hydrat.* 5'0,
Aqu. destill.
Syr. aurant. āā. 50'0.
 S. Co 2 godz. łyżkę.

u dzieci

Zimne okłady na głowę, wcieranie szaruchy (2'00—4'00) w tyłogłowie i kark. Wewnętrznie Kalomel (0'01—0'03 co godzinę), pryszczydła — starszym dzieciom i silnym można postawić pijawki. W razie drgawek chloral w lewatywach. Przeciw wymiotom pigułki lodowe. Po uspokojeniu unikać gwaru, rażącego światła; dyeta z początku ścisła, później pożywna, ciepłe kąpiele 35° C. z okładem zimnym na głowę $\frac{1}{2}$ —1 godz. 1—2 razy dnia.

Przetwory jodowe, Natrum jodatum 1% co 2 godz. łyżeczkę, wcieranie 10% maści jodoform.

Meningitis tuberculosa.

Jeżeli dzieci chudną, gruźle obrzmiewają dawać chinin z żelazem i wcierać jod w gruźle. Gdy choroba wybuchnie, leczenie według objawów. W pierwszych chwilach przeciw podrażnieniu mózgu natr. bromat. (1—2 grm. pro die) zimne okłady na głowę. Pokój zaciemnić. Lewatywy i środki przeczyszczające. Pokarmy dawać często w małych ilościach. Baczność na oddawanie moczu.

- 663.** *Calomelanos* 0'30—0'50,
Sacchari 2'00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
 DS. Co godz. proszek.

- 664.** *Kali v. Natr. jodat.* 1'00—2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup Sacchari 20'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

- 665.** *Natri bromati* 1'00—2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup Sacch. 20'00.
 MDS. Co 2 godz. 2 łyżeczki

W razie wielkiego rozdrażnienia lub drgawek:

- 666.** *Chloralhydrat.* 1'00,
Natri bromat. 1'00,
Aqu. dest. 80'00,
Syrup cort. Aurant. 20'00.
 MDS. Co godzinę łyżeczkę.

- 667.** *Urethani* 1'50,
Natri brom. 0'50,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup simpl. 15'00.
 MDS. Co godz. łyżeczkę

- 668.** *Jodoformii* 2'00,
Lanolin
Vaselin āā. 10'00.
 Mf. ungu. DS. Wcierać na tyłogłowie.

Po obcięciu włosów przy skórze posmarowawszy przykryć cienką ceratką.

Metritis.

W przypadkach ostrego zapalenia macicy: spokojne leżenie w łóżku, u osób silnych kilka pijawek na okolicę podbrzusza, zimne okłady, worek lodowy, nacinanie części pochwowej macicy.

Środki solne wypróżniające. W razie bólu masć:

669. *Extr. Bellad. 2'00,*
Vasellini flavi 30'00.

Mf. ungu. DS. Zewnętrznie.

670. *Extr. opii aquosi 0'10,*
But. Cacao q. s. ut f. l. artis
suppositoria ad anum N. V.

DS. Co 3—4 godz. czopek.

Po ustaniu bólów, okłady wysychające na brzuch zamiast lodu.

W przypadkach przewlekłego zapalenia: unikanie pracy fizycznej nateżającej, gwałtownego spółkowania, uregulowanie stolca (środki solne, Cascara Sagrada, Hunyadi Janos, Saratica).

U niedokrewnych podawanie żelaza. Jeżeli równocześnie miesiączkowanie zbyt obfite:

671. *Extr. Hydrastis Canad. fabricationis Parke et Davis*
40'00.

D. in l. guttatoria.

S. 3 razy dnia po 20 kropel.

Leczenie miejscowe: Przestrzykiwanie wodą przegotowaną, stopniowo co kilka dni ciepłą wodę podwyższając od 28°—38° R, ale nie silnym prądem, kąpiele nasiadowe ciepłe. Pomazywanie części pochwowej we wzierniku co 2—3 dni cum Tra jodi, albo Ichthyolem. Tampony w przypadkach świeżych.

672. *Ammon. sulf. ichth. 5'00,*
Glycerini 200'00.

DS. Do tamponów lub

673. *Kali jodati 5'00,*
Glycerini 100'00.

D. in v. nigro.

S. Do tamponów.

Nakłuwanie co kilka dni części pochwowej we wzierniku, miesienie.

W przypadkach zastarzałych amputatio portionis vaginalis, gdy powiększenie macicy znaczne, leczenie kąpielowo zdrojowe: Iwonicz, Rabka, Ciechocinek, Rymanów, Truskawiec. W późniejszych okresach: Krynica, kąpiele morskie. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Menorrhagia.

Nie jest właściwie chorobą, lecz tylko objawem choroby ogólnej w ustroju (haemofilia, bladaczka), jako przyczyny można uważać masturbację, wzruszenia umysłowe, występuje w przebiegu lub po chorobach zakaźnych jak płonica, ospa, dur, ostry gościec stawowy. Jako przyczyny miejscowe wymienić należy: Niedowład macicy po częstych porodach lub poronieniach, zatrzymanie części łożyska lub błon, zmiany zapalne na błonie śluzowej macicy i jej mięszu, zmiany zapalne w częściach dodatkowych, zmiany położenia macicy, nowotwory macicy (włókniaki); wreszcie występuje obfita miesiączka w okresie przejściowym (climax), prawdopodobnie wskutek zmian w naczyniach. Leczyć zboczenia w ogólnym organizmie, polecić odpowiednie zachowanie się higieniczne i dyetetyczne. W czasie miesiączki spójność. a jeżeli mimo to krwawienie jest silne leczyć

tak, jak krwotok macieczny. (Patrz następny ustęp). Gottschalk poleca 4—5 dni przed wystąpieniem krwawienia 4 razy dnia po 0'025 stipticinum (Cotarninum muriaticum) w proszku, a w razie wystąpienia krwotoku podawać dozę środka.

Metrorrhagia.

Dokładne wykazanie przyczyny krwotoku.

W przypadkach krwotoku poporodowego z macicy, jeżeli przyczyną złe kureczenie się tejże: nacieranie dna macicy przez powłoki brzuszne ręką, okłady zimne na brzuch, Secale cornutum przez usta, w lewatywie lub podskórnie. Wstrzykiwania gorące na 40° do pochwy. Uciskanie macicy dwuręczne. W ostatnich czasach Dührssen tamponuje macicę gazą jodoformową.

674. *Extr. Secalis cornut.* 3'00.

DS. Na koniec noża w rosółle zażyć.

675. *Extr. Secalis corn.* 2'00,

Aqu. dest. 100'00,

Syr. cort. aurant. 15'00.

DS. Co godzinę łyżkę.

676. *Hydrast. muriat.* 0'02,

Sacchar. albi 1'00,

Mf. trochisci D. t. dos. XII.

S. 4 pastylki dziennie.

677. *Extr. fluid. Gossyp. herb.*

20'00.

S. 3 razy dnia po 20 kropel.

678. *Extr. fluid. Hamamelidis*

virgin. 30'00.

S. 3 r. dnia po 1/2 łyżeczki.

Gdy macica dobrze skurczona i nie nie zawiera, a krwotok trwa, domyslać się należy przyczyny krwotoku w pęknięciu ujścia zewnętrznego macicy, lub na innym miejscu. Założyć

wziernik i tamować krwotok miejscowo przez podwiązanie, ucisk, tamponadę, zeszyście pęknięcia.

Jeżeli przyczyną są pozostałe części łożyska, błon, skrzepy: usunąć je dokładnie, jeżeli można ręcznie, a gdy to niemożliwe, wyskrobać jamę macicy.

Gdy to nie pomaga wytamponować pochwę zapomocą Penghawar-Djamby w gazie jodoformowej i jeżeli przyczyną — nowotwory macicy — usunięcie tychże sposobem operacyjnym. Na razie, podczas krwotoku tamponada pochwy, po przestrzyknięciu tejże roztworem środka przeciwniepalnego j. n. p. 20% roztwór kw. karbol.; 1:2000—3000 roztwór sublimatu i t. d. Do tamponowania najlepiej użyć, kulek waty oczyszczonej, zamoczonej w glicerynie, pierwsze kulki owinać gazą jodoformową.

W przypadkach gwałtownych, wstrzyknięcie do jamy macicy, roztworu Liquor ferri sesquichlor. strzykawką Madurowicza lub Brauna, przyczem warunek konieczny, aby kanał macicy był dostatecznie drożny, aby roztwór mógł przez szyję macicy do pochwy spływać. (Postępowanie obosieczne, ze względu na możliwość dostania się roztworu do jamy brzucha). Wreszcie okłucie od pochwy tętnic macicznych. W ostatnich czasach polecają i zachwalają tak środki miejscowo zastosowane jak i wewnętrzne.

Do pierwszych należy ferri-pyrina jako proszek na tamponach lub 20% roztwór wodny, dalej zastosowanie do wnętrza macicy za pomocą odpowiedniego cewnika strumienia pary wodnej 100° C. 2—3 minut (Swiguerieff).

Wprowadzanie do macicy patyczków szklanych watą owi-

nietych, napojonych płynem, który otrzymujemy przez zmieszanie antypiryny i salolu w równych częściach i ogrzewanie tego proszku w probówce nad lampą spirytusową po 2—3 minutach tworzy się płyn brunatny, po oziębieniu krzepnie, lecz dalej ogrzewany, utrzymuje się dłużej w stanie płynnym (Labadie — Lagrave).

Do nowszych środków wewnątrz podawanych należy Stipticin (Cotarnin. muriaticum) podawane w proszkach $\bar{a}\bar{a}$. 0:05 5—6 razy dnia lub w kapsułkach; w razie gwałtownych krwotoków wstrzyknąć co dnia 0:20 w miesiąc pośladowy. — (Gottschalk).

Równocześnie zwalczanie powstającej ostrej niedokrewności: ułożenie spokojne, poziome, ciepłe okłady na głowę, chłodne napoje, wino, kawa czarna, cognac, rum, Tinct. cinnam, Tra ferri acet. aeth. Wstrzykiwania podskórne eteru, ol. camphoratum, wstrzykiwania podskórne większych ilości rozczyntu soli kuchennej 0:6:100; lewatywy z tegoż rozczyntu.

679. *Trae Cinnam.* 50:00.

S. Co $\frac{1}{2}$ godziny $\frac{1}{2}$ łyżeczki we wodzie.

680. *Tint. Ferri act. aeth.* 15:00

S. 15 kropli do $\frac{1}{2}$ szklanki wody do popijania.

Bandaże na kończyny, ucisk na tętnicę główną przez powłoki brzuszne.

Migraena zob. Haemicramia.

Morbili, Odra, Kur.

Niemowlęta i chorowite dzieci oddzielić. Jeżeli przebieg prawidłowy nie trzeba uciekać się do lekarstw. Pokój ostrożnie przewietrzać, ciepłota od 15—16° R.

okrycie średnio ciepłe, lekkie przysłonięcie okien, jeżeli jest światłowstręt.

Dyeta w czasie gorączki ścisła, po jej przebyciu pożywna, za napój lekkie kwaski, lub wody (szczawy alkaliczne). Dopóki trwa łuszczenie nie wypuszczać dzieci z łóżka, a mniej więcej 8—14 dni nie wypuszczać z pokoju, zwłaszcza, gdy są objawy nieżyty.

Przeciw nieżyty spójówek wystarczają przemywania 2% kw. borowego. Silny świąd uspakaja się nacieraniem tłuszczami.

681. *Lanolin anhydr.* 50:00,

Vaselin americ. 20:00,

Aq. dest. 25:00.

M. terendo f. Ung.

S. Co 3 godz. nacierać.

Silny kaszel wywaga podania naparu ipecac. ze środkami narokotycznymi, wzięwania pary wodnej, napoje ciepłe, odwar ślazu i t. p. W razie biegunki dyeta i opium.

Wysokie gorączki i majaczenia, uśmierzać zimnemi okładami na głowę. Chinina — antypiryna, Natr. salicylicum.

Wśród upadku sił, stygnięcia kończyn: wino, cognac, camphora, Acid. benzoicum.

Przeciw drgawkom: Chloral w lewatywach (0:50:50) kali bromatum (2:100) co godzinę łyżeczkę.

Jeżeli gorączka przewleka się ponad 4 dni, zwrócić uwagę na przełyk, uszy i nerki.

Powikłania: błonica, dławiec, nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, leczyc według wskazówek odpowiednio podanych.

682. *Codeini phosphor.* 0:02,

Linctus gummosi 50:00,

Syrup Altheae 30:00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę w razie silnego kaszlu.

683. *Extr. Hyoscyami* 0·15,
Aqu. dest. 70·00,
Syr. simpl. 10·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

684. *Infus. Ipecac. e* 0·20 *ad*
 100·00,
Tinct. laudani gtt. duas.
Liquor ammon. anisat. 1·00,
Syrup althaeae 20·00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Morbus Basedowii.

Regularne, higieniczne życie unikanie zmęczenia fizycznego i umysłowego. wstrzymanie się od nadużywania a nawet od picia wysokoku, herbaty, kawy, nadmiernego palenia. Pobyt na świeżem powietrzu, zwłaszcza w górach Davos, St. Moritz, Zakopane, Szmeks, Truskawiec lub nad morzem.

Na okolicę serca okład zimny lub lód, zwłaszcza podczas silniejszej akcyi serca, oraz digitalis lub strophantus w miernych dawkach.

U chorych osłabionych anemicznych: żelazo, chinina, arsen, zabiegi wodolecznicze, obok systematycznego stosowania prądu galwanicznego na sympaticus (ganglion supremum i processus mastoidei).

Przetwory bromowe i nervina, woda Gubera, Levico, Roncigno, Żegiestów, Krynica, Elster, Francensbad, obok należytego odżywiania i psychicznego spokoju.

685. *Natri brom.*

Aq. amygd. am. āā. 15·00,
Trae convall. maj. 12·00,
Aq. dest. 60·00.

DS. 2—3 łyżeczek na dzień.

686. *Ferri lactici* 1·00,
Coff. natr. sal. 1·5,
Elaeosacch. foen. 5·00.
Mfp. Div. in dos. N. XX.

S 2—3 proszki dziennie.

Morbus Brighti.

Jeżeli mamy do czynienia z ostrym Morb. Brighti, to chory powinien bezwarunkowo leżeć w łóżku, w jednostajnie cieplej temperaturze. Dyeta złożona z mleka, kleików, rosółów, lekkich zupek, trochę kaszki, lub ryżu w mleku. Do picia wodę szczawnicką, bilińską, gieshübelską, ubogim zaś zwykłą wodę z dodatkiem cytryny lub kwasu, uważać przytem by stolce były regularne.

Na okolicę nerek stawiać bańki suche, nawet cięte lub pijawki, jeżeli mocz bardzo krwawy i zawiera wiele białka.

Jeżeli opuchliny są znaczne, to polecić kąpiele gorące zaczynając od 28° R. do 30° i 32° R. po 15—45 minut, ze zlewaniem na głowę, następnie zawija się chorego w koce na 1—2 godzin, żeby się dobrze pocić. Jeżeli chory czuje się w kąpieli bardzo osłabionym, dać można kieliszek wina. Albo też urządzić się choremu w łóżku sztuczną parówkę za pomocą przyrządu opalanego spirytusem. Obok tego można dawać mierne dawki kardiaków, jak digitalis, strophantus lub coffein dla połączenia działania napotnego z moczopędnem. Wstrzykuje się też pilokarpinę po 0·01—0·02 na dawkę, uważając jednak czy nie nastąpi zapad. Obok napotnych i moczopędnych polecają silne środki przeczyszczające jak colocynth, Jalapa, gumi gutti, Rheum, nawet pig. Morisona.

W razie przypadków mocznicy, w uraemii, kąpiel gorąca ze zlewaniem zimnemi, silny laxans, podskórnie eter lub kamfora, albo też do lewatywy Hydras chlorali 2—3 gramów lub Acid. benzoicum po 0·2 co 2—3 godz. u silnych wenesekeya, pijawki.

Nephritis p. scarlatinam zobacz Scarlatina.

Jeżeli okres przewlekły, chory niekoniecznie ma leżeć w łóżku, zwłaszcza, jeżeli opuchliny nieznaczne.

Dyeta przeważnie mleczna, 2—4 litry mleka, jaja, mięsa mniej, jarzyny, żadnych alkoholików i korzeni.

Do picia wody: Bilińska, Giesshübel lub woda z kwaskami, Truskawiec. Unikać zmęczenia fizycznego, odziewać się ciepło, nie narażać się na niepogodę i zmiany temperatury.

Choremu należy polecić mierne dawki tanniny lub Plumb acet. Ferr. sesquichloratum obok ciepłych kąpieli, mniej energicznie stosowanych, jak w okresie ostrym i zawiązania w koce. Nadto podawać diuretica: Coffein 1·0—1·50 p. die, theobrominum salicyl. w tych samych dawkach, digitalis, adon. vernalis z dodatkiem Liq. kali acet. 15—20 na 200.

687. *Fol. Joborandi w naparze.*
Rad. Onodinis, Rad. Petroselinii, Bacc. Juniperi jako ziółka.

W razie zaparcia stolca środki przeczyszczające.

688. *Diuretini 5·00,*
Aq. dest. 100·00,
Syr. aurant. 15·00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

689. *Strontii lactici 50·00,*
Aq. dest. 250·00.
MDS. 2 łyżki dziennie.

690. *Acidi benzoici 0·20,*
Elaeosacch Citr. 0·50.
Mfp. Dent. tal. dos. N. V.
S. Co 2 godz. proszek.

691. *Flor. Benzoes*
Sacch. albi aa. 2·0.
Mfp. Div. in dos. N. X.
S. Co 3 godz. proszek.

692. *Blatt. orient. 2·00,*
Elaeosacch. foen. 5·00.
Mfp. div. in dos. N. XII.
S. 2—3 proszki na dzień.

Morpiones zob. Pediculi pub.

Myelitis.

W ostrej:

Ułożenie chorego równo w łóżku, najlepiej na poduszkach powietrznych. Bańki cięte lub pijawki w samym początku choroby, potem Tra. jodi, weierki z Ung. cinereum 3—4 grm. p. die i jednocześnie kali jodatum, jeżeli była lues, a nawet jako środek przeciwzapalny.

Uważać przy tem na ślinotok, lodowe okłady na stos pacierzowy. Równocześnie silne środki przeczyszczające: Kalomel, Jalapa, Senna. Uważać na odleżyny, na zatrzymanie moczu.

W przewlekłej formie:

Kąpiele ciepłe, wyjazd do Cieplic, Gasteinu, Trenczyna, Wildbadu, Swoszowic, Piszczan, Lubienia, Truskawca i t. p. wód. Elektryzowania prądem stałym i faradycznym. Na wewnątrz kali jodatum z 10:200, 2 łyżki dziennie. Arg. nitricum 0·01—0·02 w pigulkach, arsen po 0·01 lub Ergotynę po 0·10—0·50 2—3 razy dziennie (skutek jednak wątpliwy).

Myringitis zob. Otitis.

Nephritis zob. Morbus Bright.

Neuralgia intercostalis.

Przedewszystkiem wysledzić przyczynę, najczęściej malaria, wtedy Chinina i Arsen.

Elektryzowanie, weierania kojących maści. Wstrzykiwania morfiny lub antipyriny.

- 693.** *Chloroformii* 10·00,
Ol. hyosc. cocti
Ol. olivar. āā. 20·00.
 MDS. Do nacierañ.
- 694.** *Extr. Opii aquos.* 2·00.
Spir. aromat. 100·00.
 DS. Do wecierañ.
- 695.** *Veratrini* 0·50,
Chloroformii 10·00,
Spiritus 50·00.
 MDS. Do nacierañ.
- 696.** *Antipyrin.*
Aqu. dest. āā. 5·00.
 MDS. 1 lub 2 strzyk. wstrzy-
 knąć w okolicę bólu.

Neuralgia trigemini, Proso- palgia. Tic douloureux.

Uwzględnić i leczyć przyczy-
 ny: anemia, histerya, zimnica,
 choroby ucha, zębów itp.

Wycięcie blizny ugniatającej
 nerw. Leczenie przymiotu, za-
 trucia ołowiem (Truskawiec).

- 697.** *Chinin muriat.* 0·50,
Dtur. tal. dos. N. X.
 S. Jeden proszek przed na-
 padem.
- 698.** *Exalgin* 2·50,
solve in
Tinct. cort. aurant. 5·00,
Aq. destill. 120·00,
Syr. aurant. 25·00.
 S. Rano i wieczór łyżkę.
- 699.** *Solut. arsen Fowleri* 10·00.
 DS. 3 razy dziennie od 3—5
 kropel po jedzeniu.
 Wrazie bólu powstałego z prze-
 ziębienia:
- 700.** *Butyl chloral* 2·00—3·00,
Spir. vini rectif. 10·00,
Glycerin 20·00,
Aqu. dest. 120·00.
 MDS. 3—4 łyżek na raz.
 (Dawki według stopnia bólu
 i indywidualności chorego).

- 701.** *Natri Salicyl.* 5·00,
Aqu. dest. 180·00,
Syrup aurant. 20·00.
 MDS. Co godz. łyżkę.
- 702.** *Extr. Gelsemii fluid.* 10·00.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 5 kropel.
 (Najwyżej 3 dawki).
- 703.** *Analgeni* 0·50.
 3—4 razy na dzień.
- 704.** *Antipyrin* 0·50,
Dtur. tal. dos. N. 10.
 DS. Rano i wieczór proszek.
- 705.** *Methyl. caerul.* 0·02—0·03,
Dent. tal. dos. Nr. VI.
 S. 2—3 razy dziennie.
- 706.** *Veratrin.* 0·15,
Morphii acet. 0·10,
Ungu. cerei 10·00.
 Mf. ungu. S. Wecierać w miej-
 scą bolące.
- 707.** *Aconitini cryst.* 0·01,
Spir. vini concentr.
Aq. dest. āā. 30·00.
 S. 2 łyżeczki dziennie.
- 708.** *Antinervin.*
Sacch. alb. āā. 5·00,
Div. in dos. Nr. X.
 S. Co 2 godz. proszek.
 Elektryczność, naciąganie lub
 wycięcie kawałka nerwu.

Obstipatio alvi habitualis.

Usunąć przyczyny cierpienia,
 środki lekko czyszczące, dyeta
 mieszana, kompoty, jarzyny, o-
 woce, figi, miód, pierniki, zimna
 woda na czczo, u chorych, któ-
 rzy znoszą mleko, dawać tak-
 we w sporych ilościach. Nieraz
 dobre skutki wywiera kuracya
 winogronowa.

Na noc okłady wysychające na
 brzuch. Elektryzowanie prądem
 przerywanym.

Obok tego zabiegi hydropa-
 tyczne, mięsienie, codzienne le-
 watywy, wody mineralne: Karls-

bad, Marienbad, Hunyady Janos, Saratica, Kissingen (Rakoczy), Saidušütz, Friedrichshall, proszki Seidlickie.

709. *Decoct. pulp. Tamarind*
e 15'00 ad 150'00,
Cremor. tartari 15'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę lub na noc 3—4 łyżek — lub też powidełka tamaryndowe wyrobu Sie-dleckiego.

Ziołka francuskie St. Germain.

710. *Trae Rhei vinos.*
Extr. fluid. Cascar. Sagr.
āā. 25'00.

DS. 2 razy dnia po $\frac{1}{2}$ do 1ej łyżeczki.

711. *Extr. Aloë aquos.*
Extr. taraxaci āā. 5'00,
f. pil. N. 50.

S. Rano i wieczór po 1—2 pi-gulek.

712. *Trochisci compressi e Rho*
ā 0'50 N. 50.

DS. Co dzień na noc 1—3 pa-stylek.

713. *Trochisci compressi e Cas-car. Sagrad* ā 0'50 N. 50.

S. Co dzień na noc 1—3 pa-stylek.

714. *Sal. therm. Carolin.* 100'00.
DS. Co dzień na czczo łyżecz-kę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody.

715. *Natri bicarb.*
Magnes carbon. āā. 50'00,
Pulv. rad. Rhei 7'00.

DS. 2 razy dnia na koniec noża.

Nadzwyczaj zalecają:

716. *Podophyllini* 0'30,
Extr. Aloës
Extr. Rhei āā. 3'00,
Extr. taraxaci q. s. f. pil.
N. 40.

S. Na noc 1—3 pigulek.

717. *Extr. Aloës aquos,*
Extr. Jalapae,
Sapon. medicin. āā. 5'00,
Pulv. et extr. rhei q. s. ut
f. pill. Nr. 50.

S. 4 pigułki rano zażyć.

718. *Pulv. rad. Rhei,*
Extr. aloës aquos āā. 5'00,
Extr. Tarax. q. s. ut f. pill.
Nr. 50.

S. 3 pigułki rano zażyć.

719. *Pulv. r. rhei chin* 5'00,
Extr. Trifol. fibrin. q. s. ut
pill. Nr. 50.

S. 5 pigulek rano zażyć.

720. *Podophyllini*
Sapon. medicin. āā. 0'20,
Mellis dep. q. s. ut f. pill.
Nr. 20.

S. 1—3 pig. dziennie

721. *Extr. Coloquinth.*
Pulv. rad. Rhei,
Pulv. aloës,
Resinae Jalapae,
Gummi gutti āā. 1'00,
Myrrhae 2'00,
F. pill. Nr. 50.

S. 1—4 pig. dziennie.

722. *Calomelanos,*
Tub. Jalapae,
Sacch. lactis āā. 0'30,
Mfp. dent. tal. dos. Nr. X.
S. 2 proszki dziennie.

723. *Aloës* 2'00,
Ferri sulfurici,
Chinini sulfur. āā. 1'00,
Extr. Hyoscyami 0'50,
Extr. et pulv. liquir. āā. q.
s. ut f. pill. Nr. 30,
Consperge c. lycopod.
S. Pigułkę dziennie zażyć.

Przy uporeczywem zaparciu, wlać przez wysoko do rectum wprowadzoną sondę: 70 gr. ae-ter sulph. z 300 gr. Ąq. foeniculi.

Oedema pulmonum,

Leczenie głównej choroby w odpowiedni sposób.

Przy pierwszych objawach o-
brzęku płuc ostrego, podać środ-
ki podniecające akcyę serca jak:
czarna kawa, cognac, grog, wi-
no, kamfora, piżmo. Podskórnice
wstrzyknąć eter, ol. camphora-
tum lub coffeinę.

Zewnętrznie położyć na piersi
i łydki synapizma, rozcierać
nogi i ręce, dać choremu kąpiel
i zlewać głowę i piersi zimną
wodą.

Jeżeli chory jest krwisty, mo-
żna puścić krew, zwłaszcza w o-
brzęku płuc wśród spraw za-
palnych.

Nadto można dać lewatywę ze
środków ostrych jak: Decoct. co-
loeynt., octu, rozczyntu soli itp.

Jeżeli niebezpieczeństwo na
razie minęło, dawać cardiaea
i digitalis, koffeinę, teobrominę,
Sparteinę, Tra stroph. — Po tem
leczyć główną chorobę i zwracać
uwagę na pierwsze objawy
zastoinowe.

724. *Infus. flor. Africae*
e 15'00 ad 120'00,
Camphor. trit. 1'25,
Mucil. g. mimos. 20'00.

Mf. emulsio. S. Co $\frac{1}{2}$ godziny
łyżkę.

725 *Acidi benzoici* 3'00,
Camphor. pulv.
Stibii sulph. aurant. āā. 0'50,
Sacch. alb. 5'00,
Mfp. div. in dos. X.
S. Co 2 godz. proszek.

726 *Inf. rad. Valerian.* e 10'00
ad 150'00,
Aeth. acet. 2'00,
Syr. Seneg. 15'00.
DS. Co godz. łyżkę.

727. *Aetheris sulfur.*
Spir. vin. concn. āā. 5'00,
Aq. destillat. 150'00,
Syr. rub. idaei 15'00.
MDS. Co godzina łyżkę.

728. *Apomorphin. mur.* 0'10,
Aq. dest. 10'00,
DS. 1—2 strzykawki podsk.

729. *Moschi orient.* 0'50,
Sacch. alb. 2'00,
Mfp. div. in dos. quinque.
S. Co godz. proszek.

Orchitis zob. Epididymitis.

Otitis externa circumscripta.

W samych początkach można
zakładać waciki zanurzone w 5⁰/₀
Kokainie lub w roztynie Tinct.
opii 4'00, Aqu. destil. 12'0.

730. *Ol. hyoscyami*
Chloroformi
Trae laud. simpl. āā. 10'00.
S. Weierać w okolicę ucha.

731. *Ol. hyoscyami* 10'00,
Extr. opii aquos. 0'50.
S. 5 kropel ogrzanych na wa-
cie do ucha.

Przy wyraźnym furunkule o-
twarcie tegoż z następownem opa-
trzeniem antyseptycznem, do czego
dobrze się nadaje gliceryna
karbolowa (0'50—15'00) kwas
borowy z alkoholem (0'50—10'00).
W przypadkach często powtarza-
jących się recydyw zalecają za-
puszczanie spirytusu sublimato-
wego Hydrarg. bichl. corros.
0'05—0'10 na 50'0 Spir. vini rect.

O. externa diffusa.

Wprowadzenie gazy zwykłej
zanurzonej w roztynie octanu
glinowego, w płynie Burowa.

O. media acuta suppurat.

Leczenie w początku choroby
i przed przebicciem błony bęben-
kowej, jak przy ostrym katarze,
gdy błona bębenkowa jest zna-
cznie wypukłona, zielonawo
zabarwiona, chory ma silne bóle,
gorączkuje, należy przyspieszyć

samoistne przebicie, wykonując paracentezę. Po tejże, względnie po samoistnej perforacyi, ucho lekko przestrzykiwać 2 r. dziennie lub nawet co godzinę, zależnie od sekrecyi, stosować Politzera. Przy bolesności wyrostka sutkowego, okłady lodowe; w przypadkach ropienia w wyrostku trepanacja.

O. media chronica.

Przy znacznem ropieniu częste przestrzykiwania ucha zwykłą wodą ciepłą i zakładanie następnie waty; w ropieniu bardzo obfitym należy użyć przestrzykiwań przez kateter, co oddaje bardzo dobre usługi. Gdyby wypływ z ucha był cuchnącem, najlepiej jeszcze używać roztworu kali hypermanganici 0'50:100'0. W przypadkach, gdyby to ropienie było podtrzymywane przez caries kostek słuchowych, granulacyi w uchu wewn., nagromadzenie się mas żółciolokowych, te należy usunąć, w postaciach zaś ropienia z atyku przestrzykiwania tegoż kaniulą Hartmana.

Przy ropieniu nieznacznem po wystrzykaniu ucha i dokładnem osuszeniu, stosować zadmuchiwanie miążkiego kwasu borowego, dalej zapuszczania

732. *Acid. borici* 0'60,
Glycerini
Aqu. dest. āā. 10'00.
DS. Krople do ucha,

733. *Argenti nitrici* 0'50,
Aq. destil. 10'00.
DS. 10—15 kropel do ucha.

734. *Nosopheni*
Acidi borici āā. 5'00.
Mfp. S. Wdmuchiwanie do ucha.

735. *Antinosini* 0'50,
Aq. destill. 100'00.
DS. Do przestrzykiwań ucha.

Zinci sulfur. 0'20 na 20'0 *Aquae dest.*, lub Zinci sozo-jodolici 0'4—0'6:20'0 dodając odpowiednio 1'00—3'00 *Spir. vini rectific.* lub bez tegoż, dalej *Natrum tetraboricum* w roztworze od 4—20%₀; zresztą chronienie ucha od wpływów zewnętrznych, przez noszenie ciągle waty w uszach.

Oxaluria.

Dyeta przeważnie mięsna, mleczna, unikanie mącznych pokarmów, jarzyn, octu, cytryn, wina.

Ze środków leczniczych: picie wód Vichy, Karlsbad, Elster, Salzbrunn, Wildungen.

Na wewnątrz: *lith. carb.*, *lith. salicylicum*, *Natr. carbon.* po 0'50—1'0 dziennie w wodzie selterskiej.

736. *Natri bicarb.* 10'00,
Lith. carb. efervescentis 50'00,
Mfpulv. Div. in dos. N. XX.
S. Rano i wieczór proszek w szklance wody.

737. *Natri bicarb.* 2'00,
Lith. carbon.
Kali carbon. āā. 0'50,
Aq. flor. naph.
Syr. simpl. āā. 20'00,
Aqu. dest. 300'00.

DS. Przez dzień wypić (rozczyn Ewicha).

738. *Natr. phosphor.* 10'00,
Div. in dos. Nr. X.
S. Raz dnia proszek.

Oxyuris vermicularis.

Lewatywy z wody, czosnku roztartego w wodzie (garść na 1 litr) z $\frac{11}{2}\%$ ₀ roztworu sublimatu, lub też lewatywy z czystego tranu.

739. *Butyri Cacao* 3'00,
Calomelanos 0'05,
Mf. supposit. *Dtur. tal. dos.*
Nr. V.
S. Na noc jeden czopek.

740. *Naphthalin* 1'00.
Ol. olivar. 40'00.
 MDS. Do lewatywy.
 Dorosłym 5—6'00:80'00 oliwy.

741. *Santonini* 0'15,
Ol. papaver. 50'00.
 S. Do lewatywy.

Ozaena.

Leczyć chorobę, na której tle występuje: (kiła, żołądź, gruzlica). Zwracać uwagę na czystość powietrza, utrzymywać jednolitą ciepłotę. Ostrożne przestrzykiwania $\frac{1}{2}\%$ roztworem soli kuch. $\frac{1}{10}$ kw. borowy, masę borowa. W razie trudności przy ssaniu, karmienie osesków łyżeczką. Wdmuchiwanie kalomelu.

742. *Zinci sozodolici* 2'00,
Vasellini
Lanolini āā. 20'00.
Paraf. liquidi q. s. f. ung.
 S. Posmarować gazę i włożyć do nosa.

743. *Calomelanos* 1'00,
Hydrgr. praec. rubri 0'50,
Sacchari 20'00.

Mfp. S. Do wdmuchiwań.

744. *Ichthyoli* 10'0.
Ol. ricini 20'0,
Spir. vini 100'0.
 S. Do inhalacji.

745. *Saloli* 1'0,
Acid. salicyl. 0'20,
Tannini 0'10,
Acid. borici sublt. pulv. 4'0.
 Mfp. S. Tabaka. Co godzinę zażywać przez $\frac{1}{2}$ dnia.

746. *Jodoli cryst.* 20'0.
 S. Do wdmuchiwań do nosa.

747. *Jodoformi* 0'30,
Vasellini 30'0.
 S. Masć.

St. Sawicki radzi wdmuchiwanie par formaliny.

Panophthalmitis p. Iridochorioiditis.

Parametritis p. Perimetritis.

Paraphimosis.

Starać się odprowadzić za pomocą palców, wywierając ucisk na żołądź; jeżeli się nie udaje, nacięcie pierścienia ścieśniającego (strangulacyjnego) następowe odprowadzenie napletka, okłady zimne.

Pediculi capitis.

Polecić obwiązać głowę dokładnie chustką lub zrobić opatrunków z opaski flanelowej (tak, by objęte były wszystkie włosy) napuścić takową na noc czystą naftą lub z dodatkiem balsamu peruwiańskiego. Procedura taka powtórzona dwa razy wystarczy, by wygubić pasożyty. Kiedy to się stało, wymyć głowę letnią wodą i mydłem, wyczesać głowę gęstym grzebieniem.

Pediculi pubis.

Nasmarować okolice wżgórka łonowego, prącie, perineum, anus c. unguento cinereo lub $\frac{1}{10}$ roztworem Hydrarg. sublimat. corrosivi, następnie kąpiel z mydłem.

Pericarditis.

Przedewszystkiem spokój, chory powinien leżeć w łóżku, mało się ruszać. W okresie ostrym na okolice serca worek lodowy. W razie silnych bólów parę pijawek, suche bańki, pędzłowanie c. Tra. jodi. Na wewnątrz Inf. digitalis c. 1'00 ad 200'000. co godzinę łyżkę, lub inne cardiacum. W razie silnej gorączki podawać antypyrinę, fenacetinę lub antifebrynę w po-

łączeniu z kofeina dla uniknięcia zapadu. Jeżeli bóle trwają, dać morfinę, chloralhydrat, lub sulfonal na noc. Dyeta przy tem płynna niepodniecająca, uważać na regularne stolce. — Jeżeli okres zapalny minął, stosować resorbentia: okłady ciepłe, pedzłowanie jodyną, diuretica, jak: coffeina, diuretyna, digitalis, Tra strophanti itp. a dyeta wówczas posilna, lekko podniecająca.

W uporeczywych przypadkach można zrobić punkcję i aspirację przyrządami Potaine'a lub Dieulafoy, lecz rzadko kiedy chory się na to zgodzi.

748. *Infus. fol. digit.*
e 1'00 ad 180'00,
Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co 2 godz. 2 łyżki.

749. *Tinct. Strophanti* 10'00.
DS. 3 razy dz. po 10 kropel.

Po ustaniu gorączki, gdy exsudat zostaje:

750. *Infus. Juniperi* e 15'00
ad 200'00,
Liqu. Kali acet.

Oxymell Scillae āā. 15'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

751. *Infus. hb. Digitalis*
e 1'00 ad 150'00

Kali acet. 5'00,

Syrup simpl. 20'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

752. *Decoct. Equiset.* e 20'0 ad
200'0,

Liquor. terr. fol. tart.

Oxymell. scillae āā. 15'0.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

753. *Pulv. fol. digit.* 0'5
Coff. natrobenz 1'00
Sacch. lactis
Elaeosacch. Calami āā. 1'5.
Mfp. Div. in dos. N. X.
S. 3 proszki dziennie.

754. *Sparteini* 0'02,
Sacch. albi 0'20,
Mfp. Dtal. dos. N. X.
S. 3 proszki na dzień.

755. *Trae cacti grandiflor* 10'0.
DS. 3 razy dziennie po 10
kropel.

756. *Trae Nerii oleander.* 1'00.
DS. 3 razy dziennie po 10
kropel.

Perimetritis.

Tu możemy też mówić o zapaleniu około trabek i jajników (perisalpingitis et perioophoritis) jak również o zapaleniu tkanki okołomaciecznej (parametritis), gdyż objawy i leczenie są bardzo do siebie podobne.

W okresie ostrym:

Spokojne leżenie w łóżku, okłady lodowe na okolice bolesną, w razie znacznej boleści i gwałtownych objawów, u osób silnych 5—6 pijawek nad okolicę pachwinową, dyeta ścisła, płynna, nadto wewnętrznie: Tra opii simpl. po 10 kropel kilka razy dziennie albo:

757. *Extr. opii aquos.* 0'10,
But. Cacao q. s. ut f. l. artis suppositoria ad anum
N. V.

DS. Co 3 godz. czopek użyć.

Gdy nasilenie objawów się zmniejsza rzadziej.

Gdy ciepłota opadnie, środki łagodnie wypróżniające: lewatywy z wody, z dodatkiem 2 łyżek ol. ricini albo z dodatkiem łyżki gliceryny. Czopki glicerynowe, oleum ricini wewnętrznie.

Gdy objawy ostrego zapalenia ustąpiły, okłady wysychające, po ustąpieniu bolesności: kąpiele nasiadowe ciepłe, z dodatkiem $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ kilo soli na kąpiel. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa) Truskawiec.

Przestrzykiwanie pochwy słabym prądem wodą 30—38° R. z dodatkiem soli kuchennej (2 łyżki na litr) lub z dodatkiem płynu o składzie:

758. *Kalii jodati* 3·0—5·0,

Trae jodi 15·0—20·0,

Aq. destill. 250·0.

S. 1—2 łyżek na litr wody.

759. *Trae jodi*

„ *gallarum āā.* 20·00.

DS. Do pędzlowania.

760. *Ammon. sulfo-ichthyol*

5·00—10·00,

Vaselini flavi 50·00.

Mf. ungu. DS. Zewnętrznie.

761. *Ammon. sulfo-ichthyol*

5·00—10·00,

Glycerini 200·00.

MDS. Do tampon. codzien.

W przypadkach przewlekłych mięsienie:

762. *Kali jodati* 10·00,

Gelatini q. s. f. l. art. globuli vaginales N. X.

DS. Raz dnia gałkę użyć lub:

763. *Jodoform. desodorati* 3·00,

But. Cacao q. s. ut f. l. art. globuli vaginales N. X.

DS. Raz dnia gałkę użyć.

764. *Ammon. sulfo-icht.* 1·00,

Butyr. Cacao q. s. f. l. art. suppos. ad anum N. X.

S. 1 czopek dzien. użyć.

Jeżeli w przebiegu chronicznego a zatem późniejszego okresu, mimo użycia wyżej wymienionych sposobów leczenia, badanie i objawy wykazują znaczne zmiany około jajników, lub w nich samych, albo że w trąbce rozszerzonej znajduje się treść (śluz, ropa, krew), to często dopiero leczenie operacyjne usunąć zdoła cierpienie, wskutek którego życie dla kobiety staje się ciężarem. W tych przypadkach na-

leży wyciąć trąbkę schorzałą (salping-ectomia).

Peritonitis.

Przedewszystkiem chory powinien zachować bezwzględny spokój; dyeta ściśle płynna. Wewnętrznie należy podawać przetwory makowca w dużych dawkach, a w razie silnych wymiotów kawałki lodu do połykania i kokainę lub morfinę. Zewnętrznie środki przeciwzapalne, okład lodowy, pijawki, pędzlować brzuch kleiną z dodatkiem jodoformu. Gdy okres ostrego minie, okłady wysychające lub ciepłe. Kąpiele ciepłe całe lub nasiadowe.

W przypadkach surowiczego zapalenia z przebiegiem chronicznym, może być czasem wskazane wypuszczenie płynu z jamy brzusznej, a nawet t. z. toaleta jamy brzusznej.

P. chronica.

Wymaga dobrego odżywiania, wcieranie szarego mydła w ścianę brzucha, kąpiele solne, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa) Rabka, Truskawiec.

P. tuberculosa.

Leczyć według tych samych zasad, wcierać masę jodoformową 25·0 na 100 wazeliny, a następnie brzuch pokryć ceratką Billrotha i opasać cały brzuch flanelą, punkty wykonywać tylko w ostateczności.

765. *Antipyrin* 10·00,

Aqu. dest. 150·00.

DS. 2 łyżki do lewatywy co 2 godziny, póki gorączka nie spadnie do 38.

766. *Laudani pur.* 0·02,

Sacch. albi 0·30,

Dtur. tal. dos. XII.

S. 3 pr. dziennie.

767. *Emuls. communis* 200·0,
Aq. lauroceras. 10 0,
Morphii muriat. 0·10.
 S. Co godz. łyżkę.

768. *Resorcini resublimat* 2·0,
Aq. destillat. 180·0,
Tinct. laud. simpl. gtt. XV,
Syr. simplic. 20·0,
D. in vitr. nigro.
 S. Co 2 godz. łyżkę.

769. *Cocaini mur.* 0·15,
Aqu. dest. 10·00.
 DS. W razie wymiotów 10—
 15 kropel zażyć.

770. *Emuls. commun.* 200·00,
Aqu. lauroc. 5·00,
Morphii mur. 0·05,
Syrup simpl. 10·00.
 MDS. Co godz. łyżkę.

W razie parcia na stolec:

771. *Morphii mur.* 0·01,
Extr. bellad. 0·02,
Butyri Cacao 1·00,
f. suppos. dtur. tal. dos. X.
 S. W razie parcia użyć jedne-
 go czopka.

772. *Jodoform* 5·00,
Lanolin
Vaselin āā. 25·00.

Mfung. S. Rano i w. wcierać.

Perityphlitis zob. **Typhlitis.**

Perniones zob. **Congelatio.**

Pertussis. Koklusz, Krztusiec.

Oddzielić dzieci zdrowe zwa-
 szcza małe. Dyeta pożywna, kar-
 mić zaraz po wymiotach. Pobyt
 na świeżem powietrzu, oddycha-
 nie zgęszczonem powietrzem,
 zmiana miejsca pobytu. Rozpy-
 lanie 5⁰/₁₀ kw. karbol. w miesz-
 kaniu.

W razie wystąpienia zapale-
 nia płuc (napady czasem ustają)
 dawać leki wykrztuśne:

Inf. Ipecac. c. Natro benzoico.

773. *Trae Bellad. gtt.* 2—5,
Mixtur. gummos. 100·00,
Syrup simpl. 15·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

774. *Chloral hydratis* 0·50,
Ammon. v. Natri brom. 2·00,
Aqu. dest. 100·00,
Mixtur. gumm.
Syrup rubid. āā. 15·00.
 MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

775. *Cocain mur.* 1·00,
Aqu. dest. 10·00.
 MDS. Do pędzlowań, przely-
 ku i krtani.

776. *Morphii mur.* 0·01—0·02,
Aqu. dest. 60·00.
Syrup altheae 15·00.
 MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.

777. *Chinini muriat.* 0·50,
Natr. bicarb.
Sacchari āā. 1·50,
Mfp. div. in dos. 10.
 S. Co 3 godz. proszek.

778. *Trae alcohol. rad. Aconit.*
Trae Bellad. āā. gtt. 10,
Aqu. amygdal. amar. 1·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup aurant. 20·00.
 MDS. 3—4 r. dz. łyżeczkę.

779. *Coccionell pulv.* 1·00,
Kali carbon. 3·00,
Sacchari 10·00,
Aq. dest. 100·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

780. *Antipyrin.* 1·00,
Terpinhydratis 1·00,
Aqu. tiliae
Syrup aurant āā. 50·00.
 MDS. 4—5 r. dz. łyżeczkę.

781. *Extr. Hyosc.* 0·20,
Linctus gummosi 100·00,
Syrup rubid. 20·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

782. *Cocaini mur.* 0·05,
Linct. gumm. 60·00,
Syrup Altheae 30·00.
 MDS. 3—5 łyżek dziennie.

783. *Antipyrin* 0·50—1·00,
Aqu. de Vichy 80·00,
Syrup rubid. 20·00.

DS. Używać zaraz po napa-
 dzie łyżeczkę. — Wyżyć
 w ciągu 24 godzin.

784. *Det. hbae Thymi*
 10·00 ad 200·00,
Ammon. bromat. 2·00,
Syrup Altheae 20·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

785. *Bromoformii* 5·00.
 DS. Dzieciom
 do roku życia 2—3 kropel,
 od 2—4 lat 3—4 „
 do 8 lat 4—5 „
 3 razy dziennie podać w ły-
 żeczce wody.

786. *Tussol (antipyr. amygdalic.)*
 2·0,
Aq. destill. 80·0,
Syr. Senegae 20·0.
 MDS. Dziennie 1—3 łyżeczek.

787. *Acidi benzoici*
Bismut. salicyl. āā. 5·0,
Chinin sulph. 1·0.
 Mfp. DS. 2 r. dziennie wdmu-
 chiwać do nosa.

788. *Acidi borici*
Coff. tost. āā. 5·0.
 Mfp. DS. 2 r. dziennie wdmu-
 chiwać do nosa.

789. *Thymoli* 1·0,
Spir. vini rectific. 250·0,
Aqu. dest. 750·0.
 DS. Do inhalacji.

790. *Creosoti* 0·25,
Sulfonal 0·20,
Syrup tolutani 150·0.
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę
 (przed użyciem wstrząsnąć).

791. *Antispasmini* 1·0,
Aq. amygd. amar. 10·0.
 S. 1—2 r. dz. po 10 kropel.

Pharyngitis.

Leczenie winno poprzedzać
 zbadanie jamy noso-gardłowej,

względnie nawet nosa; przy za-
 jęciu tychże równoczesne lecze-
 nie. W przypadkach postaci za-
 nikowej, suchej, leczenie prawie
 bezsilne; nieraz sprawia się
 ulgę chorym przy pędzlowa-
 niach cum

792. *Jodi puri* 0·25,
Kali jodati 1·0,
Glycerini 20·0.
 DS. Zewnętrznie.

Pharyngitis hypertr. gra- nulosa lub lateralis.

Kauteryzowanie miejscowe la-
 pisem w substancji lub pędzlo-
 wanie całego gardła rozcżynami
 lapisu 10 i 20%, lub taniny np.

793. *Acidi tannici* 2·0,
Spir. vini rectific. 20·0.
 DS. Zewnętrznie.

794. *Sozodoli* 2·50,
Aqu. dest. 50·0.
 S. Do pędzlowania.

Niemniej można chorym za-
 pisywać zimne rozpylania z roz-
 czynów 1—2% Natri bicarb.,
 Kali carbon., Natri chlor., Amo-
 nii chlor., dalej płukania z tych
 środków lub z taniny np.

795. *Acidi tannici* 5·0,
Spir. vini rectific. 50·0,
Aqu. dest. 500·0.
 (Morphii mur. 0·10—0·20).
 DS. Do płukania gardła.

Phthisis pulmonum zob. Tu- berculosis p.

Pityriasis versicolor.

Zmycie 2—3-razowe powierz-
 chni ciała zajętej mydłem sza-
 rem, naphtolowem. Pozostawia-
 jąc zaschlą pianę mydła przez
 2—3 dni, polecić następnie ciepłą
 kąpiel z dokładnem zmyciem
 jakimkolwiek mydłem.

796. *Trae Veratri viridis* 50·00.
S. Do pędzlowania na noc.

Następnego dnia kąpiel letnia i zmydlenie powierzchni ciała.

Pleuritis.

Chory ma leżeć w łóżku, pożywienie płynne, zwłaszcza jeżeli jest gorączka. Suche bańki na okolicę zajęta zapaleniem opłucnej, jeżeli bardzo silny ból, to nawet 4—6 pijawek lub wstrzyknięcie morfiny. Po tem okład lodowy, lub wysychający. W razie męczącego kaszlu morfiny. Jeżeli się wypocina nie wytwarza, to pozostać przy tem leczeniu, co najwyżej pędzlowanie przez kilka dni cum Tra jodi i nie pozwalać choremu wychodzić dopóki tarcie istnieje i stan podgorączkowy się utrzymuje. Zresztą trzeba leczyć chorobę zasadniczą, najczęściej nacieki szczytowe. Jeżeli zaś nagromadza się wypocina, to obok okładów wysychających można zalecić smarowanie raz na dzień jodyną lub przyszczydło, wewnętrznie Natrium salicylicum 3—4 gr. dziennie. W okresie, kiedy już wypociny nie przybywa, pędzlowanie jodyną, kaptasmy ciepłe, wewnętrznie Kalium jodatum, diuretica, jak: Inf. digitalis, Theobrom. natro salicyl. po 4—5 grm. dziennie, Coffeinum natro - salic. 1—1·5 dziennie, Calomel, Adonis vernalis 6·0 na 200·0, Tra stroph., Kali nitricum itp. Nadto można próbować środków przeczyszczających, jeżeli nie ma przeciwwskazania.

Tam, gdzie wypocina ropna, należy zrobić resekcyję żebra i ropę wypuścić, jeżeli zaś chory się nie zgadza, to przynajmniej punkcyję i aspiracyję płynu przyrządem Potaina lub Dieulafoi. Punkcyja nadto jest wskazana,

jeżeli znaczna bardzo duszność grozi życiu chorego.

Po przebyciu zapalenia opłucnej, wyjazd na świeże powietrze, w góry do Zakopanego, Davos, Gleichenbergu, odżywianie forsowne, gimnastyka odpowiednia i leczenie w gabinetach pneumatycznych.

Zresztą leczyć należy chorobę główną, która dała powód do zapalenia opłucnej, a tą jest najczęściej gruźlica płuc.

797. *Dect. cort. chinac*
e 10·0 ad 150·0,
Natri salicyl. 3·0,
Syrup. aurant. 20·0.

MCS. Co 2 godz. łyżkę.

798. *Chloroformii* 10·0,
Ol. Hyosc.
Ol. olivar. āā. 20·0.

S. Do nacierania.

Przy pozostałym exsudacie:

799. *Decoct adonidis*
e 15·0 ad 200·0,
Oxymel Scillae 20·0.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

800. *Natr. chlorat.* 5·0,
Lithii chlorat. 1·0,
Aqu. petroselin. 130·0,
Syrup. menth. 20·0.

S. Co 2 godz. łyżkę.

801. *Perlae med. cum Creosot.*
carb. 0·20
fabric. „Hygea“ Zahradnik.
S. 4—10 per. dziennie.

802. *Kali hydrojod.* 2·0,
Jodi puri 0·50,
Ung. digitalis 20·0.
Mfung. S. Maść.

803. *Jodoform* 2·0,
Unguenti simpl. 50,
Ol. Bergamott. gtts. III.
S. Do wcierania w kl. p.

Pneumonia.

Leków swoistych przeciw pneumonii nie posiadamy. Leczenie

więc przeważnie objawowe. Chory powinien leżeć w dużym pokoju o jednostajnej temperaturze, dyeta tylko płynna: bulion, rosół, mleko, winna polewka, wino, rosół z jajem, do picia jakiś kwaszek lub lemoniada.

W pierwszym okresie zapalenia płuc można postawić suche bańki, zwłaszcza, jeżeli jest kłócie w piersiach, przy bardzo silnem kłóciu nawet 2—3 pijałek lub cięte bańki i okład lodowy lub wstrzyknięcie morfiny. Przy silniejszym kaszlu, męczącym chorego, nieznaczne dawki narkotyków. Jeżeli gorączka bardzo wysoka lub trwa długo, należy przeciwdziałać przez zmywanie ciała letnią wodą lub półną pół wodą z octem, podawać środki przeciwgorączkowe jak: antipyrinę 1·00—2·00 lub fenacetinę, ale lepiej z dodatkiem kofeiny 0·15—0·20 na dawkę, lub też obok tych przetworów dać jeszcze cognac lub mocne wino. Przy słabem tętnie, takież akcyi serca, podać digitalis, strophantus lub sparteinę.

W objawach zapadu, podać kamforę 0·1 w kieliszku wina lub podskórnio strzykawkę ol. camphorat.; wreszcie, podskórnio eter.

- 804.** *Infus Valerianae*
e 5·00 ad 200·00,
Aether sulf. 2·00,
Syr. aurant. 20·00.
S. Co godzinę łyżkę.

Chorem, przyzwyczajonym do nadużywania wyskoku, należy nie szczędzić wina, cognacu, ażeby nie wybuchło delirium.

- 805.** *Cognaci optimi*
Aq. melissae aa. 60·00,
Syr. cort. aur. 40·00,
Vitel. ovi N. duo.
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

W razie delirium: opium, morfina lub chloralhydrat (2—3 grm.).

- 806.** *Chloral. hydr.* 4·0,
Aq. dest. 25·0,
Syr. cortic. aurant. 20·0.
S. Na raz użyć.

- 807.** *Tinct. Capsici annui* 5·0,
Aq. dest. 180·0,
Syr. simpl. 20·0.
S. Co 2—3 godz. łyżkę.

W okresie rozdzielania się nacieku: środki wykrztuśne, rozdzielające jak: woda giesshübel-ska, selterska, józefinka szczawnicka.

- 808.** *Infus Ipecac.*
e 0·30 ad 180·00,
Aqu. lauroc. 2·00,
Syr. Altheae 20·00.
DS. Co 2 godziny łyżkę.

- 809.** *Infus Senegae*
e 10·00 ad 200·00,
Natri benzoici 2—3·00,
Liquor ammon. anis. 2·00,
Syrup simpl. 20·00.
S. Co 2 godziny łyżkę.

Pulv. Doveri 0·25, 2 lub 3 dawki, Stib. sulphur. aurant. 0·01—0·02 na dawkę, 2—3 razy na dzień itp. W razie trudnego rozdzielania się nacieku: okłady wysychające, okłady ciepłe, kataplazmy, dyeta pożywna, wino, cognac.

Podagra zob. Arthritis.

Pollutiones.

Uwzględnić: Phimosi, Balanitis, Urethritis, Obstipatio, Helminthiasis, Onanie, Anaemię. Dobre odżywianie, unikanie wybrków in Baccho et Venere. Pościel niezbyt mięka i lekkie przykrycie. Kąpiele nasiadowe letnie na 20—25°. Elektroterapia. Hydroterapia. Kąpiele rzeczne. Pobyt na świeżem powietrzu, wcześnie wieczorze, unikać spania na wznak.

810 *Camph. monobr.* 2'00,
Extr. secal. corn. 5'00,
Lupulin. 3'00.
Pulv. et liq. q. s. ut f. pill.
 N. 50.

S. 4—5 pigulek na dzień.

811. *Kali bromat.* 10'0,
div. in dos. Nr. X.
 S. 3 proszki dziennie,

Processus puerperalis, Febris puerperalis.

Zapobiegać przeniesieniu zakażenia z osób chorych na zdrowe. Ścisłe aseptyczne postępowanie podczas porodu, t.j. utrzymanie w stanie aseptycznym rąk, narzędzi, bielizny, czyli wszystkiego, co wchodzi w zetknięcie z rodzącą, unikanie niepotrzebnego częstego badania rodzącej.

Gdy występuje po porodzie gorączka lekka do 38° C. a tętno spokojne, odchody rozłożone: przestrzykiwanie pochwy 1—2 razy dnia rozcżynami: kwasu karbolowego, kwasu borowego, kreoliny, tymolu. Posypianie owrzożeń w przedstonku i na międzykroczu jodoformową, opatrzenie gazą jodoformową. Antipyretica zaciemniają obraz chorobowy i nie przynoszą korzyści.

Gdy ciepłota i tętno się podnosi po użyciu postępowaniu: przestrzykiwanie jamy macicy środkami przeciwniepalnymi (*Acid. boricum* 3%, *Acid. carbol.* 2—5% i t. d. za pomocą cewników Bozemann'a, Fritsch'a, Olshausena, 2—3 razy dziennie). Gdy po 2 dniach ciepłota nie opada, postępowania tego zaniechać.

Gdy są objawy podrażnienia otrzewny: lód na brzuch, opium per anum.

Środki rozwalniające (*Ol. ricini*, *Calomel*) podawać można, tylko gdy nie ma zadrażnienia otrzewnej.

Po rozwinięciu się gorączki połogowej, postępowanie Rungego: mocne wina 1—2 butelek dziennie, cognac. Gdy skłonność do wymiotów, wino szampańskie z lodu.

812. *Cocaini muriat.* 0'10,
Aqu. dest. 100'0.
 DS. Co pół godz. łyżeczkę.

Gdy wstręt do wina, to cognac, rum.

813. *Spir. vini Cognac. optimi*
Aqu. dest. aa. 60'0,
Vitelli ovi unius,
Syr. simpl. 20'0.
 DS. Co pół godz. 1—2 łyżek.

Mleko, herbata, czarna kawa, silne rosoly, Biefta; do napoju: woda z dodatkiem białka kurzego, jednego jaja na szklankę (przecedzić). Gdy tętno szybkie: *Coffeina interne*. Jeżeli nie ma podrażnienia otrzewny, kąpiele letnie (22—24° R.) 5—10 minut 1—2 razy dziennie. Polecają też wstrzyknąć w udo lub łydkę gram terpentyny oczyszczonej celem wywołania miejscowego ropienia (abscessu). W nowszych czasach stosowano wstrzykiwanie rozczyń sublimatu do żył (0'001 pro dosi i wyżej z rozczyń 1%).

W ostatnich czasach próbowano leczyć gorączkę połogową w rozpaczliwych przypadkach za pomocą wstrzykiwań surowicy Behringa, Rogera, w dawkach od 5—20 cm. sześć. — Wyniki są zachęcające, lecz jeszcze niepewne.

Postępowanie przeciwgorączkowe: Gdy ciepłota dochodzi do 39'5° C., zmywania całego ciała kilka razy dziennie, gdy dochodzi do 40° C. zawijanie w mokre, w letniej wodzie maczane prześcieradła; zawijanie takie można powtórzyć 2—3—4 razy, aż do opadnięcia ciepłoty, 1—2

razy dziennie. Zimny okład na głowę. Uważać na tętno i w razie zapadu środki podniecające.

Prostatitis acuta.

Zaprzestać leczenia miejscowego; polecić pacjentowi łóżko, dietę płynną, antiflogosa, na międzykrocze pijawki, dbać o wolne wypróżnienia; przeciw bólom i trudnemu oddawaniu moczu (spasmus sphincteris externi) narkotyki w czopkach:

S14. *Morphii mur.* 0·10,
Extr. Bellad. 0·30,
Butyri Cacao q. s. f.
supp. ad anum N. X.

Dobre usługi oddaje przyrząd podany przez Fingera (Kühlapparat), przez który (podobnie jak w psychroforze) przepuszcza się wodę o ciepłocie 12—15° przez 20—30 minut codziennie. Jeżeli mimo wszystkich zabiegów leczniczych gruczoł nie zmniejsza się, a nawet wybadać się da chelbotanie — przecięcie z кишки odchodowej, dalsze leczenie jak każdego ropnia.

P. chronica.

Leczyć przedewszystkiem sprawę rzeźączkową czy nieżytową części tylnej cewki, psychrofor, mięśnienie per rectum, wprowadzanie czopków:

S15. *Kali jodati* 0·50,
Jodi puri 0·05,
Extr. Belladon. 0·07,
Butyri Cacao q. s.,
f. supp. ureth N. V.

Prosopalgia patrz Neuralgia trigemini.

Prurigo.

Dzieciom źle odżywionym, żółtowym, podawać porą zimową tran, przetwory jodu, w le-

cie kąpiele jak: Rabka, Iwonicz, Solec.

Leczenie zewnętrzne:

Kąpiele ciepłe z dodatkiem watroby siarczanej lub Solutio Vleminckx stosowane codziennie przez dłuższy czas. Kąpiele poleca codziennie nacieranie maścią naphtolową 3—5%, następnie puder (wieczorem); rano na drugi dzień kąpiel 20—24°.

Polecają nacieranie pędzlem szczecinowym zwłaszcza kończyn.

S16. *Olei jecoris Aselli* 75·00,
Olei olivarum 25·00,
Balsami peruviani
Olei rusci aa. 5·00;

co powtarza się przez 5 dni z rzędu, 2 dni pauza i tylko pudrowanie.

Pruritus ani.

Stosowanie maści:

S17. *Calomelanos* 5·00,
Vaselini 35·00.
S. Maść.

S18. *Mercurii sublimati* 0·03,
Ammon. chlorati 0·12,
Acidi carbolici 4·00,
Glycerini 60·00,
Aquae rosarum 120·00.
S. Zewnętrznie

nacierać tym płynem 2—3 razy dziennie. Skuteczne bywają pędzlowania c. oleo rusci, 5% rozczyntem alkoholowym kwasu karbolowego.

Pruritus universalis.

Uwzględnić w leczeniu przyczynę, jaką bywają: przewlekłe nieżyty żołądka i kiszek, cukrzyca, u kobiet zboczenia w narządzie rodnym. Późny wiek stanowi sam przez się przyczynę tego przykrego cierpienia (pruritus senilis). Polecić kąpiele z dodatkiem sublimatu, watroby

siarczanej, alunu, zimne tusze, zawijania w mokre koce. Przeciwnapadowi śwędzenia zmycie ciała:

S19. *Acidi carbolici* 5'00,
Spir. vin. gall. 100'00.

lub 3% rozczyzn alkoholowy mentolu, następnie puder. Jako maść:

S20. *Mentholi* 2'50,
Balsami peruviani 5'00,
Unguenti Wilsoni
Lanolini āā. 50'00.
S. Maść.

Pruritus vulvae.

Uwzględnić przyczyny: Zapalenie sromu i pochwy, u dziewcząt pasorzyty, wyprysk, masturbację, żylaki, blizny po wrzodach, zaparcie stolca, diabetes. Przyczyną świerzbiączki może być nieprawidłowe uwłosienie sromu (Mars) mianowicie zwrócenie włosów na wewnątrz przedśionka (entropium labiorum). — Unikać drapania, kąpiele nasiadowe na 24—26° R., okłady z kwasu karbolowego 2%, okłady sublimatowe 1/2 0/100. Wyciąć lub wygolić nieprawidłowo rosnące włosy. — można też użyć maści

S21. *Mentol* 3'0,
Ol. olivar. 1'0,
Lanolini 6'0.

Mfung. S. Do smarowania.
Lub zwilżyć rozczyznem

S22. *Hydrarg. bichlorat* 2'0,
Alcohol 10'0,
Aq. rosarum 40'0
Aq. destill. 150'0.
S. Zewnętrznie.

S23. *Natri subsulphur.* 30'00;
Acidi carbol. 5'00,
Glycerini 2'00,
Aqu. dest. 500'00.
MDS. Do obm. (płyn letni).

S24. *Ac. carb. crist.* 5'00—10'00,
Ol. olivar. 100'00.

DS. Do smarowania.

S25. *Chloroform* 5'00,
Ol. olivar. 50'00.
MDS. Do pędzlowania.

S26. *Cocaini muriat.* 1'00,
Lanolini 5'00,
Vasellini 15'00.

Mfung. S. do smarowania.

Psoriasis.

Wewnętrznie:

S27. *Solutio Fowleri*
Trae malatis ferri āā. 10'00.

rozpoczynając od 12 kropel na dzień; co 3—4 dni bierze chory o 2 krople więcej. W ten sposób zwiększając stopniowo dawkę, dojść można do 40 kropel na dzień, którego ilość używa pacjent przez dłuższy czas, aż zmiany chorobowe zaczynają ustępować. Zmniejszając w podobny sposób dawki o 2 krople co 3—4 dni dochodzi się znów do pierwotnej ilości.

Podobnie postępuje pacjent przy używaniu piłulek asiaticae, rozpoczynając od 2—3 pigulek na dzień, dochodzi stopniowo do 12—15 i znów używając tej ilości przez dłuższy czas, stopniowo zmniejsza dawkę, by dojść do 2—4 pigulek na dzień.

Haslund a za nim wielu innych poleca jodek potasu w wielkich dawkach, zaczynając od 3'00—5'00 pro die co 2—3 dni zwiększa dawkę, dochodząc stopniowo do 15'00—20'00 pro die. W 4—6 tygodniu przy tem leczeniu zaczynają zmiany na skórze ustępować. Lekkie objawy zatrucia nie są zdaniem autora przeciwwskazaniem do dalszego podawania leku.

Leczenie zewnętrzne ma za zadanie:

- 1) usunięciu łusek.
- 2) „ nacieku.
- 3) „ przekrwienia.

Celem usunięcia łusek, polecamy ciepłe kąpiele i zmywanie się w nich mydłem szarem lub salicylowem. Na pojedyncze części ciała jak łokcie, kolana można stosować okłady Priessnitza. Kąpiele można zastąpić przez tłuszcze jak: vaselina, smalec, tran zawijając pojedyncze części opaskami flanelowymi po poprzednim nasmarowaniu jedynym z wymienionych tłuszczów.

Celem usunięcia nacieku wcierania (robione codziennie) za pomocą pędzla szczecinowego.

828. *Acidi pyrogal.* 10'00,

Vasellini 100'00.

S. Maść.

829. *Chrysarobini* 5'0)—10'00,

Vasellini 100'00.

S. Maść.

Jeżeli zmiany chorobowe na skórze są nieliczne, rozsiane, nadaje się dobrze smarowanie ognisk chorobowych przez 10—14 dni rozczyne

830. *Chrysarobini* 5'00,

Traumaticini 50'00.

S. Zewnętrznie.

Przy zastarzałej psoriasis zmodyfikowana sol. Vlemmingkx:

831. *Calcii oxydat.* 5'0,

Sulf. sublim. 100'0,

Aq. destill. 1000'0.

Coque ad remanent 600.

DS. Pocierać poszczególne miejsca, po czym kąpiel ciepła.

Także maść Wilkinsona stosowana według Hebry.

832. *Sulf. citrin.*

Ol. fagi āā. 50'0,

Sapon virid.

Azung. porci āā. 100'0,

Pulv. cretae alb. 10'0.

DS. Przez 6 dni pędzłem 2 razy dnia nacierać, 10 dnia kąpiel.

Kaposi poleca zwłaszcza na zmiany na głowie 5—10% maść naphtholową.

W razie powstającej dermatitis, po użyciu któregośkolwiek z powyższych środków, zaniechać dalszego używania, ograniczyć się do pudrowania skóry.

Przeciwno zmianom na czaszce

833. *Praecip. albi* 2'00,

Unguenti emoll. 20'00.

S. Maść.

którą maść wciera pacjent codziennie, po poprzednim usunięciu łusek za pomocą zmywań głowy mydłem szarem.

W okresie wybuchu ostrego łuszczycy, nie używać środków drażniących silnie skórę (chrysarobin, oleum rusci i t. d.), bo łatwo powstają wypryski i zapalenia powierzchowne skóry; ograniczyć się do polecenia kąpiei ciepłych.

Pyelitis.

Jeżeli jest okres ostry zapalny: chory ma leżeć w łóżku, suche bańki w okolicę nerek, dyeta tylko płynna, przeważnie mleczna, najlepiej mleko pół na pół z wodą wapienną, picie wody: Bilińska, Giesshübler, Fachingen, Preblau, Ems, Gleichenberg, Szczawnica, Truskawiec, Wyśowa, wystrzegać się kawy, herbaty, korzennych zapraw i napitków wyskokowych.

Przy cierpieniu przewlekłym dyeta mniej ścisła, z unikaniem jednak wszelkich napojów wyskokowych i korzeni.

Ze środków wewnętrznych można polecić odwar: *Fol. Uvae ursi* 15'0 na 300'0 z tego co godzina łyżkę, lub filiżankami pić. Lub *Arbutiny* 2—3 grm. pro die w proszkach (środek drogi, mało skuteczny).

834. *Ol. ligni santali* 3 razy po 10—15 kropel w kawie lub mleku. *Kali chloric.* 4—6·0 na 200·0 z tego co godzinę łyżkę.

Dobrze też działa Tannina z opium:

835. *Tannini* 0·30,
Opil 0·02,
Mfp. d. tal. dos. N. X.
3—5 proszki dziennie.

836. *Arbutini* 3·00,
Aq. dest. 150·00,
Syr. simpl. 15·00.
DS/ Co 2 godz. łyżkę.

837. *Lupulini* 1·0,
Sacch. albi 5·0,
Mfp. div. in dos. N. X.
S. 3 proszki dziennie.

838. *Saloli* 0·50,
Dtal. dos. N. XII.
S. 3—4 proszki dziennie.

839. *Natr. salicyl.* po 0·50,
S. 3—4 razy na dzień,

Polecić też można do picia wodę sodową kwaśną (Rząca i Chmurski), kąpiele nasiadowe ciepłe, okłady wysychające, w razie bólów na wewnątrz lub podskórnie morfinę. Zresztą trzeba leczyć główną przyczynę choroby.

Rachitis.

Najwięcej skuteczne pielegnowanie i żywienie. Dzieci z krzywicą powinny być jak najwięcej na powietrzu w ubraniu lekkim, zamiast pierza materace z włosa, przy Craniotabes: poduszczyka z włusiu z wyciętym otworem na główkę. Przy skrzywieniach kręgosłupa i załamaniu kończyn, nie pozwalać dzieciom bez podpory siedzieć, a próby ze staniem i chodzeniem bardzo ostrożnie zaczynać. W razie obfitych

potów zmywać ciało kilka razy gąbką zamoczaną w zimnej wodzie i dobrze wycisnąć, a zwłaszcza tyłogłowie.

Młodszym dzieciom nie podawać pokarmów mącznych.

Drugim ważnym czynnikiem są kąpiele, jeżeli nieżyt oskrzeli nie przeszkadza.

Daje się je w połączeniu ze słodem ($\frac{1}{2}$ litra) i solą ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ do 1 funta na 20 litrów) z dodatkiem ziół aromatycznych, w razie niedokrewności sole żelaziste, kąpiele (26° R.) z soli borowinowej (Mattoniego), na tydzień 2—3 razy, nigdy na noc.

Nieżyt oskrzeli leczyć naparem *Ipecac*, *Senegae*, *Liquor Ammoniae anis*.

Kurczowi głosi energicznie zapobiegać, (zob. *Laryngospasmus*). Skrzywienia kończyn wymagają leczenia gimnastycznego, ortopedycznego, szyn, gósetów itp.

840. *Aqu. pyrophosphatis ferri et sodae.*

S. 3 razy dziennie łyżeczkę, dalej:

841. *Trae ferri chlorati*
5—10·00.

S. 3 razy dziennie po 5 kropel we wodzie.

842. *Ferri pyrophosphor.* 0·05—0·10,

Sacchari lactis 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 15.
S. 2 proszki dziennie.

843. *Calcii phosphor. pulv.*
30·00.

Parę razy dziennie na koniec noża do pokarmów.

844. *Calcar. phosphor.* 30·00,
Ferri lactici 2·00,
Sacch. lactis 30·00.

Mfp. S. 3 razy dz. na koniec noża.

845. Bismut subnitrici*Carbonat calcar. āā. 1:50,**Mfp. div. in dos. N. 10.*

S. Co 4 godz. proszek (w razie uporeczywego nieżyty przewodu pokarmowego).

846. Ol. jecor. aselli 2:00—4:00,*Mucilag. gum. arab.**Aqu. dest. q. s. f. l. a.**Mixt. oleosa col. 80:00,**Syrup simpl. 10:00.*

DS. 3 razy dz. łyżkę.

847. Ol. jecor. Aselli 150:00,*Limaturae ferri 20:00,**stent in macerat. per 24 horas, deinde decant.*

DS. Rano łyżeczkę.

848. Phosphori 0:01,*Ol. amygdal. dulc. 30:00,**Gum. arab.**Sacchari āā. 15:00,**Aqu. dest. 40:00.**D. in vitro caeruleo.*

DS. Jedną łyżeczkę na dzień.

849. Phosphori 0:01,*Ol. jecor Aselli 100:00.*

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

850. Phosphori 0:01,*Liparin 30:00,**Pulv. gi. ar.**Sacchar. āā. 15:00,**Aqu. dest. 40:00.*

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

851. Phosphori 0:06,*Alcohol. 20:00,**Spir. menth. 0:50,**Glycerin. 60:00.*

DS. 3 razy dziennie po 6 kropel. — (Co tydzień o kroplę więcej aż do 10).

Także Thyraden w pastylkach.

Dzieciom z nieżytem kiszek stanowczo fosforu nie podawać.

Rheumatismus articularum.**1. Acutus.**

Chory bezwarunkowo ma tak długo pozostać w łóżku, dopóki

gorączka nie minie, obrzęki się nie zmniejszą i bóle nie ustąpią.

Ze środków najprędzej działających polecają: Antipyrinę, z Natr. salicylicum po 0:50, dziennie takich proszków 4—6. Jeżeli obawiamy się zapadu po silnych dawkach antipyriny, to lepiej dodać do każdego proszka 0:15 Coffeiny natrosalicyl. ci.

Dalej stosować można samo Natr. salicyl. 5:0—6:0 pro die, Acid. salicyl. 4:0—5:0 pro die, Phenacetin po 0:50, 4—5 proszk. dziennie — Antifebrin od 0:25—0:50, 3—4 proszki na dzień, Betol 0:3—0:5, 3 razy na dzień.

852. Salipyrin 0:50.

Kilka razy dziennie proszek.

853. Asaproli 4:00,*Aq. foenicul.**Syr. simpl. āā. 30:00.*

DS. Co 2—3 godz. łyżeczkę.

854. Salopheni 1:00,*Dt. tal. dos. X.*

S. 3—4 pr. dziennie.

Euphorin po 0:40.

Kilka razy dziennie.

*Phenocollum hydrochl. 1—**1:50 pro die.**Methacetin 0:20—0:30 pro dosi.*

Kilka razy dziennie.

Nadto okłady lodowe na bolesne stawy, lub ciepłe okłady. Pędzlowanie jodyną i zawijanie w watę. Smarowanie stawów mieszańką chloroformową lub ichtyolem.

Nadto leczenie wszelkich powikłań w odpowiedni sposób, zwłaszcza zapaleń osierdza, opłucnej i t. p.

2. Chronicus.

Obok środków wyżej wymienionych i kali jodatum 2—3:0 pro die, polecić ciepłe kąpiele, kąpiele ze soli borowinowej (Mattoniego) pędzlowanie jodyną,

masaż stawów maścią jodową ruchy bierne lub wysłać chorego do czeskich Cieplic, Trenczyna, Piszczan, Swoszowic, Krzeszowic, Truskawca i t. d.

855. Aconitin 0·75,

Ung. emol.

Vaselini āā. 15·00.

Mf. ung. S. Wcierać w bolesny staw.

856. Jodoformii 3·00,

Extr. Opii aq. 2·00.

Ung. simpl. 30·00.

Mf. ungu. DS. Maść.

857. Ichthyoli 10·00,

Ungu. parafin. 90·00.

Mf. ungu. DS. Maść.

858. Ichthyoli 5·00,

Ungu. emolient. 50·00.

Mf. ungu. S. Wcieranie.

859. Ammon. sulfoichthyol

Spir. aether. āā. 10·00,

Collodii 20·00.

DS. Do pędzlowania stawów.

860. Trae Colchici 10·00,

„ *Aconit. 3·00,*

„ *Opii 2·00.*

DS. 3—4 r. po 15—20 kropel.

861. Exalgin 2·50,

Alcohol menth. 15·00,

Aqu. dest. 190·00,

Syrup simpl. 30·00.

S. Co godzinę łyżkę.

(Jedna łyżka 0·20 Exalg. 0·80 pro die).

862. Diaphtherini 0·50,

Spir. vini

Cognaci

Aq. naphae

Syrup simpl. āā. 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

(Dla dzieci).

863. Natri jodat. 6·00,

Sol. Fowleri 5·00,

Natri bicarb. 15·00,

Kali bicarb. 30·00,

Det. Sarsaparill comp. 600·00.

S. Po obiedzie łyżkę użyć.

Rheumatismus musculorum.

Wewnętrznie można podać mierne dawki Natr. salicylicum. Antipyriny, Phenacetyny a obok tego działać miejscowo przez wcieranie maści kojących, mieszanek chloroformowej. Kąpiele ciepłe, zawiązania w koce, łaźnia parowa, masaż, prąd elektryczny, kąpiele siarczane, Cieplice w Czechach, na Węgrzech, Truskawiec i t. p. miejscowości.

864. Chloroform

Ol. olivar. āā. 10·00,

Tinct. opii simpl. 5·00.

DS. Do wcierań.

865. Chloroformii

Glycerini āā. 50·00.

DS. Wcieranie.

866. Trae Bellad. 1·50.

Bals. vitae Hoffman. 80·00,

Chloroformii 20·00.

DS. Do wcierań.

867. Veratrin 0·30,

Chloroform 15·00,

Mixt. oleos. balsam. 80·00.

DS. Do wcierań.

868. Spir. sapon 30·00,

Trae opii 2·00.

DS. Do wcierań.

Rhinitis.

Catarh. acuta.

Środki napotne, miejscowo pędzlowanie 10% kokainą lub wprowadzanie długich tamponików z waty zanurzonych w roztoczynie kokainy, przyczem nie należy zapomnieć o tem, iż kokaina może się dostać do trąbek Eustachiusza, sprowadzając przemijające przytępienie słuchu.

chron. atrophica.

często połączona z cuchnieniem z nosa i zaleganiem mas zeschłej wydzieliny. Po wykluczeniu

scleroma, lues, cierpień zatok bocznych nosa, należy stosować przestrzykiwania nosa, najlepiej z irygatora, 2—3 razy dziennie, biorąc na każdy raz, litr wody cieplej, dodając do niej łyżeczkę od kawy z proszku:

869. *Magn. carbon.*

Natr. bicarbon. āā. 0·20,

Mentholi 0·05,

Nosopheni

Sacch. lactis āā. 2·50.

Mfp. Tabaka do nosa.

870. *Natri bicarbonici 10·00,*

Natri chlorati 50·00.

S. Łyżeczkę na litr wody do przestrzykiwania.

Można też dodać kwasu salicylowego lub borowego w ilości 5·00. Gdyby zeschnęła wydzielina nie dała się usunąć przestrzykiwaniami, należy ją usuwać szczypekami.

Przy rozpoznaniu lues leczenia teje ogólne obok miejscowego, gdzie na pierwszym miejscu należy postawić nitras argenti w roztynach 20—50⁰/₁₀, względnie sublimat 1⁰/₁₀. Przy scleroma również przepłukiwania nosa, przy ropieniu z zatok bocznych nosa leczenie tegoż.

chron. hypertrophica.

Zbadanie nosa od tyłu, by się o stanie przerostu przekonać. Leczenie miejscowe tuszowaniem z lapisu 5—10⁰/₁₀, wprowadzanie bougies z waty zanurzonych w roztynie 3⁰/₁₀ Na. z każdej strony po dwa, odpowiednio dolnemu i śrędnemu przewodowi nosowemu, usuwanie wybujałości przerostowych w końcu leczenie galwanokauterem.

Scabies.

U dorosłych polecić wetrzeć 3—4 razy (wieczorem) jedną z ni-

żej podanych maści, zwróciwszy uwagę na to, by maść została dokładnie wcięraną, zwłaszcza między palcami, w dłonie, staw nadgarstkowy, łokcie, pachy, pośladki, prącie, okolice stawu kolanowego i stopowego.

871. *Naphtol 10·00,*

Vaselini 100·00.

S. Maść.

872. *Florum sulfuris*

Olei fagi āā. 40·00,

Saponis viridi

Axungiae porci āā. 80·00,

Cretae albae 5·00.

S. Maść.

W praktyce ubogich Solutio Vleminckx (300), którymto płynem chory powinien się natrzeć 2—3 razy.

Zamożnym maść Hebry

873. *Ol. lavandulae,*

Ol. caryophyllor. āā. 1·0,

Kali carbonici 25·00,

Lact. sulf. 75·00,

Axung. porc. q. s. ut f. ung.

S. Maść.

Dzieciom przepisujemy:

874. *Balsami peruviani*

Styracis liquidi āā. 5·00,

Vaselini 50·00.

S. Maść.

875. *Naphtol 5·00,*

Vaselini 75·00.

S. Maść.

U dzieci zwrócić uwagę na to, by obok miejsc powyżej wskazanych równie dokładnie wetrzeć maść w stopki.

Po takim kilkorazowym natarciu bierze chory kąpiel z mydłem, po czem powinien się ubrać w czystą bieliznę, zmienić pościel, części ubrania noszone w ostatnich czasach, poddać należy desinfekeyi.

Scarlatina.

Ścisłe odłączenie chorych, aż do zupełnego złuszczenia t. j. 5—6 tygodni, poczem należy mieszkanie odwietrzyć, okna, podłogi wymyć 5% kw. karbowym. Dzieci szkolne w mieszkaniu będące, do szkoły nie poyślac.

Pokój troskliwie przewietrzać, ciepłota 13—14° R. wystarcza, bieliznę można często zmieniać.

Za pożywienie: mleko, rosół, po ustąpieniu gorączki dyeta pożywniejsza, lecz nie zaraz mięsna. Za napój podawać można czystą wodę, kwaski.

Płukanie gardła częste 2% kw. borowym, 2% kali chloricum. W razie silnej gorączki, zimne okłady na głowę, chinina, antypyrina (ostrożnie), Natr. salicyl.

Na obrzęki gruczołów okłady z liquor alumini acet., wcierania szarej maści. Skoro tylko wystąpi chęłbotanie, przecinać.

W razie znacznego świadu:

876. *Lanolin anhydric.* 50·00,
Vaselin. americ. 20·00,
Aqu. dest. 25·00.
M. terendo f. ung.

S. Do nacierań.

Drgawki, majaczenia uspakać okładami z lodu; lewatywami z chloralu (0·50:50·0).

W razie zapadu, osłabienia serca, Cognac, mocne wiina, czarna kawa, kamfora.

Zmiany na błonie śluzowej gardła (dyfterya) leczyć płukaniami, pędzlowaniami. Zastrzykiwania surowicy przeciwbłoniczej w przypadkach tych nie odnoszą żadnego wyniku. W razie objawów ogólnego zakażenia polecają zastrzykiwanie surowicy przeciwpaciorkowcowej (Antistreptococcen serum Marmorka) O skuteczności tych zastrzyki-

wań nie ma dotychczas pewnych danych.

Powikłania, z wysiękiem opłucnej, błony brzusznej, zapaleniem stawów, chorobami ucha, rakiem wodnym, zapaleniem nerek — zob. odpowiednie rozdziały.

877. *Chinini muriat.* 0·30,
Dtur. tal. dos. 10.

S. Rano i wiecz. proszek.

878. *Antipyrin* 0·25,
Dtur. tal. dos. N. X.

S. Co 4 godz. proszek.

879. *Natr. salicyl.* 0·30.
Dtur. tal. dos. N. X.

S. Co 3 godz. proszek.

880. *Natr. salicyl.* 3·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

881. *Liquor Ammon. anis.*
Aether. sulphur. āā. 5·00.

MDS. Co 2 godz. po 10 kropel w czarnej kawie.

882. *Camphorae* 0·50,
Spir. vini

Aqu. dest. āā. 5·00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań.

883. *Acidi benzoici* 0·20,
Sacchari 2·00,

Mfp. div. in dos. N. X.

S. Co 2 godz. proszek.

Od początku płonicy należy moczyć codziennie badać. Od pierwszej chwili zapalenia nerek podawać dużo mleka.

Po stwierdzeniu białkomoczu postawić 5—10 suchych baniek. Dopóki w osadzie z moczu znajduje się wiele ciałek krwi i wałeczków, nie podawać leków moczopędnych lecz ściągające.

884. *Chinini tannici* 4·00,
Div. in dos. N. X.

S. 3 razy dziennie proszek.

885. *Acidi tannici* 0·50,
Chinin. sulphur. 1·00,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. 6.
 S. 3 proszki dziennie.

886. *Solut. acid. tannici*
 2·00 ad 100·00,
Solut. natri bicarb. q. s. ad
react. alcal.
Syrup rubid. 20·00.
 MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

W razie silnego krwawienia:

887. *Liquor ferri sesquichl.*
gtts. X.

Aq. cinnamom.
Syrup simpl. aa. 50·00.

S. Co godz. łyżeczkę.

888. *Ferropyrini* 1·00,
Aq. destill. 100·00.
 S. Co 3 godz. łyżeczkę.

Jeżeli się pojawia znaczna puchlina, lub ucisk na płuca, podawać wcześniej leki moczopędne a przy towarzyszącej anemii żelazo n. p. *Tra ferri* po maty, 3 r. dzien. po 15 kropel.

889. *Infus. fol. digital.*
 e 0·20 ad 100·00,
Liquor Kali acet. gtts. XX.
Syrup simpl. 15·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

890. *Diuretini* 2·00,
Aq. destill. fervid. 100·00.
 S. Co godz. łyżeczkę.

891. *Dcti equiset. e* 3·00 ad
 100·00,
Liquor Kali acet. gtts. XX.
Syrup simpl. 15·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Można też używać w razie dłużej trwającej puchliny, kąpieli na 29° R., 5—10 minut i zawiązania w koce na 2—3 godziny; przeciwwskazanie stanowi tylko stan zapalny płuc lub osłabienie serca, w kąpieli dawać zimne okłady na głowę.

Scorbutus.

Dobre powietrze i dobre pożywienie, podawać dużo zielonej jarzyny (sałata, szpinak itp.) owoce, lemoniada z cytryn. Mleko w dużych ilościach. Wino, piwo. Letnie kąpiele. Płukanie ust roztworami lekko ściągającymi (kali chloricum, acidum boricum). Pędzlowanie: *Tra. Myrrhae*, *Tra. ratanh.* Nacieki krwawe smarować oliwą z chloroformem. W ciężkich przypadkach leki pobudzające, kamfora, eter, wino często podawać.

892. *Dct. cort. chinae e* 10·00
 ad 150·00.

Acidi sulfur. dil. 2·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. Co godz. łyżkę.

893. *Kali citrici* 4·00,
Aq. destill. 180·00,
Syr. rub. idaei 20·00.
 S. Co 2 godz. łyżkę.

894. *Ergotini pur.* 2·00,
Aqu. dest. 150·00,
Aqu. laurocer. 5·00,
Syr. Moror. 20·00.
 DS. Co 2 godz. łyżkę.

895. *Liquor ferri sesquichl.* 2·00,
Aqu. cinamom. 200·00,
Syrup Sacchari 20·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Leczenie następowe wymaga dłuższego podawania: żelaza, przetworów chinowych, dobrego żywienia i kąpieli.

896. *Trae chin. comp.* 40·00,
Trae aurant. 10·00.
 S. 4 razy dnia łyżkę.

Scrophulosis.

Przestrzegać odpowiedniego żywienia u dzieci mniejszych, starsze dzieci żywić mięsem, mlekiem, kawą żołądźkową, dać nieco wina czerwonego, owoce, jarzyny lżejsze. Suche mieszka-

nie przewietrzane. Kąpiele, zmywania wodą są koniecznymi.

Dzieci blade, chude, mogą używać więcej tłuszczów, podać tran. Lepiej odżywionym tran z dodatkiem Trae. jodi. Zaprzestać jednak tranu przy braku apetytu, biegunce, gorączce. Tran dawać w godzinę po jedzeniu $\frac{1}{2}$ —1 łyżki, małym dzieciom w emulsyi, po 3 tygodniach przestawać na kilka dni.

Jeżeli dzieci nie znoszą tranu lub są przeciwwskazania, podawać przetwory jodu z żelazem, herbatę z liści orzecha, ekstrakt słodowy (1—2 łyżeczek 2 razy dziennie).

W lecie pobyt na świeżem powietrzu, wody mineralne jodobromowe lub słone — (Iwonicz, Rabka, Rymanów) tak do kąpieli, jak i do picia.

Kąpiele ze soli z dodatkiem soli iwonickiej, rabezańskiej, rymanowskiej, soli borowinowej Mattoniego (po $\frac{1}{2}$ —1—2 funtów), kąpiel na 27° R. przez 15—20 minut.

W obrzmiałe gruczoły wetrzeć na wieczór łyżeczkę mydła szarego (Sapo kalin) i zmyć rano i tak przez szereg dni dopóki nie będzie większej bolesności.

Choroby towarzyszące jak: Conjunctivitis, Keratitis, Otitis, i t. p. obok ogólnego leczenia leczyć miejscowo (zob. pod odpowiedniami rozdziałami).

997. *Ol. jecor. Aselli* 10'00,
Mucil. gum. ar. q. s.
Aqu. dest. 60'00,
Syrup Melissae 10'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

998. *Syrup ferri jodati* 20'00,
Syrup sacchari 40'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

999. *Kali arsenicos solut.*

Aqu. cinamom. āā. 10'00.

MDS. 3 razy dziennie po 3—6 kropli.

900. *Ferri jodati sacchar.* 0'50,
Sacchari 5'00,
Mfp. div. in dos. N. XX
S. 3 proszki dziennie.

901. *Trae jodi gtts.* X.

Kali jodati 1'00,

Aq. menth. pip.

Glycerin. āā. 50'00.

MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

902. *Ol. jecor. Aselli*

Aq. Calcar. āā. 100'00,

Mf. linim. adde

Trae chinae comp. 20'00,

„ *Rhei vin.* 15'00,

„ *Calami* 5'00.

MDS. 2—3 razy dziennie łyżeczkę do 1 łyżki.

Prof. Sommerbrodt radzi dawać wytrwale kreozot od paru kropli dziennie do 1 grama w winie lub kapsułkach, zaraz po jedzeniu.

903. *Kreosoti* 1'00,

Ol. jecor. Aselli 150'00.

DS. łyżeczkę na godzinę przed jedzeniem.

904. *Kreosoti* 1'00,

Tinct. gentian 2'00,

Spiritus 25'00,

Vini Xerens. q. s. ad 100'00.

DS. 2—3 łyżeczek dziennie do $\frac{1}{2}$ szklanki wody.

905. *Kreosoti carbonici* 25'0.

S. Dwa razy dnia 5—10—20 kropel.

906. *Capsulae tenent.*

Kreosot. carbonic. 0'10—0'20
fabric. Hygea (Zahradnik).

S. 2 razy dnia 1—3 kapsulek.

907. *Capsul. tenent.*

Kreosoti carbon. 0'10,

Ol. jecor. Aselli 2'00

fabric. Hygea.

S. Jak wyżej.

Sclerosis initialis zob. Syphilis.

Soor.

Czyste utrzymywanie ust, prze-
mywać po pokarmach, dobre po-
kojowe powietrze.

Po usunięciu mechanicznem
grzybków (miękkim płótnem
zwilżonem w zimnej wodzie)
pędzlować:

908. *Kali hypermang.* 0·12,
Aqu. dest. 15·00.

MDS. Do pędzlowania.

909. *Saccharini* 1·00,
Spir. vini 50·00.

DS. Łyzeczkę rozpuścić w $\frac{1}{2}$
szklanki wody i 5 r. dzien-
nie pędzlować.

910. *Resorcin.* 0·50,
Aqu. dest. 90·00,
Syrup 10·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.
(Dla dziecka od 1—2 lat).

Do przemywania ust: Borax
(1·50:100·0 *Aq. destil.*) kali chlo-
ricum, Bicarb. sodae (0·50:150·0).

**Spasmus glottidis zob. La-
ryngospasmus.****Stenocardia.**

Leczenie samego napadu po-
lega na wygodnem ułożeniu cho-
rego w jasnym niedusznym po-
koju, usunięciu uciskającego u-
brania, podaniu choremu trochę
czarnej kawy, łyżkę wina lub
cognacu.

Podskórnie wstrzyknąć morfi-
nę lub dać do wziewania trochę
chloroformu.

Na okolicę serca synapizma,
okład gorący, rozcierać kończy-
ny, dać lewatywę z soli. Można
też dać do wziewania kilka krop-
pel Amylnitritu, Pyridiny lub
Aethyljodür (według Seé).

Polecają też wewnętrznie
wśród napadu: Nitroglicerynę
w roztworze 0·01 na 10·0 z tego

10—20 kropli na raz, lub pastylki
nitroglicerynowe po 0·001.

Następnie leczyć chorobę przy-
czynową, najczęściej więc: wady
sercowe, choroby nerwowe i za-
trucia przewlekłe tytoniem, ka-
wą i herbata.

911. *Natri brom.* 5·00,
Aqu. dest. 150·00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

912. *Tinct. Lob. infl.*
— *Valer. aeth. aa.* 10·00.

DS. 10—20 kropel podczas na-
padu.

913. *Natr. nitrosi* 0·5,
Sacch. albi 3·00.

*Mfp. Div. in dos. X. in cap-
sul. amylaceis.*

S. 1—2 proszki dziennie.

914. *Amyl. nitros.* 5·0,
Ol. Foeniculi 10·0.

S. 3—6 kropel przed napadem

915. *Tinct. Valerianae* 5·0,
Tinct. Castorei 1·0.

S. Co kwadrans 10 kropel.

916. *Oxydi Zinci* 0·50,
Sacch. albi 2·0,

Mfp. div. in dos. Nr. 5.

S. 3 proszki dziennie.

917. *Flores Zinci* 1·0,
Sacch. albi 3·0,

Mfp. div. in dos. Nr. 10.

S. 3 proszki dziennie.

918. *Exalgin* 2·50,
Alcohol Menth. 15·00,

Aqu. dest. 190·00,

Syrup 30·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

**Stomatitis aphthosa zob.
Aphthae.****Stomatitis catarrhalis.**

Czyste utrzymywanie jamy
ustnej, wymywanie ust chłodną
wodą. Pędzlowanie: 2% kwasem
borowym, 1% roztworem kali
chloric. Dzieciom starszym zi-

mne pokarmy, mleko z lodu. Wyrwać psujące się zęby, które są częstym powodem stomatitis.

919. *Boracis* 5'00,

Mel. rosat. 20'00,

Aq. rosar. 10'00.

MDS. Do pędzlowania.

Stomatitis ulcerosa. Stomacace.

Pędzlowanie pojedynczych owrzodzeń rozczynelem kali hypermang (0'12:25'0) 5—6 razy dzien. lub lepiej nawet przestrzykiwanie jamy ust za pomocą irygatora.

920. *Acid. salicyl.* 5'0,

Aquae dest. 500'0.

S. Woda do płukania ust.

921. *Acidi borici* 1'00,

Kali chlorici 0'75,

Succi citri 15'00,

Glycerini 10'00.

DS. Do pędzlowań.

Wewnętrznie: kali chloricum (1'0—3'0 na 120'0 Aquae, pr. die).

922. *Decoct. cort. Chinae*

e 5'00 *ad* 100'00,

Kali chlorici 2'00,

Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

W razie krwawienia:

923. *Liquor ferri sesquichl.*

Aq. dest. āā. 15'00.

MDS. Do pędzlowań.

Sycosis barbae.

Jeżeli cierpienie ogranicza się do nielicznych króst na małej przestrzeni, nie trzeba golić brody, ograniczając się do epilacyi włosów, w obrębie zajętem chorobą i następowego użycia maści, jak: ung. praecip. albi 1:20'0, ung. diachyli symplicis i t. d.

Przy więcej rozwiniętej chorobie polecić najprzód obstrzydz

krótko brodę (względnie i wasy), następnie rozmiękczyć strupy przez stosowanie ung. Dyachylon, empl. saponato-salicylicum 10'0, a po zmyciu mydłem szarem ogolić.

Skoro się to stało, należy przystąpić do epilacyi, usuwając w ciągu jednego posiedzenia 20—40 włosów (zależnie od wrażliwości pacyenta), po czem, jeżeli jest silny odczyn w postaci obrzęku i zaczerwienienia skóry, polecić robienie zimnych okładów przez 2—3 godziny. Kiedy ten minie, przykładą pacyent maść jak: ung. Diachyl. simplex, ung. praecip. 1:20'0, maści z dodatkiem acid. salicyl., resorcyny. Taki sam cykl powtarza się dnia następnego, a więc: po usunięciu maści z dnia poprzedniego, przez zmycie wodą letnią i mydłem, golenie, epilacya i przyłożenie jednej z powyższych maści. Postępowanie takie prowadzić należy tak długo, dopóki nie upewnimy się, że nie ma już ognisk chorobowo zajętych (torebki włosowe, włosy), co trwa od 6—8 tygodni. Po ukończeniu leczenia, zwrócić uwagę pacyenta, by zarostu nie zapuszczał, ale jeszcze przez dłuższy czas golił.

Syphilis acquisita.

Sclerosis initialis.

Jeżeli warunki anatomiczne na to pozwalają (napletek, skóra prącia), a od chwili pojawienia się podejrzanego zmiany nie upłynęło więcej jak 2—3 dni wycięcie, wykonane w ten sposób, by usunąć ile można tkanki w otoczeniu, założenie szwów. Obserwować pacyenta przez dłuższy czas, by upewnić się, czy nie wystąpią zmiany drugorzędne.

W leczeniu zmiany pierwotnej trzeba:

- 1) wrzód oczyścić, zamienić na czystą ranę;
- 2) oczyszczony doprowadzić do pokrycia przyskórkim;
- 3) naciek pozostały starać się usunąć.

Jeżeli powierzchnia sclerosi initialis pokryta jest wiotkim nalem obumarłej tkanki, polecić przykładanie kilka razy dnia na wacie:

924. *Cupr. sulf.* 1'00,
Aqu. dest. 30'00.

Gdy zmiana pierwotna przedstawia się jako wrzód, posypywanie jodoformem 2 - 3 dziennie. Skoro się wrzód oczyścił zapisujemy:

925. *Empl. hydrarg.*
Empl. sapon. aa. 10'00.
MS. Maść.

926. *Hydr. praecip. rubri* 0'10,
Vaselini 20'00.
S. Maść.

Gdy zmiana pierwotna przedstawia się jako naciek o powierzchni exkoryowanej — polecić przykładanie jednej z powyższych maści. Jeżeli sclerosi initialis przybrała cechę wrzodu fagedenicznego, głęboko ropiącego, rozpad postępuje z dnia na dzień szybko, zachodzi obawa zniszczenia prącia a dotyczy osobnika zdrowego zresztą, leczenie ogólne wcieraniami obok miejscowego. Jeżeli dotyczy to indywiduum źle odżywionego, skrofulicznego, przede wszystkim leczenie wzmacniające. Leczenie ogólne przetworami rtęci w okresie I-rzędnej kiły, jako mające zapobiedz wybuchowi zmian następowych zwolenników nie ma i wskazanem jest tylko wtedy, jeżeli zmiana pierwotna komplikuje się z fimozą, gangreną, fagedenizmem.

Leczenie ogólne przetworami jodu w okresie kiły pierwszorzędnej wskazanem jest u osobników skrofulicznych, u których przychodzi do bardzo znacznego obrzmienia gruczołów chłoniczych.

Jako zasadę przyjęto, że leczenie ogólne rozpoczyna się z wystąpieniem

Syphilis secundaria.

Przygotowanie do leczenia ogólnego *rtęcią*:

- 1) korzenie zepsutych zębów i osad kamienia usunąć;
- 2) już przed rozpoczęciem leczenia polecić pilne czyszczenie zębów np.:

927. *Calcar. carbon.* 50'00,
Kali chlorici 10'00.
S. Proszek do zębów.

- 3) płukanie ust i gardła 3% roztworem kwasu borowego lub chloranu potasowego;
- 4) u palących ograniczyć liczbę cygar i papierosów, zabronić używania większej ilości napojów wysokokowych, pokarmów pieprzonych i słonych;
- 5) zbadać moc.

Leczenie przetworami rtęci wskazanem jest (według Fingera):

- 1) w postaciach kiły II-rzędnej, które uważać należy za ciężkie (suche, łuszczące się wysypki);
- 2) przy zajęciu ważnych narządów (oko, mózg);
- 3) przy częstych nawrotach choroby zwłaszcza, jeżeli poprzednio chory leczony był przeważnie przetworami jodu;
- 4) przy ciężkich postaciach u osobników dobrze odżywionych (wyjątek stanowi lues maligna praecox).

Rtęć wprowadzać można przez:
I. wcierania;

II. wstrzykiwania podskórne lub miażdżowe;

III. przez przewód pokarmowy;

IV. przez kąpiele;

V. nakadzanie.

I. Wcierania.

Przed ich rozpoczęciem polecić kąpiel ciepła, zmycie dokładne skóry mydłem. Najodpowiedniejszą porą jest czas przedpołudniem do robienia wcierań — nigdy wieczór bezpośrednio przed pójściem spać. W pokoju, gdzie pacjent robi wcieranie nie powinno być zimno (16—18° R.), pokój po skończonem wcieraniu przewietrzać.

Dawka jednorazowa dla dorosłych 3—5·0, u osesków i dzieci 0·5—1·0 pr. dosi. Wcieranie powinno się robić przez 20—30 minut zwłaszcza, jeżeli je chory robi sam. Wciera się kolejno:

- 1 dzień obie łydki;
- 2 „ wewnętrzne strony uda;
- 3 „ boki klatki piersiowej i brzucha;
- 4 „ wewnętrzne powierzchnie kończyn górnych;
- 5 „ grzbiet (co odpada, jeżeli pacjent robi sam wcierania).

Takich 5 wcierań stanowi jeden szereg, po którym pacjent bierze kąpiel (parową lub wannę) i rozpoczyna dnia następnego nowy szereg, zaczynając od łydek. Najczęstszem przeciwskazaniem jest wielka wrażliwość skóry (idiosynkrazia), lub rozległe, rozpadające się zmiany skórne tak, że nie ma dosyć przystępnej powierzchni skóry do zrobienia wcierania.

II. Wstrzykiwania podskórne.

a) soli rozpuszczalnych:

928. *Sublimati corros.* 0·10,

Natr. chlor. 1·00,

Aqu. dest. 10·00.

S. Do iniekcji.

929. *Hydr. pepton.* 0·10,

Aqu. dest. 10·00.

S. Do iniekcji.

Z tych rozczyńów robi się codzień wstrzyknięcie (w grzbiet) pełną wstrzykawkę Pravaza; w całości 20—40 iniekcji. Schwimmer poleca:

930. *Hydr. sozod.* 0·80,

Kali jodati 1·60,

Aqu. dest. 10·00.

S. Do iniekcji.

5—6 wstrzyknięć zrobionych co 5—6 dni wystarcza do usunięcia zmian chorobowych.

b) soli nierozpuszczalnych:

931. *Calomel. vapore parati*

Natr. chlor. āā. 2·00,

Aqu. dest. 25·00,

Gummi arabici 1·00.

S. Do iniekcji.

932. *Hydr. oxyd. flāvi* 1·00,

Gummi arab. 0·25,

Aqu. dest. 30·00.

S. Do iniekcji.

933. *Hydr. salic.* 1·00,

Paraff. liqu. 9·00.

lub w tym samym stosunku

Hydr. thymolo-aceticum.

Którykolwiek z powyższych środków wybierzemy, to wstrzykiwania robi się (pełną wstrzykawką Pravaza) co 5—6 dni w pośladki; liczba wstrzyknięć mniej więcej 6—8. Przeciwskazane są wstrzykiwania (zwłaszcza soli nierozpuszczalnych) u osobników źle odżywionych i przy złym stanie zębów.

III. Przetwory podawane na wewnątrz.

934. *Protojodur. Hydr.* 1'00,
Laudani puri 0'25,
Extr. et plv. Acori āā. q. s.
f. pill. N. 50.

S. 2 pigułki dziennie.

935. *Hydr. tan. oxyd.* 5'00,
Laudani puri 0'25,
Extr. et plv. Acori āā. q. s.
f. pill. N. 50.

Obduce Balsamo de Tolu
Consp. pulv. cinnam.

S. 2—4 pigulek na dzień.

936. *Calom. laevi* 2'50,
Opii puri 0'15,
Mucilag. gummi arab.
Pulv. liquir. āā. q. s. f.
pill. N. 50.

S. 2—3 pigułki na dzień.

IV. Kąpiele

mają zastosowanie przeważnie u osesków dotkniętych kiłą wrodzoną. U dorosłych w wypadkach zmian kiłowych, które pociągały za sobą owrzodzenia, zniszczenia tkanek i gdzie możemy spodziewać się, że w ten sposób wessanie rtęci nastąpi. Zapisujemy:

937. *Mercurii sublimati corros.*
 10—30'00,
Aqu. dest. 400'00.

S. Do jednej kąpieli.

Woda powinna mieć 26—28° R., trwać od 1/2—2 godzin, po kąpieli chory najlepiej zrobi, kładąc się do łóżka. Kąpiele bierze chory codziennie.

Jakakolwiek obraliśmy drogę i przetwór rtęci, to przeciętnie w danym wypadku należy go stosować aż do ustąpienia zmian chorobowych, a po ustąpieniu takowych jeszcze przez jakiś czas przedłużyć leczenie. Jeżeli w cią-

gu leczenia przetworami Hg. wystąpi albo Stomatitis lub Enteritis mercurialis przerwać leczenie i nie rozpocząć na nowo aż do zupełnego ustąpienia objawów zadrażnienia dziąseł lub przewodu pokarmowego.

Leczenie przetworami jodu.

Wskazanem jest:

1) u osobników dotkniętych równoczesnem zakażeniem żółtym;

2) przy zajęciu układu kostnego, narządów mięszszowych, układu nerwowego;

3) jeżeli pacjent poprzednio był leczony przeważnie przetworami rtęci;

4) w kile złośliwej wczesnej.

938. *Kalii (Natrii) jodati* 5—
 10 : 200'00,

Det. ad vitr. caerul.

S. 2 łyżki dziennie.

U osobników niedokrewnych zapisujemy:

939. *Ferri jodati* 10'00,
Extr. et pulv. Gent.
āā. q. s. f. pill. N. 100.

S. 3 razy dnia po 4—6 pigułek.

940. *Natr. jod.* 5'00,
Extr. et pulv. radiceis Acori
āā. q. s. f. pill. N. 50.

S. 3 razy dnia po 2 pig.

Syphilis tertiaria.

W postaciach lżejszych jod, Decoctum Zittmani (polecając rano na czczo 300'0 fortius, po południu 300'0 mitius); w cięższych (zmiany w mózgu, rdzeniu pacierzowym, oku), wcierania; u źle odżywionych starać się o poprawienie odżywienia.

W zmianach przystępnych do leczenia miejscowego a więc: kilaki skórne, zapalenia okostnej etc. przyspieszyć wessanie przez przykładanie plastra rtęciowego.

Syphilis congenita.

Najpewniej działają wcierania, które bez obawy robić można u osesków 4—6 tygodniowych po 0·5—1·0 pro dosi na przemian jednego dnia na klatce piersiowej i brzuchu, drugiego na grzbiecie, a mniej pewne są kąpiele sublimatowe robione codzień według:

941. *Sublimati corrosivi*

Ammon. muriat. aa. 2·00,
Aqu. dest. 200·00.

S. Do 1 kąpiele (26—28% R.).

Wewnętrznie podać można:

942. *Calomel laevig. 0·15,*

Sacchari lactis 4·00.
Mfp. d. in d. ae. N. XII.

S. Rano i wieczór po jednym proszku.

Co 6 dni spauszować przez jeden dzień, znów podawać przez dalsze 6 dni aż do ustąpienia zmian.

Tabes dorsualis.

Jeżeli tabes na tle kiłowem, to wcierania unguenti cin. i kali jodat.

W innych przypadkach kąpiele letnie lub ciepłe, procedury hydropatyczne, elektryzowanie stosu pacierzowego prądem galwanicznym, mniej polecane prądem faradycznym. Pędzlowanie stosu pacierzowego c. Tra jodi.

Na wewnątrz Arg. nitricum 0·01—0·02 w pigułkach.

943. *Argenti nitrici 1·00,*

Argill. 10·00,
F. c. aq. dest. qu. s. pil. N. 100.
Consp. c. pulv. cinnam.

S. Przez 8 dni po 1 pigułce, następnie po 2—3.

944. *Sol. arsenic. Fowleri 5·0,* *Aq. Cinnamomi 25·0.*

S. Rano i wieczór po 15 kropeł zażyć.

Kali jodatum 10:200, Arsen po 0·001, Ergotyna po 0·1—0·5 2—3 razy dziennie, Fosfor po $\frac{1}{10}$ miligr. do $\frac{5}{10}$ miligr., w roztynach oleistych, mały dają rezultat dodatni.

Wieszanie chorego sposobem Mocutkowskiego i Charcota małej korzyści przynosi, jednak czasem ulgę sprawia.

Zresztą leczenie symptomatyczne, zwłaszcza kojenie bólu środkami narkotycznymi, phenacetina po 0·50 2—3 razy dzien., exalgina po 0·25 2—3 proszków na dzień, antipyrina 1·0, 3—4 na dzień, wstrzykiwania morfiny.

Chorych zamożniejszych wysłać do Nauheim, Teplitz, Wildbad, Ragaz, Pyrmont, Elster Gastein, Piszczany, Trenczyn, Truskawiec.

945. *Liniment volat 30·00.*

Chloroform 20·00.

MS. Do nacierañ.

Taenia.

Wieczorem dnia poprzedniego przed rozpoczęciem leczenia lekki purgans i filiżanka herbaty lub rosółu, także śledź. Rano dnia następnego trochę czarnej kawy lub herbaty i lekarstwo, które stosować zamierzamy. W 2 godziny po zażyciu leku Ol. ricini lub calomel aż do skutku. U starszych dzieci postępowanie podobne jak u dorosłych; u mniejszych, jeśli źle odżywione i osłabione nie spędzać tasiemca. Jeśli dziecko zwymiotuje podany lek, należy dawkę powtórzyć.

946. *Cortic. Gunic. Pranati* 50·0,
Natrii bicarb. 5·0,
Macera per horas 24 in aq.
destill. 400·0,
dein coque ad remanent. 200·0,
Syr. mannati 20·0.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ godziny 3-cią część
 zażywać.

947. *Extr. cort. rad. Pun.*
Granat. 18 0,
Extr. Filic. mar. aether. 10·0,
M. exhibe in caps. gelat.

Nr. XXX.

DS. Rano na czczo zażyć 8—
 10 kapsulek, potem herbata,
 później co $\frac{1}{2}$ godz. 2 aż do
 ostatniej kapsułki.

948. *Pulv. Kamalae* 20·0,
Extr. Filic. mar. 5·0,
Mfp. div. in dos. Nr. XXX,
Da in capsul. gelatin.

DS. Co $\frac{1}{4}$ godz. 4 kapsułki.

949. *Pulv. flor. Kuso* 25·0,
Melis despum. q. s. ut. f.
electuarium.

DS. W ciągu godziny zażyć
 na 2 lub 3 razy.

950. *Extr. Filic. mar. aether.*
Pulv. Filic. mar. āā. 2·0,
Conservae rosarum q. s. ut
f. pill. Nr. 15.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 3 pigułki.

951. *Extr. Filic. mar.*
aether. 5·0—10·0,

Aq. menth. pip. 150·0,

Ol. ricini 30·0,

Sacch. albi 20·0,

M. f. emulsio.

DS. W ciągu kilku godzin
 częściami zażywać.

952. *Cortic. Acaciae anthelm.*
pulv. 40·0,

Infund. ad col. 200·0.

DS. Wypić 3—4 godziny przed
 śniadaniem.

953. *Strontii lactici* 20·0,
Aq. destill. 120·0,
Glycerini 20·0.

DS. Codziennie po 2 łyżki
 przez 5 dni.

Dzieciom:

954. *Extr. Filic. mar. aether.*
melis despum.
Rad. filic. mar. pulv. q. s. ut
f. electuarium.

DS. W ciągu $\frac{1}{2}$ dnia częściami
 zażywać.

955. *Pelletierini sulf.* 0·30,
Tannini p. 0·50,
Aq. destill. 30·0.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

956. *Extr. Filic. mar. rec. par*
 5·0.

DS. Zmieszane z cukrem
 sproszkowanym i z dodat-
 kiem kilku kropel cytryny
 w 2 częściach w ciągu dnia
 zażywać.

Tetanus.

Usunięcie powodów: oczysz-
 czenie ran i wrzodów, wydo-
 bycie ciał obcych, odszczepów
 kostnych.

Wstrzykiwania podskórne
 w pobliżu rany co 2 godz. 0·02
acid. carbol. Wstrzykiwać mor-
 finę w małych dawkach, chloro-
 formowanie. Chloral w lewaty-
 wach lub wewnątrznie z Cognac-
 kiem.

957. *Sulfonali* 1·00,
Dtur. tal. dos. N. 5.

S. 3 do 4 pr. dziennie (roz-
 puściwszy w 200 gramach
 herbaty lub rosolu).

958. *Urethani* 1·00,
tal. dos. N. 5.

2 do 3 razy dziennie proszek
 we wodzie.

959. *Pilocarpin hydrochlor.*
 0·10,

Aqu. dest. 10·00.

MDS. Do wstrzykiwań (2—3
 strzykawek dziennie).

Acid. salicyl. w dużych daw-
 kach, kali bromatum 5—10 grm.
 dziennie.

W razie osłabienia serca, pod-
skórne wstrzykiwanie eteru,
kamfory.

960. Antipyrini 0.50,

Dt. d. N. X.

S. Co 3 godziny proszek.

961. Curare 0.05,

Glycerini 5.0.

S. $\frac{1}{2}$ strzykawki (2 strzykawki
dziennie).

Polecane zastrzykiwania anti-
toxyny przeciwężcowej (Tizzo-
ni-Catani) dotychczas nie przy-
noszą korzyści.

**Tic douloureux zob. Neural-
gia trigemini.**

Tonsillitis zob. Angina.

**Trachoma zob. Conjunctiv.
blenorrh. chron.**

**Trismus et Tetanus neona-
torum.**

Główną uwagę zwrócić na pę-
pek, opatrunek przeciwnilny.

Chloral po 0.05 pro dosi, kil-
ka razy dziennie, w mleku, wlać
przez nos lub w lewatywie (w po-
dwójnej dawce), Sulfonal 0.20
p. dosi w lewatywie po każdym
napadzie. Sole bromowe po 0.50
na dzień. Ciepłe kąpiele 28° R.
kilka razy dziennie. Karmić
mlekiem, również przez nos. Le-
watywy odżywcze z mleka po
50 ctm. sześć. co 2 godziny.

Tuberculosis pulmonum.

W przypadkach gruźlicy dzie-
dzicznej, należy zwrócić całą
uwagę na higieniczne wycho-
wanie, przebywanie jak najwię-
cej na świeżem powietrzu, gi-
mnastykę, wysypianie się, do-
bre odżywianie, nie obciążanie

pracą umysłową lub fizyczną,
unikanie zaziębień, hartowanie
skóry przez zimne nacierania
słoną wodą, zwłaszcza: szyi i
klatki piersiowej.

W pierwszych początkach su-
chot przedewszystkiem uważać
na podniesienie odżywienia cho-
rego, forsownie go żywić. Po-
lecić picie mleka w lecie, tranu
w zimie, tłuszczów jak najwię-
cej, o ile tylko żołądek znosi.
Pobyt kilkomiesięczny w gór-
skim powietrzu podczas lata,
na zimę zaś polecieć wyjazd do
jednej ze stacyj klimatycznych
najbardziej zalecanych: Davos
(zakład Dra Turbana), Zakopa-
ne (zakład Dra Chramca, Dra
Chwistka i Dra Piaseckiego),
Meran, Arco, Bordighera, Men-
tona, Nizza i t. p.

Ze środków leczniczych stoso-
wać kreozot, guajakol, kreozot.
carbonic. 6.00 pro die, arsen,
zresztą leczenie symptomatyczne
jak przy bronchitis.

W późniejszych okresach obok
powyższych poleceń pilnie uwa-
żać na pojawiające się krwio-
plucia i stosownie je wstrzymy-
wać. Zmniejszać wydzielanie
plwocin przez środki balsami-
czne, usuwać gorączkę przez po-
dawanie miernych dawek leków
przeciwgorączkowych, jak anti-
pyriny po 0.50, 2—3 pr. na dzień,
w razie potrzeby. Toż samo phe-
nacetiny lub antifebriny po 0.25.

962. Salipyrin 1.00,

Dtur. tal. dos. 15.

S. Co 2 godz. pr. (do 7 dzien.).

963. Lactophenin. 0.50,

D. t. dos. XV.

S. 3—4 proszki dziennie.

Usuwanie nocnych potów
przez zmywanie ciała winnym
octem, cognakiem, wodą koloń-
ską lub na wewnątrz cognac
z mlekiem, lub atropina po 0.001
na noc, Agaricin bardzo słabo

działa, z nowszych środków polecają: Kalium telluricum po 0·01 na noc, dochodząc do 0·05.

964. *Acidi agaricin.* 0·01—0·05,
Sacchari 0·30,
Mfp. dtur. tal. dos. X.

S. 2 proszki dziennie.

965. *Agaracin.* 0·10,
Pulv. Dover. 2·0,
Rad. Altheae
Mucilag. gum. arab. āā. 1·0,
Mf. pill. Nr. 20.

S. Wieczór pigułek zażyć.

966. *Hyosc. hydrojod.* 0·01,
Argill. q. s. ut f. pill. Nr. 20.
S. Na noc pigułek.

W razie krwotoków bezwzględny spokój, okład lodowy na piersi, połykanie lodu, pokarmy tylko chłodne, wstrzyknięcie Ergotini Bombelon 0·50 do 1·0 na raz, podanie większych dawek morfiny dla zapobieżenia kaszlowi.

Przy tętnie przyspieszonym dać: Fol. Digitalis 0·05 z morfiną 0·01 co 2—3 godz. proszek.

W ciężkich przypadkach krwotoku, wstrzyknąć atropinę 0·10: 10·0 z tego pół strzykawki na raz, lub Acid. sclerotinici 1:10: wody, z tego co godzinę strzykawkę.

967. *Extr. fluid. Hydr. canad.* 10·00.

S. Na wieczór 30 kropel.

Przeciw biegunce leki osłabiające z dodatkiem opiatów:

968. *Plumb. acet.*
Laudani āā. 0·03.
M p. dtur tal. dos. 10.

S. 2—3 razy dziennie.

969. *Ludani pur.* 0·20,
Tannini pur. 1·0,
Pulv. rad. Colombo 2·0,
Mfp. div. in dos. Nr. X.
S. Co 4 godz proszek.

970. *Decoct. rad. Colombo* e 10*i* ad 200·0,

Mucilag. Salep. 10·0,
Extr. op. aq. 0·10,
Syr. cortic. aur. 20·0.
S. Co 2 gooz. łyżkę.

Pigułki kreozotowe używać bez balsamu tolutańskiego. Dziennie można dojść do 5—6 grm.

Z wyrobów krajowych pigułki Zahradnika „Hygea“, z zagranicznych dobre są Jaspersa (Berlin). W roztworze dobrze jest zapisywać kreozot z Tra amara lub Tra gent.

971. *Kreozoti e bit. fagi* 3·00,
Trae gent. 30·00.

DS. Po jedzeniu 20—30 kr w kieliszku wody lub wina.

972. *Kreozoti e bit. fagi* 1·00,
Trae gent. 2·50,
Spir. vini rectific. 25·00,
Vini Xerens 100·00.

DS. 3 razy dziennie po łyżeczce w szklance wody.

973. *Kreozoti* 2·0,
Natri arsenic. 0·04,
Vini malagensis 500.
S. 2 kieliszki dziennie.

974. *Kreozot. carbon.* 40·0.
S. 3 r. na dzień po ½—1 łyż. (przetwór drogi, grm. 8—9 ct.)

975. *Guajacol. carbon.* 20·0,
Div. in dos. XX.
S. 2 proszki dziennie.

976. *Guajacoli* 2·0,
Spir. vini 20·0,
Tinct. gentian. 10·0,
Extr. Coff. conc. 20·0,
Aqu. dest. 200·0.
MDS. 2—4 łyżek dziennie.

Pigułki guajakolowe po 0·05 wyrobu Zahradnika, w tych samych dawkach co kreozot.

977. *Benzosoli* 0·30—0·50—1·0,
D. t. dos. XV.

S. 2 proszki dziennie z początku po 0·30, potem po 0·50, wreszcie po 1·00 na raz.

Tuberculosis laryngis.

W przypadkach owrzodzeń więcej ograniczonych, kwas mlekowy 40 i 80 $\frac{0}{10}$, przy zmianach rozleglejszych zadmuchiwania czystym jodolem; przy bólach przy przełykaniu zadmuchiwania morfiny.

978. *Morphii mur.* 0·50,
Sacch. lact. 5·00.

979. *Nosophen* 5·0,
Pulv. gumm. 1·0.

DS. Wdmuchiwanie do krtani.

Również można połączyć jodol z morfiną. W przypadkach zasychania wydzieliny w krtani, bólów i uporczywego kaszlu, można też polecić wdychiwania ciepłe ze słabych roztworów soli kuchennej z dodatkiem morfiny w stosunku 0·10—0·20 $\frac{0}{10}$ lub tylko z morfiny.

Tussis convulsiva zob. Pertussis.

Typhlitis et Perityphlitis.

Leczenie zewnętrzne polega na stosowaniu środków przeciwzapalnych i odwodzących: okład lodowy, pijawki, smarowanie jodyną. W przypadkach, gdy chory nie znosi okładów lodowych — okład wysychający. Nie zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Wewnętrznie przetwory mawkowca w dużych dawkach. Jeżeli je chory wymiotuje, w postaci czopków do kiszki odchodowej, a w razie gwałtownych bólów, podskórne wstrzyknięcie morfiny. Dyeta wyłącznie płynna, bezwzględny spokój.

Gdy okres zapalenia minie, środki przyspieszające wessanie wypociny są wskazane, więc: okłady ciepłe, wcieranie maści jodowych. Jeżeli stolce w tym

okresie dobrowolnie nie nastąpią, należy je ułatwić za pomocą lewatyw. Zresztą leczenie czysto przypadkowe, w razie silnych wymiotów, kawałki lodu do polykania, Cocaina.

W razie zapadu, napoje wyskokowe. eter podskórnie.

980. *Trae opii simpl.* 5·00.

DS. 3 razy dziennie po 5—10 kropel.

981. *Tinct. laud. simpl. gtt.* X,
Emuls. amygdal. 50·0.

S. Co 3 godz. łyżkę.

982. *Extr. Opii* 0·02,
Sacchari albi 0·30,
Dent. t. dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

W razie silnych wymiotów:

983. *Cocain muriat.* 0·20,
Aqu. dest. 10·00.

MDS. W razie wymiotów 10 kropel zażyć.

984. *Morphii mur.* 1·00,
Spir. vini 5·00,
Glycerin 10·00,
Aq. dest. ad 30·00.

DS. Do podskór. wstrzykiw. (Rozczyn bardzo trwały).

Jako przyspieszające wessanie:

985. *Ung. Kali jodati* 25·00.
DS. Do wcierania.

986. *Kali jodati* 2·00,
Extr. Bellad. 0·50,
Ung. simpl. 30·00.
MDS. Do wcierania.

W razie parcia na stolce lub mocz:

987. *Morph. mur.* 0·20,
Butyri Cacao 10·00,
Mf. l. a. supposit. N. X.
S. 2—3 na dobę użyć.

988. *Extr. Opii aquos* 0·03,
Butyri Cacao 1·0,
F. suppos. dent. t. dos. X.
S. 2—3 czopki dziennie użyć.

Typhus.

Leczenie przypadkowe, polegające na zwalczaniu zagrażających objawów. Przy pierwszym podejrzeniu na T. abd. purgans. najlepiej Calomel po 0·50 z dodatkiem pulv. Ialapp. 0·30 2—3 dawki aż do skutku.

Gorączkę należy obniżać za pomocą chłodnych zmywań całego ciała wodą czystą lub z dodatkiem octu, letniemi kąpielami i środkami przeciwgorączkowymi, jeżeli zbyt wysoka, ale ostrożnie, aby nie wywołać zapadu.

Skrzepiać akcyę serca napojami wysokokowemi, a gdy te nie są dostateczne, środkami nasercowymi.

W razie silnej biegunki, przetrwory makowca i środki ściągające; w razie zaparcia stolca w pierwszym okresie choroby, środki czyszczące, w późniejszych okresach lepiej lewatywy stosować.

Przytem należy pamiętać o należytem przewietrzaniu mieszkania, desinfekcyi stołców i bieżni. Dyeta powinna być wyłącznie płynna, zwłaszcza mleko, rosół, wino czerwone.

W razie nieżyty oskrzeli bańki suche.

989. *Chinin. mur.* 0·40,
Dtur. tal. dos. XII.
S. 2—5 pr. dziennie.

990. *Natr. salicyl.* 5·0,
Aqu. dest. 200·0,
Syr. simpl. 15·0.
DS. Co 2 godziny łyżkę.

Gdy chodzi o znaczne obniżenie ciepłoty ciała:

991. *Antipyrin* 0·50,
Coff. natrosalicyl. 0·05
Dtur. tal. dos. X.
DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

992. *Phenacetin* 0·50,
Coff. natrosalicyl. 0·05,
Dent. tal. dos. X.
DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

993. *Lactophenin* 5·0,
Div. in dos. Nr. X,
Da in caps. amyl.
S. Co 2 godz. proszek.

994. *Magn. salicyl. p.* 10·0,
Div. in dos. Nr. X.
S. Co 3 godz. proszek.

W razie silnej biegunki:

995. *Decoct. Salep.* 0·50 ad 200·0,
Trae Opii simpl. gtts. 10,
Syr. rub. Idei 15·0.
DS. Co godzinę łyżkę zażyć.

996. *Chinin. mur.* 2·0,
Pulv. Doweri 3·0,
Mfp. div. in dos. XIII.
DS. 3 proszki dziennie.

997. *Mixt. gum.* 200·0,
Extr. Laudani aquos 0·10.
MDS. Co godzinę łyżkę.

998. *Napthalini* 0·20,
Magi. Bism. 0·15,
Chinin sulph. 0·25,
Mfp. tal. dos. 15.
S. 3 proszki dziennie.

W razie zapadu:

999. *Camphor. trit. opt.*
alcohol 0·05,
Coffeini natrosalicyl. 0·10,
Chinini mur. 0·20,
Mfp. Dent. tal. dos. XII.
DS. 4—5 proszków dziennie.

1000. *Naphtol-B*
Bismuth, salicyl. āā. 0·20.
Mfp. S. 10 proszków na 24 godziny w razie biegunki.

1001. *Naphtol-B*
Magnes. salicyl. āā. 0·20.
S. ut supra.
(w razie zaparcia stolca).

W razie krwotoków jelitowych okład lodowy na brzuch i środki przeciwkrwotokowe:

1002. *Ferri sesq. sol.* 1'0,
Aq. Cinnam. 150'0,
Syr. Cinnam. 20'0.
 S. Co godz. łyżkę.

1003. *Alumin. crud.* 0'50,
Laudan. pur. 0'10,
Camphor. 0'30,
Sacch. lactis. 2'0,
Mfp. div. in dos. Nr. V.
 S. Co 2 godz. proszek.

1004. *Plumbi acetici*
Laudani p. āā. 0'30,
Amyli puri 5'0,
Mfp. div. in dos. Nr. X.
 S. Co 2 godz. proszek.

Nareszcie wraz z silnego podrażnienia mózgu:

1005. *Natri bromati* 0'50,
Sacchari 10'0.

Rozpuściwszy we wodzie, wypić w ciągu dnia.

1005. *Camphor.* 0'50,
Chloralhydrat. 1'0,
Aqu. dest. 60'0,
Vitell. ovi unius.
 S. Co 2 godzinny łyżeczkę.

Typhus exanthematicus

według tych samych prawideł.

Ulcus contagiosum s. molle.

Jeżeli nie ma żadnego powikłania (zwłaszcza żaden z gruczołów pachwinowych nie powiększony) można starać się oczyścić dno wrzodu przez środki żrące:

1006. *Cupri sulfurici* 5'00,
Aqu. dest. 15'00.
 S. pędzlowanie.

Pacjent przykładą co 2 godziny na owrządzenie tamponik waty umoczony w tym płynie, na noc zostawia takowy, poczem w miejscu wrzodu tworzy się strup, który po odpadnięciu odsłania ranę czystą. Wtedy polecić obmywanie rany jakim płynem antyseptycznym i przykładanie

maści z Argent. nitr. 1% lub 3% borowej. Zamiast Cupr. sulf. użyć można Acid. carbol. 4%, kwasu azotowego i t. d. W miejsce środków żrących użyć można:

1007. *Jodoformi oleo amygdal. desodorati* 3'00.
 S. Zasypka.

1008. *Nosophen* 5'0.
 S. Zasypka.

a kiedy wrzód zamieni się na ranę czystą, leczyć ją jak powyżej.

Veiel zaleca jako zasypkę (drogi):

1009. *Aioli* 5'0.
 S. Zasypka.

1010. *Europeni* 5'0.
 S. Zasypka.

Bardzo dobre wyniki osiąga się przez zniszczenie wrzodów miękkich (jeżeli nie zajęły zbyt wielkiej powierzchni) Paquelinem, przez co otrzymane czyste ubytki przy zastosowaniu obojętnej maści łatwo się goją; wypalenie robi się naturalnie przy miejscowem znieczuleniu kokainą.

W pierwszych chwilach, kiedy który z gruczołów jest lekko powiększony, bolesny, starać się przez okłady lodowe, wcieranie szaruchy zapobiedz ropieniu. Najczęściej wynik bywa ujemny, a wtedy, nie czekając, aż gruczoły powiększą się znacznie, nawet da się wyczuć chęłbotanie, wyciąć gruczoły zajęte, a nawet podejrżane. Kiedy daje się wykażać wyraźne chęłbotanie, można ograniczyć się do przecięcia, następne leczenie jak każdego ropnia.

Ulcera corneae.

Zawdzięczają one swe powstanie infekcyi lokalnej na tle

ekoryacji rogówki. Dla tego to obok drobnych urazów rogówki (ciała obce, trichiasis, entropium, lagophthalmus, exophthalmus) najczęstszą przyczyną wrzodów rog. są zapalenia spojówki, gdzie wydzielina śluzowa lub śluzowo-ropna stanowi materiał zakazny. Odróżniamy więc:

1) Wrzody kataralne charakteryzujące się swem położeniem obwodowem i kształtem półksiężycowym.

2) Wrzody na tle jaglicy.

3) Wrzody na tle śluzoropotu.

4) Wrzody na tle dyfteryi.

5) Wrzody urazowe.

Zboczeniom stanu ogólnego zawdzięczają swoje powstanie wrzody po Keratitis phlyctenulosa tudzież po herpes corneae febrilis.

Leczenie: Zależy od etiologii. Wrzody następowe goją się pod wpływem leczenia choroby spojówki (Trachoma, conjunctivitis blennorhoica, conjunctivitis catarhalis). Obok tego dla zapobieżenia Iritis, należy utrzymać źrenicę w rozszerzeniu za pomocą atropinu. W leczeniu wrzodów pierwotnych rogówki zależy postępowanie od stadyum wrzodu. W okresie progresyi t. j. wobec silniejszego nastrzykiwania rzęskowego, żółtawego zabarwienia dna i brzegów wrzodu, należy dążyć wpraw do oczyszczenia nacieku. W przypadkach lżejszych osiągamy to przez zapuszczenie atropiny, zapraszanie jodoformu i opaskę. W przypadkach cięższych wskazane jest obok atropiny zapuszczanie sublimatu 1 na 5000 co 1— $1\frac{1}{2}$ godz., ciepłe okłady z siemienia lnianego przez kilka godz. dziennie, na noc jodoform i opaska. Wobec wrzodów głębszych, gdzie grozi przebicie, lub zachodzi obawa zniszczenia przeważnej części

rogówki, lepiej jest zastąpić zwłaszcza przy wrzodach obwodowych atropinę, pilokarpiną lub eseryną, środki te bowiem obniżając ucisk śródoczny, poprawiają odporność rogówki. Dopóki wrzód wybitnie ropny (np. *ulcus serpens corneae*) jest nie zbyt rozległy, najlepszym środkiem wstrzymującym progresję jest przypalenie galwanokautezem. Przy większych jednak rozmiarach wrzodu lub abscesu rogówki wskazaną będzie keratomia wedle Saemisch'a.

Doprowadziwszy leczeniem tem wrzód do oczyszczenia się (oko blade, dno wrzodu już za ledwie szare lub zupełnie czyste) przystąpić należy do przyspieszenia regeneracji przez środki lekko drażniące a zarazem wyjaśniające, jak calomel i maść Pagenstechera. (*Rp.* 638)

Maculae.

Łatwo je odróżnić od nacieków zapalnych uwzględniając: 1) brak nastrzykania rzęsk, 2) ostre odgraniczenie, 3) barwę białą lub niebieskawą, 4) gładką zwierzchnią powierzchnię.

Tylko świeże plamki można do pewnego stopnia wyjaśnić przez dłuższe stosowanie środków podanych przy Keratitis parenchym. diff. Plamy grubsze zasłaniające źrenicę dają wskazanie do iridectomii optycznej. W celu kosmetycznym można szpecące plamy uczynić mniej widocznymi przez tatuowanie.

Staphyloma corneae.

Garbiaki częściowe bez względu na stopień upośledzenia wzroku, jaki wywołują, dają wskazanie do iridectomii, aby ocalić wzrok podupadający skutkiem podwyższenia ucisku śródocznego. W razie wrośnięcia źrenicy całkowitego w bliźnę, można przy utrzymanem poczuciu świa-

tła (światło stoczka na 6 m. lokalizacja dobra) przez iridectomię nawet wzrok przywrócić.

Garbiaki całkowite o ile wywołują dolegliwości przez swe rozmiary, a utrzymane jest poczucie światła, mogą być usunięte drogą operacyjną (Wecker. Knapp). Wobec braku jednak poczucia światła zwłaszcza przy równoczesnem wyłączeniu twar-dówki, wskazana jest enukleacja gałki ocznej.

Ulcera intestini tuberculosa.

Leczenie czysto przypadkowe, polega na podawaniu środków odurzających wewnątrznie lub w postaci wstrzykiwań podskórnych. W razie silniejszych bólów na podawaniu przetworów makowca wraz ze środkami ściągającymi i przeciwniezapalnymi z powodu zwykłe towarzyszącej biegunki. Przytem należy starać się podnieść odżywienie chorego za pomocą odpowiedniej diety (do mleka dodawać Aq. Calcis).

1011. *Tinct. Opii simpl.* 10·00.

DS. 2—3 r. dnia po 5—10 kropel.

1012. *Laudani puri* 0·02,

Tannini 0·10,

Naphtalini 0·25,

Sacch. alb. 0·30,

Mfp. dent. tal. dos. XII.

DS. 2—3 proszki dziennie.

1013. *Benzonaphtoli*

Bismut. salicyl

Resorcin aa. 0·20.

Mfp. dtur tal. dos. N. 15.

S. 3—5 proszków dziennie.

1014. *Tinct. Colombo*

— *Cascarillae aa.* 15·00.

DS. Co godzinę 10—30 kropel w kleiku.

1015. *Extr. Opii* 0·02,

Resorcini 0·20,

Sacch. alb. 0·30,

Mfp. dent. tal. dos. XII.

DS. 2—3 proszki dziennie.

1016. *Decoct. rad. Colomb.*

e 10·00 *ad* 150·00,

Tinct. opii gtt. XX.

Syr. simpl. 15·00.

DS Co 2 godz. łyżkę.

1017. *Bismuth. subnitrici* 5·00,

Opii puri 0·02,

Sacch. alb. 4·00,

Mfp. Div. in dos. N. X.

S. 3 proszki na dzień.

Ulcus ventriculi. Wrzód żołądka okrągły.

Przy świeżym wrzodzie zalecić ścisłą dyetę co 1/2 godziny łyżkę kw. mleka, woda białkowa z cukrem, okłady lodowe na żołądek, spokój bezwzględny, opium. Dalsze leczenie polega na podawaniu środków alkalicznych, czy to w postaci wód mineralnych, czy też soli alkalicznych.

Korzystne wyniki leczenia dają przepłukiwania wodą karlsbadzką lub roczynami soli karlsbadzkiej prawdziwej lub sztucznej, które mają i tę zaletę, że je stosować można i w razach, gdzie picie wody karlsbadzkiej z innych powodów jest przeciwwskazanem.

1018. *Natri bicarbon* 40·00,

Natri sulphur. 40·00,

Natri chlorati 20·00.

Mfp. S. Łyzeczkę na litr wody do przepłukania żołądka.

W razie silnych bólów lub wymiotów są wskazane środki odurzające, w razie krwotoków żołądkowych postępowanie lecznicze jak przy Haematemesis. Obok tego postępowania leczniczego dieta powinna być pożywna a lekko strawna z wykluczeniem wszelkich napojów wysokowych lub CO₂ zawierających, kwasów, tłuszczów i pokarmów korzennych. Gdy chorego z powodu silnych bólów, gwałtownych wy-

miotów lub żołądkowych krwotoków nie można stosownie żywić, wskazane są lewatywy odżywcze.

Często towarzyszące zaparcie stolca usuwać należy lewatywami.

1019. *Chloroformii* 1'00,
Aqu. dest. 120'00,
Bismuth subnitr. 3'00.
D. Co godz. łyżkę.

1020. *Sal. therm. Carolin.* 100'0.
DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki letniej wody zażyć.

1021. *Natr. bicarb.*
Magn. ustae āā. 15'00.
MDS. 3—4 razy dziennie na koniec noża zażyć.

1022. *Natr. bicarb.* 5'00,
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.

1023. *Morph. muriat.* 0'10-
Aqu. laurocer. 10'00.
DS. W razie bólów 10 kr. zażyć.

1024. *Codeini* 0'02,
Natr. bicarb. 0'50,
f. p. dent. t. dos. XII.
S. 2—3 proszki dzien. zażyć.

1025. *Magister. bismuth.* 5'00,
Codeini 0'20,
Mfp. div. in dos. X.
S. 3 proszki dziennie.

1026. *Morph. mur.* 0'10,
Aqu. dest.
Glycerini āā. 5'00.
MDS. Do podskórnych wstrzykiwań. W jednej strzykawce 0'01 morfiny.

Uraemia zob. Morbus Brighti. Urticaria.

Starać się o wyszukanie i usunięcie przyczyny cierpienia. Takimi są: pasorzyty skórne (pluśki, pchły), nieżyty przewodu

pokarmowego, u kobiet zboczenia w narządzie rodnym. Jako leczenie symptomatyczne skierowane przeciw swędzeniu i pieczeniu skóry polecić używanie:

1027. *Spir. vini gallici* 200'00,
Aetheris petrolei 5'00,
Glycerini 2'50.
S. Do zmywania.

1028. *Aceti vini*
Aqu. dest. āā. 100'00,
Acidi salicylici 1'00.
S. Zewnętrznie.

1029. *Spir. Lavand.* 100'00,
Spir. vini gallici 150'00,
Aetheris sulfurici 2'50,
Aconitini 1'00.
S. Zewnętrznie.

Po każdoraz. zmyciu puder.

W wypadkach pokrzywki powtarzającej się często, kąpiele chłodne z dodatkiem $\frac{1}{2}$ —1 kg. sody, 500'0 alunu, lub 10—20'0 sublimatu, zabiegi hydropatyczne.

Vaginismus.

Usunięcie zmian chorobowych miejscowych jak owrzodzeń, zapalenia i t. p. jeżeli się znachodza. Poprawa stanu ogólnego i podawanie środków uspokajających ustrój nerwowy. Gdy objawy niezbyt jeszcze gwałtowne a przyczyną choroby jest niedokładny stosunek płciowy, wpływ moralny, środki znieczulające miejscowo, aby umożliwić coitum.

1030. *Cocaini muriat.* 1'0,
Aqu. dest. 3'0,
Spir. vini rect. 2'0.
DS. Do pędzlowania.

albo:

1031. *Extr. Bellad.* 1'0,
Vasellini 15'0.

Mf. ungu. DS. Na wacie między wargi na noc zakładać.

Zasypywanie jodoformu. Można też polecić okłady z wody Goularda, pędzlowanie roztworem azotanu srebrowego 1:50 lub roztworem kwasu karbolenowego 1:30. Rozszerzanie powolne wnijścia pochwowego rozszerzaczami.

Jeżeli przypadki gwałtowne: wycięcie błony dziewiczej i nagle rozciągnięcie wnijścia pochwowego sposobem łętym poprzedniem zachloroformowaniu chorej.

Vaginitis zob. Fluoralbus.

Varicella.

Lżejsze przypadki nie wymagają leczenia, prócz lekkiej diety, oraz pozostania w pokoju zwłaszcza, w chłodniejszej porze roku. Swędzenie usuwa się obfitami zasypkami, owrzodzenia wymagają opatrunków. Należy zwracać uwagę na zdarzające się powikłanie z zapaleniem nerek, w skutek czego po 3 tygodniu mocz badać trzeba.

1032. *Acidi salicyl* 0·50,
Alumin plumosi 50·00.
Mfp. S. Zasypka.

Variola.

W okresie zwiastunów, prze-czyszczanie. Przewietrzać pomieszkowanie, ciepłota pokoju 14—15° R., lekkie przykrycie chorego, dieta pożywna płynna, mleko, mocny rosół z żółtkiem. Dużo wody, orszada, woda z winem. Przeciw bólom głowy lodowe okłady. Napięcie skóry łagodzić smarowaniem tłuszczów (oliwa, vaselina, 5% maść borowa). Kąpiele ciepłe, a gdy to niemożliwe, zmywania ciepłą wodą, zwłaszcza twarz i powieki. Płukanie: 2% Kali chloricum, 3% kw. borowy.

1033. *Kali chloric.* 5·00,
solve in
Infus. flor. Tiliae 300·00,
Trae laudan. 1·00,
Mell. rosati 10·00.

DS. Płukanie.

1034. *Tannin. puri* 1·00,
Alumin. 0·50,
Kali bromat. 5·00,
Mucilag. gum. ar. 25·00,
Aqu. dest. 200·00.

DS. Płukanie.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub wstrzyknięcie morfiny w okolicę dolka podsercowego.

W razie bezsenności:

1035. *Chloralhydrat* 3·00,
Aqu. dest. 60·00,
Syrup rubid.
Mucilag. gum. ar. āā. 20·00.
DS. Połowę na raz użyć.

1036. *Sulfonali* 0·50,
Dtur. tal. dos. N. 5.
S. Na noc proszek w herbacie lub rosole.

Zaraz po wybuchu wysypki dać na głowę, twarz i szyję maskę z płótna, pozostawiwszy otwory na nos, oczy i usta, posmarowaną pastą:

1037. *Acid. carbol* 3·00,
Amyli
Ol. amygdal. dulc. āā. 50·00:
F. Pasta. S. Zewnętrznie.

Resztę ciała smarować często.

1038. *Acid salicyl* 3·00,
Amyli 30·00,
Glycerin neutr. 70·00.
Mf. Pasta.

A oprócz tych środków:

1039. *Ol. amygd. dulc.* 15·00,
Syrup flor. aurant. 30·00,
Aqu. lauroc. 10·00,
Chinin. hydrochlor. 0·50,
Solve in acid. hydrochlor. q. s. f. emulsio.

S. Co kwadrans do 1½ godz. po kilka kropel (Leventaner z Konstantynopola).

Wstrzymuje też rozwój wysypki Cocaina, jużto 3—4 wstrzyknięć podskórnych rozczynu 2⁰/₀, już też (0:20:125 mixt. gum.) w przeciągu 24 godzin podana. Ciepłota ma spadać szybko i rozwój wysypki ustaje.

W osłabieniu serca: kamfora, wino, cognac na pół z wodą z żółtkiem i cukrem, co godz. łyżkę. Ropnie wcześniej otwierać.

Vitia cordis.

W okresie wyrównania stosowne żywienie, mleko, mięso bez korzeni, osobom chudym więcej tłuszczów, otyłym tychże zabronić.

Wzbronione również napoje wysokokowe, prócz lekkich win. Ruch, a mianowicie po równi, lub po miernych wzniesieniach gór, z wyjątkiem, gdy chorzy dostają duszności, zawrotów głowy, lub nieregularności tętna, gimnastyka lecznicza, kąpiele solne letnie. Unikać wzduszeń. Uregulować stolec.

Wobec braku wyrównania leżenie w łóżku:

1040. *Infus. Digitalis e 1'00*
ad 150'00,

Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

1041. *Trae digital. 2'50,*
Aqu. lauroc. 8'00.

MDS. 3 razy dziennie po 15 kropel.

1042. *Pulv. fol. Digitalis*
0'50—1'00,

Sacchari 3'00,

Mfp. div. in dos. N. 10.

S. Co 2 godziny proszek.

Jeżeli po użyciu Digital. tętno mocniejsze, regularniejsze, ilość moczu większa, to przestać na parę dni podawać.

1043. *Trae Strophanti*
Aqu. lauroc. āā. 10'00.

S. 3 razy dzien. po 10 kropel
(Dzieciom od 5—16 lat do 5 kropel dziennie).

1044. *Trae Cacti grandifl. 5'0,*
Trae convular. maj. 10'0.

DS. 3 razy dnia po 15 kropel.

1045. *Trae Nerii Oleander 5'0,*
Trae Adonis vernalis 10'0.

S. 3 r. dz. po 15 kropel.

1046. *Coffeini natrobenz. 2'00,*
Sacchari 5'00,

Mfp. div. in dos. 20.

S. 5—8 pr. dziennie.

1047. *Theobrom. natro-benz. 0'10*
Sacchari albi 0'20,

Mfp. d. tal. dos. 20.

S. Co 2 godz. proszek.

1048. *Sparteini 0'02,*
Sacch. albi 0'30.

Mfp. dtal. dos. N. X.

S. 2—3 proszk. dziennie.

1049. *Inf. Conval. maj. e 6'00*
ad 180'0),

Coff. natrobenzoic. 1'00,

Syr. simpl. 20'00.

D. Co 2 godz. łyżkę.

1050. *Trochisci Nitroglycerin*
ā 0'001,

Tal. dos. 10.

S. W razie napadu duszności osłabienia akcji serca 1/2—1 pastylki.

1051. *Sol. Nitroglycerin alcoh.*
(0'3⁰/₀) 1'0,

Alcohol 5'0.

S. 3 razy dnia 5—6 kropel.

1052. *Kali jodati 10'00,*
Aqu. dest. 200'00.

DS. Rano i wiecz. 1/2—1 łyżki.

1053. *Infus. Adonis. vern. e 5'00,*
ad 180'00,

Syrup rubid. 20'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

1054. *Sparteini. sulfur. 0'10,*
Aqu. dest. 180'00,

Syrup sacchar. 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

1055. Tinct. fruct. immat.*Nerii Oleandri 10·00.*

DS. 2—3 r. dzien. po 20 kropel.

Przeciwn puchlinie nacięcia obrzęklej skóry, jużto lancetem lub małym trójgrańcem po czym opatrunek aseptyczny. W razie duszności, gorczycznik, na okolicę serca, moczenie nóg w gorącej wodzie, wstrzykiwanie morfiny, w razie silnego bicia serca, blaszanka z zimną wodą na okolicę serca.

1056. Tinct. Lobeliae 5·00,*Aqu. lauroc. 10·00.*

DS. Co godz. 10 kropel.

Przy objawach obrzęku płuc:

1057. Inf. flor. Arnicae e 7·50
*ad 150·00,**Liquor Ammoniae anis. 2·00,**Syrup aurant. 15·00.*

MDS. Co godzinę łyżkę.

Volvulus zob. Ileus.**Vulvitis.**

Pierwszym warunkiem leczenia jest utrzymanie sromu w czy-

stości i sucho, unikać drażnienia, polecić spokój, kąpiele ciepłe nasiadowe, następnie srom wysuszyć unikając tarcia, okłady z wody Goularda, z 2⁰/₀ rozczyynu octanu ołowiuowego zasadowego, z 1—2⁰/₀ kwasu karbolowego, z 2—4⁰/₀ kwasu borowego. Jeżeli są nadżerki, to masę cynkowa, salicylowa, pudrować pudrem salicylowym, lub zasypać proszkiem składającym się w równych częściach z jodoformu i dermatolu lub proszkiem składu

1058. Jodoformi 4·0,*Tannini 1·0,**Magist. bismuth. 6·0,**Mf. pulv. D. in scatula.*

S. Do zasypywania (Lutaud).

Ropnie otworzyć. Jeżeli zapalenie sromu jest następstwem chorób wyższych dróg rodnych n. p. rzeżączki pochwy, raka macicy, przetok moczowych, należy usunąć przyczynę, toż samo, jeżeli przyczyna jest niedokrewność, zołży, kiła, należy oprócz leczenia miejscowego, zastosować leczenie ogólne.



SPIS ŚRODKÓW LEKARSKICH

officynalnych i ważniejszych nieofficynalnych
wraz z podaniem ich cen,
sposobu stosowania i dawkowania.

Środki officynalne oznaczone są *. — Czcionkami rozstrzelonemi drukowane są te leki, których najwyższe dawki nie mogą być przekroczone bez oznaczenia ich wykrzyknikiem.

Ceny wyjęte z taksy na rok 1897.

Skrócenia: *p. d.* = pro dosi; *k. r. d.* = kilka razy dnia.

Abri precatorii Sem. (Jequirity); Inf. 0·5—1·0:100; stos w niekt. chorobach ocz. 1·0=3 kr.

Absinthi herba. Inf. 5·0—15·0:100 Col., Pulv. 0·5—2·0 kilka razy dnia 100·0=12 kr. — **Extr.** 0·5 *p. d.* 1·0=4 kr. — **Ol. aether.** 1—2 kropli *pro dosi* 1·0=10 kr. **Tinctura abs.** i ***Tinct. Abs. compos.** 20—60 kropli *k. r. d.* 10·0=4 kr. **Absinthinum** 0·1—0·25 *p. d. k. r. d.* 0·01=3 kr.

***Acetanilidinum** zob. **Antifebrinum.**

Acetalum (Diaethylacetal) Hypnotic. i Anaesthaetic. 8·0—12·0 *p. d.* w emulsyi i mixturze, także w lewatywach.

Acetonum (Spir. pyroacet. depur.) 5—20 kropli *k. r. d.* aż do 5·0! *p. d.* do wzięwań 0·10—1:100 aqu., także jako maść 10·0=10 kr.

Acetphenetidinum patrz Phenacetin.

***Acetum (purum)** jako napój 100—150 na litr wody oczyszczonej; jako woda do ust lub płukanie 20·0—50·0:150·0; do zmywań, okładów, przestrzyk. czysty lub *aa* z wodą. 100=3.

***Acetum aromaticum** (zawiera: ol. Rosm., Junip. Levand. Menthae) 7·0—15·0 *k. r. d.*; do mixtur 15·0—50·0:150·0; jako środek orzeźwiający, do kadzeń. 100=10 kr.

— **colchici** diureticum, antarthricum wewn. 1·0—2·0 *p. d.* *k. r. d.* 10=2 kr.

— **digitalis** wewn. W chorobach gorączkowych i serca 0·5—1·0 *p. d. k. r. d. pro die* 10·0!

pyrolignosum crudum tylko zewnętrznie, czysty lub 10% z wodą, do penszlowań, zmywań i t. d. 100=4 kr.

— **rectificatum** wewn. 0·3—1·0 t. j. 10—30 kropli *k. r. d.* także w rozcieńczeniu z wodami aromatycznymi; 1:10—20

aqu. jako woda do ust lub płukanie; do okładów, zmywań.
100=12 kr.

***Acetum Scillae**, jako diuret i exp. w mixt. po 1'0—5'0 *p. d.*
10'0=3 kr.

***Acidum acet. concentrat** (96⁰/₀ kwas oct.) tylko zewn.
jako środek żrący lub rubef. 10'0=4 kr.

***Acidum acet. dil.** 20—30⁰/₀ (kw. octowy) 0'5—2'0 k. r. d.;
w mixturze 5'0:20'0—150'0 zewn. jak Acetum. 100=12 kr.

— **aromat.** tylko jako pachnidło.

— **trichlora-ceticum.** Anesthetic. i Hypnot., 3 razy dnia po
0'1—0'20; zewnętrzz, jako środek żrący w 1—5⁰/₀ 1'0=6 kr.

***Acidum arsenicosum** (Arsenicum album) 0'001
aż do 0'005 i 0'006! *p. d.*, 0,02! *pro die* w pigułkach
lub rozpszcz.; zewn. jako środek żrący w ma-
ściach, pastach po 0'10—0'30:20'0; do kąpieli i o-
kładów 0'50—20 na litr; do iniekcji 0'50—1'0:100
1'0=1 kr. ***Solutio (Liquor) arsenicalis Fo-**

wleria zawiera w 100 częściach sol. 1 część acid.
ars.; 2—10 krop. (0'5) *p. d.* i 2! *p. die*; zewn. do zastrz.
podsk. 1—2 krople z wodą 1:1—3. 1'0=2. kr. — **Sol.**

arsen. Bietti (Ammon arsenic. 1:500 Aqu.) w 5—10 razy
większej dawce od poprzedniego, tak samo i **Sol. arsen.**

Pearsonii (Natr. arsen. 1:600 aqu.). 1'0=1 kr. — **Pilulae**
asiaticae skł. się z acid. arsenic., piper nigr. i gumi arab.,
1 pigułka zawiera 0'005 ars. 100 pig. = 98 kr. — **Pulv. ar-**
senic. Cosmi (skł. się z acid. ars., Sang. dracon., Carb.
anim., Cinnabaris) używ. do maści, past i w proszku etc.

Acidum asepticum 5⁰/₀ wodny roztwór boraxu w 10⁰
cz. (3⁰/₀) wody utlenionej z acidum salicyl. lub bez niego
10'0=20 kr.

— ***benzoicum** (sublimat.) (Flores Benzoës) 0'03—0'05 *p. d.*
k. r. d. jako expect.; przy polyarthrit 0'5—1'0 co 1—3 go-
dziny, aż do 10'0—12'0 *pro die* w proszku lub mixturze;
zewn. do wziewań, opatrunków (5—10⁰/₀) także do wdych.
zapomocą papierosów. 1'0=5 kr.

— ***boricum** (boracicum) 0'2—1'0 *p. d.* k. r. d. aż do 5'0
p. die w proszkach, pigułkach i rozpuszcz.; zewn. jako za-
żypka, w roztworze 1—5⁰/₀ do zmywań, przestrzykiwań, płu-
kań, wziewań, także do opatr. ran jako Boroglycerin (92 cz.
Glyceryny i 92 cz. a. bor.). borliut, wata borowa (10—20⁰/₀).
borphenolint; do maści i czopków (20—25⁰/₀). 10'0=3 kr.

— **borosalicylicum** zewn. jak ac. salicyl. 1'0=5 kr.

— **camphoricum** s. camphoratum 0'5—1'0 *p. d.* k. r. d. aż
do 6'0 *p. die* w roztworze alkoholowo wodnym lub w opłatkach
przeciwko potom suchotników. 1'0=8 kr.

— ***carbolicum crystalisatum** (Ac. phenyli-
cum, Phenolum) 0'01—0'10! *p. d.* k. r. d. aż do 0'50! *p.*
die w pigułkach, roztworach alkoh. i emulsji;
zewn. jako środek żrący (5—30⁰/₀); jako antysep.
do lecz. ran w roztworach wodnych, alkoh., oli-
wie z collod. (1'0:10'0 Coll.); do zmywań, penzlo-
wań, wcierań, zastrzykiwań w 0'10—15⁰/₀; do li-

nim. i maści w stos. 1:5 aż do 50 oliwy, glyc., linim. calcis; jako Carbolspray (2—15%) do wstrzykiwań podskórnych (0.10—0.20:10.0 Aqu.) do mięsaszowych (1:5 Aqu.). 10.0=3 kr.

Acid. carb. erudum tylko do desinfekcyi w roztworze (1:20) albo jako proszek z innemi ciałami. 100=10 kr.

— ***liquefactum** (10:1 Aqu.) jako środek żrący, jak powyżej. 10.0=3 kr.

— **chloronitrosum** (Aqu. regia) z Acid. nitr. wewnątrzno 1.0—2.0 : 100 Aquae w ciągu doby wyżyć 10.0=3 kr.

— ***chromicum** jako środek żrący, czysty albo rozcieńczony (1 : 20—50 Aq.). zewn. do penzlowania *aa* z wodą w błonicy: przeciw poceniu się nóg 5 : 100 — zakraplanie w otitis media chronica. 1.0=4 kr.

— **chrysophanicum** zob. Chrysarobinum.

— **cinnamyllicum** (kwas cynamonowy) białozółte kryształki słabo w wodzie, lepiej w alkoholu rozpuszcz.; używany w rozczyznach 1 : 10—20 do podsk. wstrz. w leczeniu miejscowej gruźlicy (Landerer). 1.0=20 kr.

— ***citricum** 0.3—1.0 p. d. k. r. d. w proszku saturat. mieszaninie burzacej (2.0—2.5 kw. odpowiada jednej cytrynie). zewn. do penzl. (1 : 10 Aqu.); do zmywań, płukanek (1—2%). 10.0=10 kr. Potio Riveri.

— **formicium** jako rubefac. i żrący; (1—10%) rozczyynie wodn. lub alkoh. do kąpiel parowych 1.0=2 kr.

— **gallicum** 0.5—0.6 p. d. k. r. d. w prosz., pigułkach, solut.; zewn. jako płukanie do ust (1.5%) , woda do ocz (0.5—2%) injeke. (1%), penzlow. (1 : 6 glicer.). 10.0=12 kr.

— **gymnemicum** posiada własności znoszenia pocucia smaku gorzkiego i słodkiego używa się w 12% rozczyynie do płukania ust przed zażyciem gorzkiego lekarstwa.

— **hydrobromicum** wew. 20—40 kropli : 100 Aquae używ. zamiast Bromkalium zewnętrznie do przyżegań. 1.0=1 kr.

— ***hydrochloric.** (Acid. muriat.) **concentr.** pur. (24%) zewn. jako żrący; 1%—3% jako płukanka; do penzl. (1—3 : 25—30 syropu lub miodu); do zmywań i okładów (1—2%); do kąpeli 60.0—120.0 na kąpiel. 10.0=2 kr.

— ***dilutum** (12%) 10—30 kropli p. d. k. r. d. aż do 5.0—16.0 p. die w rozcieńczeniu 1—2% jako napój lub w mixturach 10.0=2 kr.

— **hydrochloric erudum** (33%) 10.0=5 kr.

— **hydrocyanicum** (kwas pruski wodnisty, zaw. 2% woln. kw. sinowodr.) $\frac{1}{5}$ —1 kropli czyli 0.01—0.05 p. d. k. r. d. aż do 0.20 p. d. kroplami; zewn. do penzl. (0.25—0.50 : 5.0 Aqu.), jako woda do ocz (0.05—0.25 : 5.0 Aquae), do maści (0.5 : 5.0). 0.1=1 kr.

— **hydrofluoricum** ($\frac{1}{2}$ %) 3 razy dnia 10—30 kropli w bardzo znacznem rozcieńczeniu; do wziewań i opatr. (0.5—1.0 : 500) 10.0=20 kr.

— **hydrojodicum** 0.50—2.0 p. d. k. r. d. rozcieńcz. wodą.

— **hyperosmicum** (Acid perosmicum, osmiecium) 0.001 p. d. k. r. d. w rozcieńczeniu wodnem lub w pig. (0.015! p. d. a

0.05! *p. die* w padacze); podsk. zastrzyk. raz dnia $\frac{1}{3}$ —1 strzyk. Prav. 1% rozczyń w nowotworach, wolu, nerwobólach. 0.1 = 50 kr.

Acidum jodicum 0.10—0.30 *p. d. k. r. d.* aż do 1.20! *p. d.* wrocieńczeniu lub w pigułk., do tamowania krwotoków 5% zewn. w maściach 5%—10% albo podskórnice (1:5—10 Aqu.). 1.0 = 15 kr.

— **kreosotinicum** (Antipyretic) jak acid. salicyl. 1.0 = 8 kr.

— ***lacticum** 5—20 kropli = 0.3—1.50 *p. d. k. r. d.* w roztworze wodnym (1:200 Aqu.) w pastylkach aż do 10.0 *p. die*; zewn. do wziew. (15—20 kropli: 15—30 Aqu.), jako płukanka do ust (1:100—150 Aqu.); do penzlowań (1:5—10 Aqu.); do zmywań raz (1—2%); czysty albo 60—80% do przyżegania wrzodów grzlicznych. 1.0 = 3 kr.

— ***nitricum conc. pur.** (około 48% czyst. kw.), wewn. 0.20—1.0 w piguł. (w chor. wątroby, nephritis); zew. jako środek żrący. 10.0 = 3 kr. — ***A. nitr. dilutum purum.** około 21% kw. w dawkach o połowę mniejszych jak acid. nitric. pur. 10.0 = 2 kr. — ***nitriconitrosus** (fumans) czysty lub t. zw. Acid. nitric. solidifactum. 10.0 = 5 kr.

— **chloronitrosus, Aqua regia** (składa się A. nitric. 1.0, A. hydrochloric. 2.0) wewn. 1.0—2.0:150.0—200.0 Aqu. łyżkami; zewn. do kąpieli (30.0—50.0). 10.0 = 3 kr.

— **oleinicum** używ. do rob. plastrów (Dietricha). 10.0 = 5 kr.

— **oxalicum** 0.5—0.3 *p. d. k. r. d.* w proszku lub w 1% roztworze; jako płukanie do ust (1%). 10.0 = 4 kr.

— ***phosphoricum** (16% czysty kwas fosf.), 10—30 kropli 0.5—1.5 *p. d. k. r. d.* aż do 10.0! *p. die*; jako napój ($\frac{1}{2}$ —1%), w mixturze (2.0—10.0:100.0), w pigułkach; zewn. w roztw. 1—4% jako płukanie do zmywania ran. 10.0 = 6 kr. — **A. phos. siccum (glaciale)** 0.1—0.3 *p. d. k. r. d.* w pigułkach; łagodny środek żrący. 1.0 = 1 kr.

— **piconitricum** (picricum, carbogoticum); 0.10—0.25—0.50 *p. d. k. r. d.* do 1.50! *p. d.* w pigułk. lub w rozpuszcz. w trichinosis); zewn. jak kw. karbol. 10.0 = 10 kr.

— ***pyrogallicum, Pyrogallolum** (kwas pyrogallusowy) zewn. w alkoh. (5—30:100) lub w maściach 1—10:20 wazeliny lub lanoliny. 1.0 = 4 kr.

— ***salicylicum** (antisept. i antipyret.) 0.15—1.0 *p. d.* co 1—3 godzin aż do 2.0—8.0! *p. die* w proszku, pigułk., roztwor., mixt. lub emulsji; zewn. jako zasypka czysty lub z amyl. talcum, carbo; jako proszek do zębów lub tabaka (0.10—1.0:10—100 carbo., sacch., acid. tannic. etc.); do insufl. do pharynx. (1:5—50), w roztw. 1—3% do opatrunków, także jako wata i gaza salicylowa, jako woda salicyl. 2—3% z dodatkiem spir. vini, wody arom. gliceryny; do wziewań (1:500—1.000), do lewatyw (jako antipyr. 3.0—8.0), jako miejscowy antisept. 1.0—3.0 do przepłukiwań kiszek; mniej używany do zastrz. podsk. (1:600—1.000 Aqu.); do plastrów (1:2 empl. diachyl.), do maści i linim. do nacierań (w gościecu: acid. salicyl. 20.0, Spirit. vini 100.0, Ol. ricini 200.0, chloroformi 10.0, 1.0 = 2 kr. — **A. borosalicylicum** (skł. się Ac. bor. 1, Ac. salic. 2, Aqu. 5, Splr. 10 odparow.

- do suchości). — Pulv. salic. c. Talco (P. c. pudores pedum Ac. salic. 3, Amyl 10, Talei 87). 1.0=5 kr.
- Acidum sclerotinicum** 0.15—0.25—0.30 *p. d.* k. r. d.; podsk. (1:10 Aqu.) 0.01—0.06! *p. d.* aż do 0.25! *p. die* 0.10=6 kr.
- **silicicum** (hydrat) 0.06—0.10 *p. d.* 2 razy dnia jako trochisci, pigułki, proszki lub w rozpuszczeniu. 1.0=2 kr.
- **sozolicum** zob. Aseptol.
- **succinicum** (bursztynowy) 0.3—1.0 *p. d.* k. r. d. w pig., proszkach, roztworze wodn. lub alkoh.; wewn. jako płukanie (1:10—50) do penzl. (1:5—10 miodu lub glyc.). 1.0=2 kr.
- **sulfoichtyolicum** zob. Ichtyol.
- **sulfuricum anglicanum** (crudum; zawiera 75% kw.) 100.0=4 kr. — ***Acid. sulfuric. conc. purum** (96%) 10.0=3 kr. i **Acid. sulfuric. crud.** wszystkie 3 tylko zewn. jako środki żrące lub z proszkiem roślinnym (1:7—8) jako pasty;
- ***sulfuric. dilutum** (zaw. 100 cz. Ac. sulf. conc.: 476 Aqu.) 0.25—1.5 *p. d.* k. r. d. w pig. lub kroplami (5—30 kr. *p. d.*) z syropem, wodą ośłodzoną, jako napój (2.0—4.0:500 Aqu.), zewnątrz. jako płukanka do ust i gardła (1—4%), do penzl. 1.0—3.0:25.0) i zmywań. 10.0=1 kr.
- **sulfurosus liquid.** (Aqua sulfurosa) 5—10 kropli *p. d.* k. r. d.; do penzl., płukań (5 kropli:100 Aqu.). 100=20 kr.
- ***tannicum** czyli **Tanninum** kwas garbnikowy 0.03—0.05 *p. d.* k. r. d. aż do 2.0 *p. die* w proszkach, pigułkach lub rozpuszcz. (w wodzie z dodatkiem alkoh., gliceryny) jako mixt. w wod. arom.); zewn. czysty albo w stos. 1:1—10 z amyl., zinc. oxyd., borax., cukrem; do wdmuchiwań do nosa, krtani; do wziewań, zastrzykiwań (0.5—5.0:100—200 Aqu.), płukanka do ust i gardła (1—20:100), do kąpieli (10.0—50), do lewatyw (0.5—2.0:100), do maści (1:4—15), do czopków (0.20 tannini, 2.0 Cacao, 0.20 ceræ fl.). 1.0=2 kr. **Acid. tannic. boratum** (ac. tann. 1:3 Ac. boric.) jako zasypka. — **Baccila tannica** (z taniny, tragacanth, gliceryny, żelatyny). **Collodium tannic.** (1:10 coll.). — **Glycerinum tannic.** 1:4—10 Glyc.). — **Sapo tannini** (sap 15, tannini 1).
- ***tartaricum** (kwas winny) 0.2—1.0 *p. d.* k. r. d. aż do 10.0 *p. die* w proszkach, w pastylk.; w mixt. 4.0:30.0—50.0 syr., 200.0 Aqu. (co godzinę 1—2 łyżek; jako napój 5.0—10.0:50.0—100.0 syropu na litr wody) 10.0=4 kr.
- **thymicum** *p.* **Thymol.**
- **valerianicum** 5—20! kropli *p. d.* k. r. d. aż do 40! kropli *p. die* z alkoh. albo z klejkami płynami. 1.0=6 kr.
- Aconitum** (b. zmienne działanie!) 0.0003—0.001—0.004 *p. d.* 2—3 r. d. aż do 0.007! *p. d.* i 0.04! *p. die* w pigułk., rozp. w alkoh. (1:60) w pastylk.; zewn. w maściach (1—2:60), w alkoh. (1:25—50), do podskórnych wstrzyk. (0.10:10.0 Aqu. z dod. kilku kropli kw. soln. z tego 5—20 przedziałek strzyk. Pravaza = 0.001—0.004 *p. d.* w gościecu, w nerwobólach). 0.01=2 kr.
- Aconiti tuber** 0.03—0.10 *p. d.* 2—3 r. d. aż do 0.5! *p. die* w proszkach, pigułkach. 10.0=2 kr.

***Aconit. Extract.** 0·005—0·01 *p. d.* 2—4 r. d. aż do 0·03! *p. d.* i 0·12! *p. die* w pig. i roztw. alkoh.; zewn. w rozpsz. (1:20—50), w maściach (1:5—10), 1·0=14 kr. — ***Aconit Tinct.** 2—10 kropli (0·1—0·5!) *p. d.* k. r. d. aż do 1·5! *p. die*; zewn. często do nacierai. 10·0=7 kr.

Acorus zob. **Calami Rhizoma.**

Adeps benzoatus zob. **Axungia.**

— **suillus** zob. **Axungia.**

Adonis vernalis **Hb.** Inf. 4·0—8·0:150·0—200·0 colat., co 2—3 godziny łyżkę. 10·0=4 kr.

Adonidin (glykozyd) wewn. 0·01—0·5. 2—3 r. d.

Aescorcin w 10⁰/₀—20⁰/₀ wodnym roztworze zakroplony do oka, w celu rozpoznawania zmian na rogówce.

***Aether (sulfuricus)** 5—10 kropli (0·1—0·5) *p. d.* k. r. d. aż do 8·0 *p. die* czysty lub z innemi środkami; w kaps. (Perle-d'Ether zaw. 5 kropli); zewn. do anestezji ogóln. (Aeth. 9+1 Chlcrf.) i do miejsc. (czysty), do wcierań (czysty lub w maściach), do lewatyw (1·0—1·5:100 Aqu.) do penzl., do wstrz. podsk. w zapadzie ($\frac{1}{2}$ —1 strzyk.) 10·0=3 kr. **Prav. Ae. crudus** tylko zewn.

— ***aceticus** jak sulf. 10·0=7 kr.

— **bromatus** zob. **Aethylum bromat.**

— **camphoratus** (Camph. 1·0 Spir. Aeth. 9) do zastrz. podsk.

— **chloratus** (Aethylchlorid) środek znieczulający, znachodzi się w handlu w postaci zagęszczonej w szklanych rurkach, łatwo przy ogrzaniu ręką zamieniający się w parę, która znieczula błonę śluz; jedna rurka=60 kr.

— **methylicus** do miejscow. i ogóln. anestezji.

— **petrolei** zob. **petrol.**

— **valerianicus** 10—20 kropli *p. d.* k. r. d. do 5·0 *p. die* w kropl. albo kapsułk.

Aethoxycoffeinum wewn. 0·25 (z cocainum) w nerwobólach, migrenie. 1·0=60 kr.

Aethylenum bromatum 3—10 kropli (Spiritus āā w mleku) *p. d.* r. d. postępowo aż do 50 kropli (w padaczkę według Donatha. 1·0=5 kr. **chloratum**, Chlorethyl, (liqu. hollandic.) 5—20 kropli *p. d.* 3—4 r. d. z eterem, alkoh., olejotłuszczami; zewn. jako miejsc. anest. (czysty albo z eterem). 1·0=5 kr.

Aethylidenum bichloratum jak chloroform do narkozy przy oper. zębów 1·0=15 kr.

Aethylum bromatum jako sedat. 5—10 kropli (0·3—1·0 *p. d.* 2—4 r. d. na cukrze albo w kapsułkach, do wziewań 0·20—0·50. 1·0=6 kr.

— **jodatum** wewn. 5—10 kropli *p. d.* w gościeu, kile.

Agaricus albus (Boletus Laricis, fungus Laricis) jako słabe drast. po 1·0—2·0 *p. d.* k. r. d., jako przeciwpotny po 0·2—0·5 *p. d.* 2—3 r. d. w proszk. pigułk. 10·0=8 kr. — **Agaricinum** (kwas) jako przeciwpotny 0·005—0·01 *p. d.* k. r. d. aż do 0·5! *p. d.* w pig. (zwykle razem w pulv. Doveri, aby zapobiedz rozwojn.). 0·1=3 kr.

— **chirurgorum** do tamowania krwi.

Agathinum (Salicyl-Methylphenyl-hydrazon) antirheum. i an-

tineuralg. 0.25—0.50, 3 r. d. białe kryształki nie rozpuszcz. we wodzie. 0.1—5 ct.

Airol połączenie bismutu z garbnikiem i jodem, proszek szarozielony w zetknięciu z wydzieliną ran, wydziela jod i zmienia barwę na czerwoną. Używany na owrzodzenia wprost w emulsyi 10%, (szerzączka) w maści 10%—20%. 1.0 = 10 kr.

Aletris farinosae Rad. (tonic. amar.) decoct. 15.0—30.0:100—150.0 Coll., także w proszkach 0.6 p. d. k. r. d. — **Tinct. a. f.** 4.0—8.0 p. d. k. r. d. — **Ext. fluid. a. f.** 0.5—2.0 p. d. k. r. d.

***Aloë** 0.02—0.03 p. d. k. r. d. jak amar. lub stomachic.; 0.05—0.3 jako rozwalniający; a 0.3—0.6 aż do 1.0! p. d. jako drasticum tylko w pigułkach; zewn. tylko w elysm. (0.5—0.25) 10.0 = 3 kr.

— **hepatica** w trochę większych dawkach. ***Extr. aloës** jak poprz. po 0.02—0.03 p. d. k. r. d. jako stom., 0.05—0.2 jako rozwaln., a po 0.5 jako drastic. 10.0 = 11 kr. — **Massa pilular Rufi** (zł. Aloë 60, Myrrha 30, Crocus 10) w podwójnych dawkach jak Aloë. — ***Pilul. laxantes** (Aloë 40, Jalap. 60, Saponis med. 20, Anis vulg. fruct. 10) jedna pigułka waży 0.20. 10.0 = 22 kr. — **Tinct. Aloë** jako tonic. i dig. 5—30 kropli p. d. k. r. d. 10.0 = 3 kr. — **Tinct. Aloë comp.** $\frac{1}{2}$ —1 łyżki. 10.0 = 4 kr.

Aloënum v. Aloënum 0.1—0.2 p. d. jako purg., 0.2—0.5 p. d. jako drastic. w pig. także podskórnice (1:5—8). 1.0 = 5 kr.

***Altheae sciss. Fol.** 100.0 = 10 kr. i ***Rad.** 100.0 = 18 kr. jako macer., inf., decoct., 5.0—10:100—300 Coll. albo jako species; Pulv. rad. al. jak consp. i jako masa do pig.; zewn. do katapl. i okład., inf. do płukań i lewatyw; do przestrzykiw. (3.0—5.0:100 Col. — ***Species alth.** (Fol. alth. 10, Rad alth., 5, Liquir 2.5, Flor. malv. 1). 100.0 = 15 kr. — ***Species emolientes** (Fol. alth., malv. i herb. Meliot āā 1, Sem. lini 2). 100.0 = 18 kr. — ***Species pro cataplasma.** składu jak poprzedz. grubo proszkowany. 100.0 = 25 kr. — ***Species pectoral.** (Fol. alth. 4, Rad. liquir. rad. alth., Hord. perl. fruct. Cerat — caric. āā 10, Folior. Verb., F. Malv., Rhoead. fruct. anis. stell. āā 1) jako decoct. z wodą lub mlekiem. 100.0 = 17 kr. — ***Syrupus altheae** łyżeczkami, także jako corrigens. 10.0 = 3 kr.

— ***Alumen** 0.05—1.0 p. d. k. r. d. po 5.0 p. die w proszk., pig. rozpuszcz. w żentycy lub mleku (1:200 mleka) jako Serum lactis aluminatum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ litra dziennie; zewn. jako proszek do wdmuch. do nosa, gardła, oczu (czysty albo 1:20—25 cukru), jako woda do ust, gardła, oczu, (0.5—10:100—200) do wzięwań, lewatyw (20%), zmywań (5%) do kąpieli (200.0) w maściach (0.1—2.0:10—25). 100 = 1 kr. — **Al. plumosum** s. **Talcum praep.** 100.0 = 10 kr. — ***A. ustum** (Al. calcinatum) działa silniej od poprz. ma to samo zastos. zewn. 10.0 = 4 kr.

Alumina hydrata (Argilla pura s. hydrata) wewn. jako antacidum, w biegunkach po 0.20—1.0.

***Aluminii acetici liquor** (Aluminium aceticum, argilla acetica) 5—20 kropli (0.5—2.0) p. d. k. r. d. w rozp.

z syropem; zewn. czysty albo rozcieńcz. do okładów (1:5—200) opatr., zmywań (1:5—10), przestrzykiwań (0:5—1:100). 100:0=18 kr.

Aluminium acetico-tartaric. tylko zewn. jako adstring. i antysep. czysty albo w rozpuszcz. także jako płukania (1—2%), penzłow. (5—50%). 10:0=18 kr.

— **boroformicum** dawki i sposób zastosowania jak poprzedni.

— **sulfuricum** w zastos. jak Alumen. 10:0=2 kr.

Alumol. (5% alumin. i 15% siarki) adstring. i antisept. tylko zewn. 0:5—2% do zmywania ran, przestrzykiwania. w maści 3—6% lub jako zasypka (na *ulcus molle*) w rzerzączce (1%—2%). 1:0=6 kr.

Ambra grisea (nigra) 0:06—1:0 w proszk., pigułek., pastylk. 0:01=15 kr.

***Ammonia** (pura liquida), Liquor ammonii caustici, Amoniak; około 10% bezwodny amoniak, wewn. 3—20 kropli (0:1—0:5) *p. d. k. r. d.* znacznie rozcieńczony płynami, kleikami; zewn. do wacania, do injek. (5—15:60—100) do zmywań i nacierania (2—6%); do wziewań, lewat. (5—10 kropli) *p. d.*, do maści i linim. (1:5—10), podskórn. (1:5—10), a do żył (1:2—20). 10:0=2 kr. — ***Liquor ammoniae anisatus** (ol. anis. 1, alkoh. (90%) 20, amm. 5) 3—20 kropli *p. d. k. r. d.* do 5:0 *p. die*; zewn. do wacania, do wziewań. 10:0=5 kr. Do wcierania używa się ***Linimentum ammoniatum s. lin. volatile** (ol. oliv. 4, am. 1). 10:0=3 kr. **Linim. ammoniato-camphoratum** — ***Linim. saponato-camphoratum** (Balsam Opodeldoc.). 10:0=4 kr. **Linim. saponato-camphorat. liquid.** — ***Ammoniacum** (Gummi resina A., A. depuratum) 0:3—1:0 *p. d. k. r. d.* do 5:0 *p. die* w pigułkach albo zawies.; zewnętr. do plastrów. 10:0=7 kr.

***Ammonium acetic. solut.**, Liquor ammon. acetic. (jest 15% Amm. acetic.) 2:0—10:0 *p. d. k. r. d.* czysty albo w mixt. (10:0—50:0:100) z środkiem diaphor.; zewn. do płukania i nacierania. 10:0=5 kr.

— **benzoicum** zob. **Natrium benz.** 1:0=5 kr.

— ***bromatum** zob. **kal. bromatum.** 10:0=19 kr.

— ***carbonicum** (sal. alkali volatile, Ammoniumcarbonat) 0:2—0:6 *p. d. k. r. d.* aż do 2:0 *p. die* w proszk. rozpuszcz., mixt., satur.; zewn. do wacania, do zmywań, maści i liniment. 1:3—10. 10=3 kr. — **Aqua am. bicarb.** (0:2:200). **Ammonium carbonic. pyrooleosum** (Sal. volatile cornu cervi). 10:0=7 kr. — **Liquor am. bicarb. pyrooleos.** (Spir. cornu cervi) 15—30 kropli *p. d. k. r. d.* 10:0=3 kr.

***Ammo. chlorat.** (sal. amm. depur. salmiak) 0:2—1:0 *p. d. k. r. d.* do 10:0 *p. die* w proszk., pig., powid., rozczyn., mixt.; zewn. jako zasypka; do płukania (1—3%), do zmywań, kąpieli (50:0—100:0), penzłow. (3—5:50) i wziewań; także do maści i linim. (1:5—10). 10:0=3 kr. Są także pastylki salmiak. (Tablettes pectorales). — **Am. chlorat. ferrat.** (Ferrum

- ammoniatum) 0·2—1·0 *p. d. k. r. d.* w rozp. lub mixt. (2—5%). 10·0 = 5 kr.
- Amm. jodatum** (zaw. 63% jodu) 0·10—0·6 *p. d. k. r. d.*; do maści (1:20—50). 1·0 = 7 kr.
- **embelicum** wewn. 0·30—0·50 z syropem l. miodem (dzieciom 0·18) przeciwko tasiemcowi. 0·1 = 50 kr.
- **phosphoricum** 0·5—4·0 *p. d. k. r. d.* aż do 6·0 *p. die* w rozpuszcz., 1·0 = 2 kr.
- **picrinicum** (pieronitricum) 0·05—0·10 *p. d. k. r. d.* aż do 0·4 *p. die.* polecony w zimnicy. Łatwo wybuchający!
- **sulfoichthyolicum** zob. **ichthyol.**
- **valerianicum** 0·1—0·3 *p. d. k. r. d.* aż do 1·0—4·0 *p. die* w pig., mixt., 1·0 = 10 kr.
- *Amygdalae amarae** (Semen amygd. amar.) wewn. w emulzyi ze słodk. migd., zewn. w proszku i w pastach. 10·0 = 3. kr. — ***dulces** 1:25 do emulsyi 10·0 = 2 kr. — ***Emulsio amygdalin.** (Amygd. dulc. decortic. 25, Sach. 15, Aqu. 250). — ***Ol. amygd.** łyżeczkami czysty, albo z wodą jako emulsya fałsz., wreszcie jako mixt. oleosa 10—20:200 Aqu.; zewn. jak ol. oliv. 10·0 = 6 kr. — **Ol. amygd. amar. aether.** $\frac{1}{4}$ —1 kropli (0·01—0·05) rozp. w alkoh. albo eterze, także na cukrze, albo w emuls., ext. czysty albo w miesz. do wcierań, maści (0·1:10·0). 1·0 = 8 kr. — ***Sy-rup. amygdalinus.** 10·0 = 4 kr.
- Amygdophenin** (Aethylamygdophenin) wewn. 1·0 *p. d. k. r. d.* aż do 6·0 *p. die* jako antineuralg., antirheum.
- Amylenum hydratum** (Amylenhydrat) bezbarwna ciecz (Hypnotic. i sedativ.) 3·0—5·0 *p. d.* rozp. w wodzie, także w lewatywie 4·0 *p. d.* z mucilago gumm. arab. 1·0 = 6 kr.
- *Amylium nitrosum** ((Amylnitrit.) 1—5! kropli *p. d.* do wzięcia; antidot. w asfiksyi chloroform. i zatruciu kokainą podsk. (1:10 Spirit.) 1·0 = 3 kr.
- *Amylum** (Tritici) jako constit. do proszku, do mucil., consp.; zewn. jako zasyпка; także do lew. 1—2 łyżeczki zagotowane z 200·0 aquae). 100·5 = 15 kr.
- Amylum Marantae pulv.** (Arrow-root) (1—2 łyżeczki zagot. z filiżanką rosółu, wody, mleka). 100·0 = 30 kr.
- Analgen** (antipiret, antineuralg.) 0·50—1·0 *p. d.*, skuteczny jako antineuralg. 1·0 = 25 kr.
- *Angelicae** rad. pulv. 0·5—2·0 *p. d. k. r. d.*; In. 5—8% 10·0 = 6 kr. — **Extr. angelic.** 0·20—1·0 *p. d. k. r. d.* 1·0 = 4 kr. — **Spirit. angel. composit.** 10—20 kropli *p. d. k. r. d.* 10·0 = 5 kr.
- Angusturae cortex.** 0·2—1·0 *p. d. k. r. d.* w proszku, lub dect. (5·0—15·0:100—200) 10·0 = 2 kr.
- Anilinum sulfuric.** 0·05—0·12 *p. d.* 1—3 *r. d.* w proszku pig. w rozp. (0·05—0·20:150); ext. w maściach (1:20—30). 1·0 = 2 kr.
- *Anisi fructus** (Semen anisi vulg.) 0·3—1·3 w proszku, inf. (3—5%) 10·0 = 6 kr. — **Ol. anisi. vulg.** 1—3 kropli *k. r. d.* w elaeosach. 10 = 4 kr. — ***Spiri. anis. vulg.** $\frac{1}{2}$ —2 łyżeczek *k. r. d.* 10·0 = 3 kr.

***Anisi stellati fructus** jak poprzedni.

Anthrarobinum zob. **Chysarobinum** 1·0 = 6 kr.

Antidotum arsenici = Liquor ferri sulfuric. oxyd. 100, Aquae 200, do tego przy ustaw. mieszaniu 15 Magn. ust. z 250·0 Aqu. winien być zawsze świeżo przygotowywany, podaje się łyżeczkami co $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ godz. dosis 1 złr. 32 ct.

***Antifebrinum** (Acetanilidum) 0·25—1·0! *p. d. k. r. d.* do 2·0! *p. die* jako antypyr., rheumat., neuralg. w proszk. pigułek, rozp.; zewn. jako antisept. 1·0 = 2 kr.

Antihydropinum zob. *Blattae orient.*

Antipyrinum (Dimethylphenylpyrazolon) 0·5—1·0—3·0 *p. d.* 3—4 r. *d.* aż do 8·0 *p. die* (dzieciom najw. 0·75 *p. d.* 3—4 r. *d.*) jako proszek lub mixt.; zewn. jako zasyпка, także do lewatyw; do wstrzykiwań do cewki $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ‰. 1·0 = 9 kr.

Antiseptol (Cinchoninum jodosulphuric.) zaw. 5‰ jodu, ma zastęp. jodoform, tylko zewn. w 10‰ roztworach. 1·0 = 15 kr.

Antispasmin (Narceinnatrium — Natrium salicylicum) wewn. 0·05—0·10 *p. d. k. r. d.* w roztworach, w krztuscu. 0·10 = 15 kr.

Apiolum cryst. album. 0·25—1·0! *p. d. k. r. d.* aż do 4·0 *p. die* w proszku lub syropie, polec. w zimnicy i dysmenorrhoe 0·1 = 4 kr.

Apocodeinum hydrochloricum 0·01—0·3 *p. d. k. r. d.* 0·08 *p. die* w pig. lub w roztworach. do zastrzykiwań $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki 2‰ roztworu, działa podobnie jak apomorph. 0·1 = 8 kr.

Apolysinum 0·50—1·0 *p. d. k. r. d.* w proszku, jako antipir. antineuralg. 0·10 = 2 kr.

***Apomorphinum** hydrochl., jako expec. 0·001—0·005 *p. d.* w proszku, pigułek. mixt.; jako emetic. 0·01! *p. d.* aż do 0·05! *p. die*; także podskórnice jako emetic. w dawce 0·001—0·01; dzieciom 4-tą część dawki lub 0·01—0·03 w lewatywie. 0·10 = 15 kr.

***Aqua amygdalar. amar. concentr.** zawiera na 1000 części 1 część bezwodn. kw. sinowodowego 0·5—1·5 (10—40 kropli) *p. d.* aż do 5·0! *p. die* czysta kroplami albo w mixt. 10·0 = 6 kr.

— ***amygd. am. diluta.** (Aq. Cerasorum) (na 1·000 części: 0·05 bezw. kw. sinowdow.) łyżeczkami czysta albo w mixt. 10·0 = 1 kr.

— **aromat. spirit.** do nacierania. 100·0 = 16 kr.

— ***Goulardi** zob. plumbi acet.

— ***calcis** (Aqua calcariae) z. calcium oxydat. 100·0 = 3 kr.

— ***carbolisata** (zaw. 33 części kw. karbolowego i 967 cz. wody) do opatrunków i desinfekeyi. 100·0 = 3 kr.

— ***carminativa** (Flor. chamom. roman 100, cort. citr., fol. menth. crisp., fruct. carvi., coriandr., foeniculi āā 30·0:4000 Aqu.) łyżeczkami. 100·0 = 12 kr.

— ***chlori** (Aqua chlorata) zob. Chlor. solut. 10·0 = 3 kr.

— ***cinnamomi** zob. cinm. cortex, 100 = 11 kr.

Aqua cresolica do desinfekcyi.

- ***foeniculi** zob. foen. fruct. 100·0 = 8 kr.
- **hydrosulfurata** przy zatruciu metalami 150·0—500 0 czy-
sta albo rozc. wodą, łyżkami. 10·0 = 3 kr.
- **kreosoti** (Aq. Binelli) wewn. łyżeczkami, zewn. do prze-
plukiwań, inhalacyi.
- ***laurocerasi** (10·0 zaw. 0·6 bezwodn. kw. sino-
wodorow.) używ. jak Aqu. amygd. amar. concentr.
10·0 = 4 kr.
- ***melissae** jako corrig. do mixt. 100·0 = 12 kr.
- **menthae crisp.** tak samo. 100·0 = 20 kr.
- ***menthae piperitae** tak samo. 100·0 = 12 kr.
- **phagedaenica** zob. Hydragr. 100·0 = 20 kr.
- **piceis** zob. pix liquida. 100·0 = 10 kr.
- ***plumbi** zob. plumb. acet.
- ***plumbi spirit.** (a. goulardi) zob. plumb. acet.
- ***rosae** zob. rosae flor. 100·0 = 10 kr.
- ***rubi idaei** zob. Fruct. Rub. id. 100·0 = 9 kr.

***Araroba** zob. Chryzarobin. 1·0 = 9 kr.

Arbutinum (glykozyd z fol. uvae ursi) 0·5—1·0! *p. d.* aż do
4·0! *p. die* w proszku lub w mixt., stos. w zap. niez. pę-
cherza i w chorobach nerkowych. 1·0 = 30 kr.

Arecae nuces pulv. pod. przeciw tasiemcowi w dawce
4·0—6·0 w proszku. 10 0 = 8 kr.

Argentamin płyn bezbarwny, oddział. alkal., w rzerzączce
do przestrzyk. 1:5000. 1·0 = 8 kr.

Argentum chloratum (muriaticum) 0·01—0·10 *p. d.* 2—4
r. d. w proszku, pig. 0·1 = 3 kr.

— **foliatum** używ. do powlekania pigulek.

— **jodatum** 0·005 *p. d.* jak Arg. chlorat. 1·0 = 50 kr.

— ***nitricum crystallis.** 1·0 = 9 kr. i ***nitricum
fusum** 1·0 = 11 kr. wewn. po 0·005—0·03! *p. d.* 2—4 r. d.
aż do 0·20! *p. die* w pig. past. rozcz.; w subst. w zgęszcz.
lub rozpuszcz. (1:1—2) jako środek żrący; tak-
że jako crayon; w rozcieńcz. do przestrzykiwań
(0·10—1·0:100 Aqu.), do wzięwań (0·01—0·3:100), do
penzłow. (1·0—10·0:100), do ocz. (0·01—1·0:100), w maści
(0·20—0·80:10·0) także w proszku (0·1—0·5:50 cukru
lub alunu) do wdmuchiwań do gardła lub krtani.

Arg. nitric. c. calio nitrico (Lapis infernalis mitigatus,
zaw. 1 arg. n. i 2 k. nit.) jako śr. żrący łagodn. 1·0 = 5 kr.

Argila alba s. Bolus a. jako constit. do proszk., pig., także
zewn. jako zasypka. 100·0 = 12 kr.

Aristol (Dithymoldijodid) różowobrunatny proszek rozp. w oli-
wie i paraf., stos. w chorobach skóry i nosa (lupus) w 10%
maści lanolin. 1·0 = 30 kr.

***Arnicae flores sciss.** 10·0 = 2 kr. i ***Radix** 10·0 = 3 kr.
wewn. 0·3—1·0 *p. d.* k. r. d. w proszku, pig., inf. (2·0 10·0
:100·0); zewn. jako tabaka, także do okład. i lewat. (inf. 5·0—
27·0:100). **Extr. flor. arn.** 0·2—0·5 *p. d.* 1·0 = 5 kr. **Extr.
rad. Arn.** 0·2—1·5 *p. d.* 1·0 = 5 kr. — ***Tinct. Arnicae**
0·2—0·5 *p. d.*; zewn. do wcierań, okład. i t. d. 10·0 = 4 kr.

Artemisiae Hb. pod. jak Hb. absinthi. **Rad.** Art. w proszk 0.1—2.0 p. d. albo w inf. 2—5%; 100 = 12 kr. — **Extr. Art** 0.10—0.5 p. d. 1.0 = 8 kr.

***Asa foetida** (Gummi resina dep.) wewn. 0.3—0.5—1.0 k. r. d. w pig. lub zawiesinie 2.0—6.0:100, także w lewat. 3.0—10.0 (w emuls. z żółtkiem). 10.0 = 9 kr. — **Tinct. as. foet.** 20—60 kropli p. d. czyst. albo w mixt 10.0 = 5 kr.

Asaprol proszek rozp. w wodzie i wysk. (antipyr. i antirheum) 0.5—1.0 p. d. k. r. d.; 4.0 p. die. 1.0 = 15 kr.

Aseptolum (Acid. sozodolicum) gęsta ciecz działa antysp. 3—5% rozc. wodnym; rozp. w oliwie, glyc., lub alkoh. nie działa. Stosowany zewnętrznie zamiast kw. karbolowego, nietrujący. 10.0 = 20 kr.

Asparaginum (diuretic.) 0.05—0.10! p. d. aż do 0.30 p. die w proszku, pig. 0.1 = 2 kr.

Atropinum purum nieuż.

— ***sulfuricum** 0.0002—0.001 p. d. aż do 0.003! p. die w pig., proszk. lub w rozp.; zewn. do oczów (0.10—0.5:100.0 Aqu.), podskórn. 0.0002—0.001 (2—10 przedziałek strzykawki Pravaza z rozc. 0.01—0.05:10 Aqu.) również razem z morf. (Atrop. sulf. 0.02, morph. mur. 0.4; Aqu. dest. 20.0), w maści i linim. 0.2—0.5:100. 0.01 = 2 kr.

— **valerianicum**, wewn. jak sulf. 0.01 = 4 kr.

Aurantii fructus cort. (flavedo cort. aurant.) 0.3—2.0 p. d. 2—4 r. d. w proszku. Inf. 5—12%, 10.0 = 6 kr. — **Extr. aurant.** 1.0 = 4 kr. **Aurant. folia** 1.0—4.0 p. d. inf. jak cort. 1.0 = 5 kr.; tak samo **flor. aurant.** — ***Aqu. flor. aurant.** (Aqua naphae) 10.0 = 4 kr. — ***Ol. flor. aurant.** 1.0 = 50 kr. — ***Ol. cort. aur.** 1.0 = 3 kr., — ***Ol. Bergamott.** 1.0 = 3 kr.; tak samo **Syrup cort. aur.** cocrig. do mixt. 10.0 = 3 kr.; tak samo **Syrup aur. flor.** ***Tinct. aur. cortic.** 20—60 kropli. 10.0 = 4 kr.

***Auro natrium chloratum** wewn. 0.003—0.03! p. d. 1—2 r. dz. aż do 0.05! p. die w pigulk., pastylk., proszkach lub w rozp. (in vitro nigro) dzieciom w kokluszu z 2% rozczyntu 5—8 kropli; jako woda do ocz (0.1—0.2:100), w maściach 0.2:5; 0.10 = 35 kr.

Aurum chloratum wewn. 0.002—0.01 w rozp.; zewn. jako środek żrący. 0.10 = 55 kr.

— **foliatum** do powlek. pig.

— **jodatum** stos. w kile.

— **monobromatum** wewn. 0.008—0.012 p. d.; dzieciom 0.003—0.006 p. d. stos. w padaczce. 0.01 = 6 kr.

— **oxydatum** 0.005—0.05 w proszk. i pig.

***Axungia porcina** (porci Adeps suillus) tłuszcz do maści. 100 = 20 kr.

***Axungia porci benzoata** 10.0 = 5 kr.

Balsamum canadense 10.0 = 10 kr.

— ***Copaivae** wewn. 0.5—2.0—3.0 t. j. od 10—40 i 60 kropli p. d. aż do 20.0! p. die w pig. a najczęściej w kapsułkach (capsulae gelatin.) razem z ext. cubeb., także w emulsyi

(15·0 z 7·5 Gummi mimos. i 100·0—150·0 Aqu.) zewn. do lewatyw (7·0—15·0), do nacierañ. 10·0=7 kr.

Balsamum Nucistae zewn. do nacierañ.

— ***peruvianum** wewn. 0·1—1·0 *p. d.* aż do 5·0 *p. die*, w pig., past., elect. lub emulsyi; zewn. czysty lub w maściach używ. do opatr. ran, do zastrzykiwań w grzłnicy (Landerer); rozp. w alkoh. jako płukanie, tinct. do zębów i t. d. jako antiscabiot. 10·0—15·0 na jedno wtarcie, wreszcie do celów kosm. 10·0=25 kr. — **Syrup bals. peruv.** czyli Syr. balsamicus — expect. i corrigens.

— ***tolutanum** stos. jak bals. peruv. 10·0=14 kr.

— **vitalis Hoffmani** (mixt. oleoso-balsamica) 5—20 kropli *p. d.*; do wachania, nacierañ, także do kosmet. 10·0=8 kr.

***Bardanae rad.** Det. (10·0—50·0:100—500 Col.). 10·0=2 kr. także **Extr. Bardanae** 0·5—1·0 *p. d.* 1·0=3 kr.

Baryum chloratum wewn. 0·02—0·1 *p. d.* aż do 0·50! *p. die* w pig.; zewn. 0·5—2·0:100. 10·0=3 kr.

***Belladonnae rad.** wewn. 0·01—0·07 *p. d.* do 0·3! *p. die* w proszk., pig., inf. (0·3—1·0:100), wziewań (0·5—1·0:100), przestrzykiwań 1—4‰, okładów (2—5‰) i maści (1—5:10). 1·0=1 kr. — **Extr. rad. Bellad.** 0·01—0·05 *p. p.* aż do 0·2! *p. d.* w proszk., pig. 1·0=11 kr.

— ***Fol. Belladon.** 0·05—0·2! *p. d.* aż do 0·6! *p. die* w proszk. pig.; inf. (0·5—1·5:100); jako cygareta do palenia, do miejsc. kąpiel.; do okładów, przestrzyk. do wziewań (0·5—1·0:100) lewatyw, jako woda do oczu (1·0—3·0:25). 1·0=3 kr. — ***Extr. fol. Bellad.** 0·01—0·05, aż do 0·2! *p. die* 1·0=8 kr. — ***Tinct. fol. Bellad.** wewn. 1—10 kropli, 1·0! *p. d.* aż do 4·0! *p. die*. 10·0=6 kr.

Benzinum Petrolei (Benzin) wewn. 0·2—1·0 (5—25 kropli) mixt. i kaps. 2—3 r. dnia, do nacierañ (1:2—tłuszczu); do lewatyw i wziewań. 100·0=10 kr.

***Benzoë, Resina Benzoë** wewn. 0·2—1·0 *p. d.* w pig., emulzyi do proszku do zębów, do płukanek (2—4‰), do wody do oczu (1—2‰) do środka kosm. 10·0=10 kr. — **Tinct. Benz.** do wody do zmywań, do okład. 10·0=4 kr.

Benzol stos. jak Benzin 1·0! *p. d.* aż do 6·0! *p. die* w emulzyi przeciw czerwiom; zewn. w maści 2—3:200 w scabies. 10·0=5 kr.

Benzonaphthol (Acid. benz. i naphthol.) proszek podaw. wewn. 0·5 *p. d.* aż do 5·0 *p. die* (dzieciom 0·2 *p. d.* aż do 2·0 *p. die*), jako antysept. kiszkowy 1·0=4 kr.

Benzolguajacol czyli **Benzosol** (Acid. benz. i guajacol.) proszek używany w grzłnicy w miejsce guajacolu 0·25—1·75 *p. d.* 2—3 razy dz. 1·0=20 kr.

Berberidis aquifolii rad. i tinct. jako tonie. 15 kropli, aż do łyżeczki *p. d.* k. r. d. 1·0=3 kr.

Berberinum muriaricum i phosphoricum 0·03—0·05 *p. d.* 0·1=5 kr.

Betolum, (Naphthosololum—Naphthalolum) proszek bez smaku i zapachu, polecany przeciw gościowi, nieżyłowi

- pecherza, w chorobach kiszek z rozkładem treści jelit; 0·3—0·5 *p. d.* 2—4 razy dnia, aż do 2·0 *p. die* w proszku. 1·0 = 8 kr.
- Bismal** (Połączenie metylenu, kw. karbol. i bismutu) proszek rozpuszczalny w płynach alkalicznych, 0·10—0·30 k. r. d. w biegunkach, rozwolnieniach suchotników. 1·0 = 10 kr.
- Bismuthum benzoicum v. subbenzoicum** proszek używany jako zasyпка na wrzód miękki. 1·0 = 10 kr.
- **carbonicum** 1·0 = 5 kr. i **citricum** 1·0 = 8 kr. używa się jak B. subnitr.
- **ammoniato citricum** 0·2—0·5 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszku.
- **gallicum basicum** = Dermatol.
- **lacticum crystalisatum** 0·05—0·2 *p. d.* 2—4 razy dz. 1·0 = 12 kr.
- **B naphthalicum** czyli **Orphol**, brunatny proszek, nierozp. w wodzie 0·50 *p. d.* 1·0—3·0 *p. die* w biegunkach, w durze. 1·0 = 12 kr.
- **oxyjodatum v. subjodatum** 1·0—2·0 *p. die*; zewn. jako zasyпка i do maści. 1·0 = 8 kr.
- **salicylicum** 0·3—1·0 *p. d.* 2—4 razy dz. aż do 12·0 *p. die* w pig. i w proszk. 1·0 = 5kr. tak samo używa się **B. subsal.**
- ***subnitricum** czyli **Magist. bismuthi** 0·20—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. (dzieciom w rozwolnieniu 0·2—0·4 co 2—3 godz.) w proszk. i pig.; zewn. jako proszek do wdmuchiwań do gardła, nosa, krtani; do wstrzykiwań (w wiewiórze) (4—12‰); także do maści (3—10‰). 1·0 = 4 kr.
- **tannicum** 1·0 = 4 kr. jak subnitr.
- **tribromphenilicum** czyli **Xeroform**, żółty nierozp. proszek, 5·0—7·0 *p. die* w dawkach po 0·50, wewn. w cholerze; zewn. jako zasyпка do nosa, ucha, w chorobach skórnych; w rzeżączce (10‰—20‰ emulsya). 1·0 = 10 kr.
- **valerianicum** 0·03—0·15 *p. d.* w proszk. lub pig. 1·0 = 6 kr.
- Blatae orientales** 0·06—1·0 *p. d.* w proszk. (jako diaphoretic.) także w inf. lub decoct 5—10‰; 1·0 = 8 kr. — **Tinct. blatt.** 15—40 kropli *p. d.* 10·0 = 40 kr.
- *Bolus alba** zob. **Argilla alb.**
- Boral** = Aluminium borico tartaricum rozpuszczalny, kryształ. proszek, zewn. do penzlow., przepłukiwań 5‰—10‰, do wdmuchiwań, w maściach 10‰.
- *Borax** (veneta) czyli Natrium biboracicum, wewn. 0·5—2·0 *p. d.* k. r. dz. w proszku, rozp. w mixt., lub w linctus; zewn. do płukanek do ust i gardła (2—5‰), do penzlowań (1·0—5·0:25·0), do zmywań (10·0—20·0:100), przestrzykiwań (1·0—5·0:100·0), wziewań i maści (1:3—10). 10·0 = 3 kr.
- Bromalum hydratum** (Bromalhydrat) wewn. 0·05—0·10—0·50 *p. d.* k. r. dz. w pig. lub w rozp. 0·1 = 5 kr.
- Bromoformium** podaw. dzieciom w kokluszu po 2—6 kropli na łyżce z wodą, dorosłym 0·50 w kapsułkach w napadach astmy. 1·0 = 5 kr.
- Bromol** = Tribromphenol, proszek rozpuszcz. w alkoholu, eterze, olejach; zewn. w maściach (4·0:30·0); do penzlowań błonicy (1·0:25·0 Glycerini).
- Bromum** wewn. 0·005—0·02 *p. d.* aż do 0·1 *p. die* w wodzie

- lub alkoh. rozez., Aqua Bromi czyli bromata 0·25:25·0 wewn. 5–15 kropli; do penzl. w błonicy gardła 0·25–0·50:100 albo razem z kali brom. aa.; zewn. do okład., przestrz., wziew. (Bromi 1·0:500·0) do maści (1·0–2·0:50·0–100·0). 0·1 = 1 kr.
- Brucinum** wewn. 0·005–0·1! *p. d.* 2–3 r. dz. w pig. lub z rozez. alkohol. (1·0:25·0) kroplami (2–25). 0·01 = 1 kr. — także **Bruc. nitricum** i **sulfuricum**.
- Bryoniae rad.** 0·5–0·2 *p. d.* w proszk. lub inf. 5–15·0:100–200 col.). purgans. 10·0 = 2 kr.
- ***Bulbus scillae** zob. Scill. Bulb.
- Butyrum cacao** zob. Cac. Sem.
- Butyl-Chloralum hydratum**, Crotonchloral hydrat wewn. 0·1–0·3 *p. d.* w większej dawce 0·3–0·6 *p. d.* działa nasennie pod. rozp. z dodat. glyc. lub alkoh. używany w bólu zębów uciążarnych. 1·0 = 15 kr.
- Cacao Semen** v. Fabae cac., Det. (15·0:100–200). 10·0 = 2 kr.
- Sem. Cac. express.** (Cac. odłuszc.) — **Oleum (Butyrum) Cacao** 0·5–2·0 *p. d.* w proszk., past., zawies.; jako constit. do maści suppos., baccill. 10·0 = 6 kr.
- Caeti glandiflori Tinct.** składu niepewn. lub pewniejszy — **Extr. Caet. gl. fluidum** jako analeptic. kroplami 5–15 *p. d.* 2–3 razy dziennie. 1·0 = 4 kr.
- Caetina**, przetwór z Caet. grandifl. działanie i skład niepewny.
- Cadmium sulfuricum** 0·005–0·01 w pig. i rozp.; jako woda do 6cz (0·05–0·2:10·0) do przestrzykiwań (1–2%) do maści (0·1:3–6) 1·0 = 2 kr. — podobnie **C. bromatum**, **C. jodatium**.
- ***Calami Rad., Rhizoma** (Rad. acori cal.) 0·5–2·0 *p. d.* w proszk., pig., inf. (5·0–15·0:100 Col.); do proszku do zębów, dzieciom do gryzienia. 10·0 = 2 kr. — **Extr. Cal.** 0·1–0·5 *p. d.* 10·0 = 56 kr. — **Oleum cal.** $\frac{1}{2}$ –2 kropli *p. d.* w emuls. — **Tinct. cal.** 10–60 kropli *p. d.* używ. do płuk. do ust, tinct. na zęby. 10·0 = 3 kr.
- ***Calcaria chlorata** zob. Calcium hypochlorosum.
- **usta** zob. Calc. oxydat.
- **saccharata** 0·5–1·0 *p. d.*; w dużych dawkach podaje się w zatruciu zgęszcz. kw. karbol,
- ***Calcium carbonicum nativum** (Creta alba, kreda) jako proszek do zębów i t. d. 100·0 = 10 kr. — ***Calcium carb. purum** (praeciplt., Calcaria carbonic.) 0·20–0·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., mixt.; także zewn. w proszk. 10·0 = 15 kr.
- **chloratum** (fusum) 0·1–0·6 *p. d.* w rozp.; do opatr. 1:24, do oczów (0·1–1·0:100) do kąpieli (30·0–100·0 na kąpiel) 10·0 = 5 kr.
- ***C. hypochlorosum** v. Calcaria hypochlorosa, calcaria chlorata (Chlorkalk) wewn. 0·5–0·30 *p. d.*, 4–6 r. d. pastyl. lub wodnej mixt.: zewn. do płuk. 1·0–4·0:100) do penzlów. (0·5–1·5:25), do przestrzykiwań (0·05–0·1:100), do kąpieli (150·0–400·0), maści (1·0–10·0.) Do nakadzań i desinfekcji (rozwisza się płótna namoczone w rozp. C. hyp.). Podskórne wstrzykiwanie 2% rozez. polecane przeciw ukąszeniu wadliwych węzłów. 100·0 = 7 kr.

***C. oxydatum** (Calcaria usta s. caustica) tylko zewn. jako środek żrący, jako Pasta caustica viennensis (zaw. kal. caust. 5 części na 6 cz. Cal. oxyd.). 100·0 = 8 kr. — **extincta** używ. do wytw. ***Aqua calcis** (Aqu. calcariae) wewn. jako antacidum 50·0—200·0 p. d. aż do 300·0—600·0 p. die z mlekiem; zewn. do płukań, wziewań, okładów.

C. permanganicum używane jak Kal. permang. o silniejszych własnościach antisept.

Calcis linimentum (Stahli) używane w oparzeniach jest miesz. Aqu. calc. z ol. oliv. āā.

***Calcium phosphoricum** (Calcaria phosph.) 0·5—2·0 p. d. k. r. d. w pr. w rozpuszcz. z dodatkiem acid. phosph. polecane przez Kolischera i Freunda do zastrzykiwań w gruźlicy stawów. 10·0 = 34 kr. — **hypophosphorosum** 1·0 = 2 kr. i ustęp **C. sulfo-carbolicum** po 0·2 p. d. k. r. d.

— **sulfuratum** najcz. zewn. w maściach (1·0—3·0:25) do kąpieli (50·0—120·0) wewn. po 0·06 w pigułkach jako profylaktyk przeciw grypie. 10·0 = 2 kr.

— ***oxysulfuratum** do solutio Vlemingx'a, do kąpieli. 100·0 = 20 kr.

— **sulfurato-stibiat.** 0·1—0·3 p. d. 2—4 r. d. w pig., proszk.

***sulfuricum ustum** czyli gips do opatrunków. 100·0 = 2 kr.

***Camphora** wewn. 0·03—0·2 p. d. k. r. d. jak excit., 0·3—0·5 p. d. 1—2 r. d. jako sedativ. w proszk. (in charta cerata) pig., mixt., emulz. Także do wziewań, nakadzań, jako proszek do nosa, do płukań (0·2—1·0:100), lewatyw (0·3—1·0), maści (3·0:25) mydeł, do podsk. wstrzyk. (1:12 Spir., albo 1:5 Aeth., lub oliwy); jako excit. całą strzyk. Pravaza na raz) 10·0 = 5 kr. — ***Ol. camphorat.** zaw. 1 C. na 3 ol. oliv. 10·0 = 6 kr. — ***Spirit. camphorat** zaw. 1 C. na 9 Spirit.; do wcierań, zmywań. 10 = 3 kr.

Camphora bromata (monobromata) 0·1—0·5 p. d. k. r. d. aż do 3·0 p. die w proszkach, kapsułkach, pig. kołacz. (trochisci). 1·0 = 3 kr.

— **carbolisata** używ. do opatr. składa się z 10 cz. rozc. kw. karb. i 25 cz. Camph. pulv.

Cancrorum lapid. pulv. po 0·1—0·3 p. d. do proszków. 10·0 = 10 kr.

***Cannabis indicae herb.** 0·2—0·5 p. d. w proszk., inf. (2·0—5·0:100—200) do wziewań, do cygaret. 10·0 = 3 kr.

Haschisch pur. (Churrus) 0·01—0·05 p. d. ***Extr. cannabis indicae** 0·03—0·1! p. d. jako sedat., 0·1—0·2—0·3! p. die jako hypn., w pig., past., mixt., rzadko w maściach (0·2—0·5:10). 1·0 = 16 kr. — **Resina cannab.** 0·2—0·5 p. d. — **Tinct. cannab. ind.** 5—20 kropli aż do 1·0! p. d. a 4·0! p. die 10·0 = 7 kr.

Cannabinum tannicum (hypnotic.) po 0·25—0·5 w pr. 0·1 = 13 kr.

***Cantharides** wewn. 0·015—0·05! p. d. k. r. d. aż do 0·2! p. die, w proszk., pig. zewn. w proszku lub maści (1·0:8—1·0) w plastrze 10·0 = 14 kr. — ***Tinct.**

- cantharid.** 0'1—0'5! *p. d.* aż do 1'0! *p. die*; zewn. jak canth. 10'0 = 7 kr. Ung. Canthar. — **Collodium Canth.** (1:5 Coll.). ***Emplastr. canth. ordin.** (vesicat). 10'0 = 11 kr. ***Empl. canth. perpetuum.** 10'0 = 16 kr. — **Oleum canthar.** 1—6 kropli (0'05—0'3) *p. d.* w kaps., proszk., emulsi; do maści i wcierań.
- Cantharidinum** do zewn. użytku w maści, coll. (0'10:50) polec. do wstrzyk. podsk., w gruźlicy krtani. (0'0001) także w psoriasis, lepra, błonicy. 0'01 = 6 kr.
- ***Capilli Veneris Hb.** 10'0 = 2 kr. i **Syrup Capill. Vener.** 10'0 = 4 kr.
- Capsici fructus** 0'05—0'2 *p. d.* 3—4 r. d. w pr., pig.; zewn. do katapl. 10'0 = 4 kr. — **Tinct. capsici** 10—30 kropli (0'3—1'0) *p. d.* z wodą lub kleikami śr.; zewn. do wcierań, krople do zębów. 10'0 = 4 kr.
- ***Carbo ligni depuratus** (Carb. vegetabilis) 0'5—2'5 *p. d.* w proszk., zewn. do proszku do zębów, do płukanek (3'0—5'0 :100), do maści (10'0:25'00). 100'0 = 14 kr. Tak samo używ. — **Carb. animalis.** 1'0 = 3 kr. — **Carb. panis.** 10'0 = 5 kr. — **Carb. spongiae.** 10'0 = 10 kr.
- ***Cardamomi fructus** (semen) 0'3—1'0 *p. d.* jako składnik Species arom., niekt. tinct. i innych śr. 1'0 = 4 kr.
- Cardui benedicti Hb.** 1'0—2'0 *p. d.* w proszk., inf. lub decoct. 5'0—15'0:100). 10'0 = 5 kr. — **Extr. card. ben.** 0'5—2'0 *p. d.* 2—3 r. d. w pig., mixt. 1'0 = 2 kr.
- Carica papaiia** zob. Papainum.
- Carniferrinum** przetwór żelazisty otrzymany z mięsa 0'50 *p. die.* 1'0 = 16 kr.
- Carpainum hydrochloricum** alkaloid z Carica papaiia stos. w angina pectoris i w wadach serca 0'006. *p. d.* aż do 0'03 *p. die* w pig., w kroplach, podskórnie 0'006—0'01 środek nasercowy, działający podobnie jak Sparteina.
- ***Carrageen** Det. 3'0—5'0:100—500 Col. 10'0 = 2 kr.
- ***Carvi fructus** (Sem.) 10'0 = 5 kr. — **Ol. carvi.** 1'0 = 4 kr. **Spirit. carvi.** mają podobne zastos. jak Anis fr.
- ***Caryophylli** (flores) wewn. po 0'3—0'6 w prosz., inf. (2'00—6'0:100—200 Coll.), do proszku do zębów, do płukania i tinct. 10'0 = 8 kr. — **Oleum caryoph.** $\frac{1}{2}$ —2 kropli, wewn. do nacierań. 1'0 = 2 kr.
- Cascarae sagradae cortex** czyli **cortex Purshianae** 0'5—2'0 *p. d.* w inf. 10'0 = 3 kr. — **Extr. fluid Case. Sagr.** $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki k. r. d. do 4'0 *p. d.* a 10'0! *p. die* czyście albo w syropie. 1'0 = 3 kr.
- Cascarae amargae cort.** także jako extr. fluid. po 40—50 kropli *p. d.* 2—4 r. d. (w syphilis) 1'0 = 3 kr.
- ***Cascarillae cortex** 1'0—2'0 *p. d.* k. r. d. w pr. lub lepiej w inf., decoct. (10'0—20'0:100—200) Col.). 10'0 = 5 kr. — **Extr. Cascarillae** 0'3—1'5 *p. d.* w pig. 1'0 = 4 kr. — ***Tinct. Cascar.** 20—40 kropli aż do 10'0 *p. die.* 10'0 = 6 kr.
- ***Castoreum (canadense)** 0'1—1'0 *p. d.* 2—4 r. d. w pig., proszk. 0'10 = 5 kr. — ***Tinct. castorei** 10—60 kropli *p. d.* 1'0 = 12 kr.

Cast. sibiricum tak samo jak canad, (droższe i silniejsze).

***Catechu** (Terra japonica 0·5—1·5 p. d. w pig., proszk. rozp. w wodzie lub alk. 3—5%) : do proszku do zębów, do past i tinctur. 10·0 = 7 kr. — ***Tinct. catechu** 10—60 kropli p. d.; 10·0 = 15 kr.

***Centauri minoris Hb.** 1·0—2·0 p. d. w proszku; w inf. (5—105%). 100·0 = 26 kr. — ***Extr. cent. min.** 0·5—2·0 p. d. 2—3 r. d. pig. mixt. 10·0 = 30 kr.

***Cera alba** 10·0 = 6 kr. i ***flava** 10·0 = 4 kr. wewn. w emuls. (15·0:200 z żółtkiem lub 15·0 gumi arab.); jako konstit. do maści, plastrów, świeczek itd.

— **japonica** tak samo. 10·0 = 3 kr.

Cerasorum syrupus corrig. i const. 10·0 = 6 kr.

***Ceratum fuscum** zob. Plumbum.

Cereoli laseczki giętkie, cienkie; mogą być pociągane środkiem leczniczym i wprowadzone w rozm. przewody, przetoki i t. d.

Cerium oxalicum 0·05—0·1—0·3! p. d. aż do 1·0! p. die w proszk. lub pig.; polec. w vomitus gravid, dyspep, w cardialgii, epilepsyi. 1·0 = 2 kr.

Cerussa zob. Plumb. carb.

***Cetaceum** (sperma Ceti) przeważn. zewn. do plastrów, maści (1:2 ol. oliv.) 10·0 = 6 kr. Gold Cream.

Cetatum cetac. 10·0 = 8 kr.

Cetrarinum (otrzym. z lichen. islandic.) goryczka w pig. po 0·05—0·5 p. d. pół godz. przed jedz., popr. apetyt. 0·10 = 30 kr.

***Chamomillae vulg. flores** 1·0—5·0 p. d. w proszk., inf. (5·0—15·0:100—200 Col.) do species; zewn. do suchych lub wilg. okładów, do przestrzykiwań (25%) do kąpieli (300·0—750·0 na kąpiel). 10·0 = 6 kr. — **Aqu. chamomill.** do mixt. 100·0 = 10 kr. — **Extr. Chamomill** 0·5—1·5 p. d. 1·0 = 2 kr. — **Ol. Chamomill. aeth.** $\frac{1}{2}$ —2 kropli p. d. 0·1 = 8 kr. — **Syr. Chamom.** Corrig. 10·0 = 4 kr. — **Tinct. Chamom.** 10—30 kropli p. d. 2—4 r. dz. 10·0 = 3 kr.

Charta nitrata używany do wdychiwań w astmie.

Charta sinapisata rubefaciens (Rigolott).

Chelidonii Hb. 10·0 = 2 kr. — **Extr. Chelidonii** 0·1—0·5 p. d. w pig., mixt. 1·0 = 6 kr.

***Chenopodii ambrosioides Hb.** 0·5—4·0 w proszk. spec. Inf. (10·0—30·0:100—200 Col.); do okładów. 10·0 = 3 kr.

***Chinae cortex fuscus** 10·0 = 10 kr., **Cort. chin. calisayae** 10·0 = 16 kr. i **Cort. chinae ruber** 10·0 = 28 kr. (Pharmakopea nie rozróżnia poszczególnych rodzajów kory tylko oznacza, że ma zawierać przynajmniej 5% alkaloidu) 0·5—1·5 p. d. w proszk., electarium, pig., mixt., inf., lub decoct., (5·0—25·0:100—200 Col.); kawa chinowa, czekol. ch., wino chinowe.; zewn., do zasypek, proszku do zębów, okładów; inf. lub dect. do płukania ust, przestrzykiwań, lewatyw. — **Extr. Chinae aquosum** w 5% rozp. łyżkami 1·0 = 10 kr. i **Extr. Chinae spirituos.** 0·3—2·0 p. d. w pig., mixt. i zewn. do tinct. pomad.; — **Tinct. chinae** 1·0—5·0 p. d. 10·0 = 6 kr. i ***Tinct. chinae comp.** $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki p. d. 2—4 r. dz. kroplami albo w mixt. 10·0 = 4 kr.

Vinum chinae 10·0 = 7 kr.

Chinidinum hydrochloricum. 0·10 = 2 kr.

— **salicilicum** 0·10 = 6 kr.

— **sulfuricum** (Conchinin) 1·0 = 6 kr.

— **tannicum** 0·10 = 6 kr. stos. jak sole chininy.

Chininum czysty alk. 0·03—1·0 w pr., pig., w rozp. w alkoh. lub aeth. mało używ. tylko sole:

Chininum aethylosulfuricum w dawce 0·02—0·4 do podsk. zastrzyk. 10·0 = 5 kr.

arsenicicum 0·003—0·01 w pig. 1·0 = 17 kr.

— **bihydrochloricum** (bimuriaticum) 0·25—0·50 *p. d.* podskórne, sól, ch. łatwo rozpuszczalna. 0·1 = 4 kr.

— **bihydrobromicum** 0·50—1·0 w proszku lub podsk. (1·0—3·0:10 Aqu.) 0·1 = 4. kr.

— **bimuriaticum carbamidatum** do podsk. zastrzyk. 0·1—0·5 *p. d.*

— **bisulfuricum** (rozp. w 11 częściach wody) stos. jak sulf. 1·0 = 7 kr.

— **citricum** jak Ch. sulf. 1·0 = 15 kr.

— ***ferro citricum** 0·05—1·0 *p. d.* do 2·0 *p. die* w proszk. pig., rozp. 1·0 = 5 kr.

— **hydro-bromicum** (bromatum) 0·05—0·5 *p. d.* do 2·0 *p. die* w proszk., pig., rozp., podsk. (10⁰/₀) rozc. alkoh. 1·0 = 8 kr.

— **hydro-chloricum** (muriat.) rozp. w wodzie zastos. wewn. jak sulf.; do zastrzykiwań podsk. (0·15—0·25: Glycer., aqua *aa* 0·5). 1·0 = 8 kr.

— **hydrojodicum** 1·0 = 18 kr.

— **lacticum** łatwo rozpuszcz. w wodzie. 1·0 = 16 kr.

— **phosphoricum** 1·0 = 16 kr.

— **saccharanicum** mniej gorzka zaw. 36⁰/₀ sacchar., i 64⁰/₀ chininy, trudno rozpuszcz. w wodzie. 1·0 = 30 kr.

— ***salicylicum** 0·1—0·5 *p. d.* do 2·0 *p. die* 1·0 = 11 kr.

— ***sulfuricum** jako tonicum 0·03—0·15 *p. d. k. r. d.*; 0·3—2·0 w ciągu 24 godzin w intermittens, neuralgiach, durze i t. d.; po 1·0—2·5 na raz w bardzo wys. goraczk. w proszk., placuszk., pig., w rozp. w wodzie, winie lub mleku; zewn. do wdmuchiwań do nosa, gardła, krtani; do przestrzykiwań nosa, cewki moczow., pęcherza (w 1⁰/₀), do zastrzyk. podskór. (1·0:10 Aqu. i kilka kropli acid. sulf., lub 1:6 Glyceryny) do maści (1:40—80) do czopków, pomad (0·5—1·0:25) 1·0 = 6 kr.

— ***tannicum** (2—4 razy większe dawki jak sulf.) w proszkach lub zawiesinie. 1·0 = 7 kr.

— **valerianicum** 0·05—0·5 *p. d.* w pr. i pig. 1·0 = 15 kr.

Chinoidinum (2—3 razy większe dawki jak chin. sulf.) 0·1—1·0—3·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., w rozp.; w wodzie z dodatkiem kwasu lub alkoh. 10·0 = 9 kr.

— **hydrochloricum** 1·0 = 15 kr.

— **sulfuricum** 10·0 = 9 kr.

Chinolinum 1·0 = 4 kr. wewn. nie używany, tylko do płukań 1·0:500,0 z dodatkiem alkoholu i do penzlowań 5⁰/₀ w błonicy. 1·0 = 4 kr.

— **tartaricum** 1·0 = 4 kr., jako antysept. i antypyr. po 0·5—1·0—2·0 *p. d.* 0·5 do 6·0 *p. die* w proszku, mixt., do płukan, wzięwan, penzlowań (3—10%).

Chinosol (oxychinolinsulfat) wewn. do zmywań 1:100, gaza, wata; zasyпка w poceniu nóg 2:100 amylum.

Chloralose poł. chloralu z glykosami, kryształki rozpuszcz. w letniej wodzie środek nasenny 0·25—0·75 wywołuje sen, czasami działa ubocznie (zawroty, deliria). 0·1 = 12 kr.

Chloralum-butyl hydrat. zob. Butyl-chloralum hydr.

Chloralum cjanhydratum 0·646 rozp. w 100,0 wody daje lek tak samo dział. jak Aqua amygd. amar. i zamiast tejże polecany; — przetwórczy.

— **formamidatum** Chloramid, Chloralformamid, używ. jako hypnot. 2·0—4·0 *p. d.* do 8·0 *p. die* w rozp. w wodzie, łatwo się rozkłada, przechowywać w chłodzie. 1·0 = 6 kr.

— ***hydratum** 0·1—2·0 *p. d.* co godz. jako sedat.; 1·0—3·0 *p. d.* do 6·0! *p. die* jako hypnot. (dawkę tę można w delir. potator. przekroczyć do 4·0! *p. dosi* a 8·0! *p. die* a nieraz jeszcze wyżej) w rozp. albo pig.; zewn. do lewatyw, czopków (1:4), do zastrz. podskórn. (0·5—1·0:100) także do opatryw. ran, atoniczn. wrzodów, róży (1:10—50 Aqu. albo glyc.) do penzlowań. (1:30). 1·0 = 2 kr.

Chloralurethan (uralium) 2·0—3·0 *p. d.* polecany jako hypnoticum. 1·0 = 10 kr.

***Chloroformium** wewn. 2—10—20 kropli (0·2—1·0) *p. d.* k. r. d. w syropie albo z klejami, z alkoholem albo eterem, w zawiesinie, w kaps., do wzięwań 2·0—10·0 czysty albo z eterem (1:9); do narkozy czysty lub z eterem i alkoholem, do maści, liniment, lewatyw (6—20 kropli), do podskórn. zastrzykiwań (0·50—1·0). 10 = 6 kr. — **Aqua chloroformii** cenny antyseptyk (1·0 chlorof.:200 Aqu.) wewn. łyżeczkami aż do 150·0 *p. d.* czystej lub w miksaturze; do przepłukiwania żołądka (3·0—10·0 chlorof. na 100 Aqu.) 10 = 5 kr.; — **Linimentum chloroformi** (1:2 do 10 Ol. Oliv.); **Liquor morphini chloroformiatus** 5 do 25 kropli *p. d.*

***Chlorum solutum** (Aqua chlorata, Aqua chlori) wewn. 2·0—5·0 *p. d.* aż do 50·0! *p. die* w 5-krotnem rozcieńczeniu (in vitro nigro); zewn. jako płuk. do ust, gardła, do zmywań, przestrzykiwań (5·0—50·0:500·0 Aqu.) do penzlowań (1:1—5 syropu lub miodu). 10·0 = 3 kr.

Chlormethyl ciecz łatwo ulatniająca się i parą swoją wywołująca miejscowe znieczul., stosowane w neuralg. i lumbag.

Chrysarobinum (niewłaśc. nazw. Acidum chrysophanicum) czyli anthrarobinum, araroba, proszek żółty, wewn. stosowany jako wymiot. i rozwalniaj. 0·35—1·0 w pigułkach lub rozp. w alkal.; zewn. w maściach (1—5:20) w collodium, w żelatynie (5—15%). 1·0 = 10 kr.

Cichorei Hb. i Rad. używane jak Taraxacum. 100 = 6 kr.

***Cinae flores** (Semen Cinae) wewn. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d

- w proszku, mixt., powidl., czekolad., w infus. 10·0—15:100; do lewatyw) 5·0—20·0:50·0—100·0 Aqu.) 10 = 4 kr. **Extract. Cinae aether.** 0·30—2·0. 1·0 = 5 kr.
- Cinchoninum purum** 1·0 = 5 kr.; **C. hydrochloricum** i **C. sulphuricum** 1·0 = 2 kr., w dawkach o 2 r. większych niż chininum.
- Cinchonidinum purum** 1·0 = 3 kr.; **C. chydrochloricum** 1·0 = 3 kr. i **C. sulphuricum** 1·0 = 2 kr., stos. jak poprzedni. **C. tannicum** stos. jak Chinin. tannic.
- Cinnamomi cortex** (chinensis) 0·20—1·50 *p. d.* w proszku, w powidełk., w maceracyi wodnej l. winnej, w infus. 3·0—15·0:100; conspeg. 10 = 8 kr. — tak samo **Cort. Cinnam. Zeylanici** 10 = 10 kr. — ***Aqua Cinnam. simplex** 100 = 11 kr. — ***Aqua Cinnam. spiritiosa** łyżeczkami l. w mixt. 100 = 25 kr. — ***Ol. aether. Cinnam.** $\frac{1}{2}$ do 2 kropli *p. d.*, corrigens. 1·0 = 4 kr. — ***Syrup Cinnam.** (10·0—20·0:100). 10 = 6 kr. — ***Tinet. Cinnam.** 10—60 kropli *p. d.*; dodatek do płuk. zębów i ust. 10 = 4 kr.
- Citri fructus** jako **succus citri** do mixt., saturacyi, limonad, do płuk., pedz. — ***Ol. citri** 1—3 kropli *p. d.*, corrig. 1·0 = 4 kr. — **Syrup citri** 10 = 6 kr. — **cortex fr. citri** stosow. jak **cort. aurant.** 10 = 5 kr.
- Citrophenum** poł. kw. cytryn. z Phenetidinem; proszek kryst. tr. rozp. w wodzie; wew. po 0·5—1·0 *p. d.* aż do 6·0. 1·0 = 15 kr.
- *Coca folia**, wewn. 0·30—1·0 *p. d.*, 2—4 r. dz., w proszku lub decoct (2·0—10·0:100—150) 10 = 14 kr.
- Cocainum hydrobromicum** 0·10 = 25 kr. dawka jak:
- *Cocainum hydrochloricum** (częściej używ. niż cocain. purum, citrum, hydrobrom, salicyl.) wewn. 0·02—0·10! *p. d.* aż do 0·30! *p. die* w proszku, rozpuszcz. w wodzie, alkoh.; najczęściej zewn. do znieczulenia błony śluz. w 2—20% roztworze czasem z morfiną; w maściach 0·20—0·30:10—20; w czopkach 0·01—0·02. 0·01 = 19 kr.
- **phenylicum** w alkoh. wod. rozez. do użyt. zew. 0·10 = 25 kr.
- Coccionella** 10 = 10 kr. i **Carminum** 0·10 = 1 kr. barwiki.
- Cocculi indici fruct.** wewn. 0·05—0·20; zewn. w maściach i decoct. (1—2%) 10 = 2 kr.
- Cochleariae herba** 100 = 36 kr.; **Spiritus cochlear.** 1·0—4·0 *p. d.* do płuk. do ust, do tynktur zęb. 100 = 30 kr.
- Codeinum hydrochloricum** 0·10 = 9 kr. — **C. sulphuricum** i najw. używ.: **C. phosphoricum** 0·10 = 9 kr., wewn. 0·015—0·10! *p. d.* aż do 0·40! *p. die* w proszk., pig.; mixt.; do podskórn. wstrzyk. 0·50:10 Aqu.).
- Coffeae semen** 10 = 5 kr.
- *Coffeinum** Theinum — (Theobrominum) wewn. 0·02—0·20! *p. d.* do 0·60 *p. die* w pig., proszk., pastylk.; podskórn. 0·01—0·02 *p. d.* rozpuszcz. w chlorof. l. spiryt. 0·10 = 2 kr.
- **citricum** 0·10 = 2 kr.
- **hydrobromicum** 0·10 = 2 kr.
- **natriobenzoicum** 1·0 = 14 kr., i

Coffeinum salicylicum 0·10 = 2 kr.

Colchici semen 0·05 = 0·25 *p. d.* w proszk., pig. 10 = 3 kr.

Acetum colchici 1·0—2·0 *p. d.* 10 = 2 kr. ***Tinct. colchici semin.** 0·50—1·50! *p. d.* — 5·0 *p. die* czy sta lub w mixt. 10 = 6 kr. — **Vinum colchici semin.** tak samo 10 = 10 kr.

Colchicinum 0·0005—0·003—0·009 *p. d.* w proszk., pig., rozpuszcz. do podsk. zastrzyk. (b. drażni.) 0·01 = 2 kr.

***Colla pise.** zob *Ichtyocolla*.

***Collodium** tylko zewn. jako środek osłaniający 10 = 5 kr.

— **cantharidatum** zewn. zamiast empl. cantharid. 10·5 = 25 kr.

— **elasticum** (Ol. ricini 1·0, ol. Terebinth. 5, Collodi 94) 10 = 6 kr.

***Colocynthis fruct** (pulpa) wewn. 0·01—0·30; *p. d.* — 1·0 *p. die* w proszk., macer., infus. (10·0:100 Aqu. lub vinum) 1·0 = 3 kr. — **Fruct. Colocynthis. praeparat.** stos. podob. jak poprz. ***Extract. colocynthis.** wewn. 0·005—0·01 *p. d.* jako purg.; 0·01—0·05! *p. d.* — 0·20! *p. die* jako drastic. 1·0 = 15 kr. — **Tinct. colocynthis.** 1·0—1·50 *p. d.* — 5·0! *p. die.* 10·0 = 10 kr.

Colocynthinin (Citrulin) wewn. 0·005—0·01 w pig. jako purgans.

Colocynthinum 0·05—0·40 *p. d.* — 0·80 *p. die* w pigułk. 0·10 = 25 kr.

***Colombo rad.** (Calumba) 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., infus. decoct., 5·0—15·0:100—200. 10 = 6 kr. — **Extract. Colombo** 0·30—1·0 *p. d.* — 3·0 *p. die* w proszk., pig., mixt. 1·0 = 10 kr.

***Colophonium** tylko zewnętrznie; ***Empl. oxycroceum** (Coloph. 1, Cer. flav. 3). 15·0 = 12 kr.

***Collyrium adstring. luteum** 10·0 = 3 kr. zob. *Zincum sulphur*.

Conchae marinae praeparatae wewn. 0·50—2·0 *p. d.* w proszk.; zewn. do proszk. zęb. 10·0 = 2 kr.

***Condurango cortex** w infus. macer., l. decoct. (15·0—30·0:400 aquae ad coll. 200) 1—2 łyżk. *p. d.* 2—4 r. d. 10·0 = 4 kr. — **Extract. Condur.** 0·2—0·50 *p. d.* 10·0 = 12 kr. — **Vinum Condur.** łyżkami. 10·0 = 10 kr.

Conii maculat. herb. 0·05—0·30! *p. d.* — 2·0! *p. die* w proszk., pig., infus. (1⁰/₀—2⁰/₀), zewn. do okładów w infus. (1—4⁰/₀), do przestrzykiwań, wziewań (czasem z fol. hyoscyami). 10·0 = 4 kr.

Conii fructus 0·05—0·20 *p. d.* 2—4 r. d. 0·80! — *p. die*, **Emplastr. Conii** 10·0 = 5 kr. ***Extract. Conii** 0·02—0·20! *p. d.* — 0·60! *p. die* w proszk., pig., rozpuszcz., mixt.; jako woda do ocz (2—4⁰/₀); do wziewań (0·10—0·20:100), do lewatyw (0·10—0·30:150), do maści (0·50—1·0:10·0). 1·0 = 7 kr. — **Tinct. Conii** 5—15 kropli *p. d.* 10·0 = 20 kr.

Conium purum (narcotic) 0·0001—0·001! *p. d.* — 0·003! *p. die* w pig., kropl., mixt.; zewn. rozpuszcz. w alkoh., w maści

- (0·01—0·10:10—15), 0·01 = 2 kr. — **Con. hydrobrom.** dawka jak poprz. 0·10 = 20 kr.
- Convallariae majalis herb.** 0·3—0·5—1·0 k. r. d. inf. 5·0—10·0:100—150 Col. 10·0 = 2 kr. — **Conv. maj. flor.** 10·0 = 6 kr. — **Extr. conv.** 0·1—0·5 p. d. aż do 0·2 p. die. 1·0 = 4 kr. — **Tra conv.** kroplami. 10·0 = 11 kr.
- Convallamarinum** 0·005—0·06! p. d. aż do 0·3! p. die. 0·10 = 20 kr. — **Convallarinum** jako purgans po 0·05—0·15 p. d. 2—4 r. dz. aż do 0·25 p. die 0·01 = 11 kr.
- ***Coryandri fructus** (semen) 0·5—2·0 p. d. w proszk., inf., macer. (5·0—10·0:100 Col.). 100·0 = 9 kr.
- Cornutinum citricum** (alkaloid z *Sec. corn.*) brunatny proszek 0·003, dwa r. d. w pig. rozp. przeciw spermatorrhoe; w położnictwie zam. secale w dawce 0·005—0·01. 0·10 = 50 kr.
- Coto cort.** (antidiarrhoic.) 0·02—0·05 w proszku. 10·0 = 15 kr.
- Tinct. coto** 10—15—30 kropli p. d. k. r. d. 10·0 = 30 kr.
- Cotoinum** glykozyd 0·005—0·08! p. d. aż do 0·5! p. die, w kaps., emulz. i mixt. 0·01 = 4 kr.
- Creolinum** wewn. 0·2—0·5 p. d. 3 razy dnia po jedz. w kaps., proszk., pig.; zewn. w $\frac{1}{2}$ —2 proc. rozczyynie do zmywań, do penzłow. 2 $\frac{0}{10}$ 10·0 = 4 kr.
- ***Creosotum** zob. **Kreosotum.**
- Cresolum erudum** = surowy kw. karbolowy.
- ***Crocus** (szafran) 0·2—1·5 p. d. w proszk., powid., inf. (2—5 $\frac{0}{10}$); do okładów, plastrów, maści. 1·0 = 13 kr. — **Tinct. croci** 10—50 kropli. 10·0 = 30 kr.
- ***Cubebae fructus** 1·0—10·0 p. d. aż do 30·0! p. die w proszk., pig., tabl.; do przestrzyk. w inf. (10·0—15·0:100 Col.), do lewatyw (5·0—15·0 z żółtkiem). 10·0 = 6 kr. — **Extr. Cubeb. barum** 0·5—2·0 p. d. k. r. d. w pig., zawiesinie. 1·0 = 20 kr. — **Ol. Cubeb.** 5—15 kropli. 1·0 = 4 kr.
- Cucurbitae semen** (peponum) ziarnka dyni, po 30·0—60·0 w emulz. przeciw tasiemcowi. — **Ol. Cucurbit.** 15·0—30·0 p. d. 10·0 = 10 kr.
- Cuprum aceticum** (*Aerugo crystallisata*) rzadko wewn. po 0·006—0·06 p. d. w pig., proszk., rozp.; zewn. do płuk. (0·1:100), przestrzyk. 0·4—1·0:100, jako woda do 6cz (0·1—0·5:100), do maści (1—10 $\frac{0}{10}$). 10·0 = 6 kr.
- **aluminatum** (*lapis divinus*) tylko zewn. jako żrący, jako woda do 6cz (0·1—0·5:100), płukanka (1·0—2·0:100). 10·0 = 15 kr.
- **bichloratum** wewn. po 0·005—0·01 p. d. w rozp.; zewn. do desinfekeyi.
- **carbonicum** 0·2—0·5 p. d. w proszk., w pig., w wodzie jako odtrutka w zatruciu fosforem, co $\frac{1}{2}$ godziny.
- chloratum** jak bichloratum.
- **nitricum** 0·005—0·007 p. d. w pig., lub pokarm. klejkami, zewn. 0·1—0·4:100.
- **oxydatum** (*nigrum*) 0·01—0·1 p. d. w proszk., w pig.; w maści (1:8—20). 1·0 = 3 kr.
- **sulfuricum purum** wewn. po 0·01—0·03 p. d.; jako wymiotny po 0·05—0·4! (dzieciom 0·05—0·1 p. d. aż do skutku) w proszk., pig., rozp.; zewn. insubst

- albo w proszku (1:1—20 sacch.), także w rozp. (0·2—1·0:3·0—100 Aq.), jako żrący i adstring., do penzlow. (0·1—0·2:10 Glys.), płuk. (0·1—1·0:100), do ocz. (0·05—0·5:100), do przestrzyk. (0·2—2·0:100), do maści (1·0—3·0:10—25) i masę do ocz. (0·1—0·6:10). 10·0 = 3 kr. —
- C. sulf. crudum** tylko zewn. — **Cup. sulf. ammoniatum** 0·01—0·10! aż do 0·4! *p. die* w proszk., pig., rozp.; zewn. do płukań, przestrzyk. (0·1—0·4:50 Aq.) 10·0 = 8 kr.
- Curare** 0·001—0·002 rozp. w wodz. lub alk.; do podsk. wstrzyk. (0·1:10 Aq.) rozpocz. od 0·002 ostrożnie w górę aż do 0·02, a nawet 0·15 *p. die*; przed użyciem wypróbować przetwór na żabie. 0·1 = 50 kr.
- Curcumae rad.** do barw. maści. 10·0 = 4 kr.
- Cutolum** (Aluminum boricotannicum) zewn. jako zasypka. lub w maść. w eczem., intertrigo oparzeniach, odmrożeniach.
- ***Cydoniae semen** 10·0 = 7 kr. używ. do ***Mucilago Cyd.** (1:50 Aq.). 10·0 = 3 kr.
- ***Dammar resin.** wchodzi w skład empl. adhaesiv.
- Dermatol** (poł. bism. z kw. gallus.) proszek bezwonny delikatny, używ. zewn. jak jodoform w proszku, maściach, gaza 10—20% itd., także wewn. w chorob. przew. pokarm. jak bism. subnitr. aż do 2·0 *p. die*. 10·0 = 50 kr.
- Desinfector** ciecz oleista podobna po creolinie i podobnie stosowana.
- Diaphtherinum** (Oxychinaseptol) proszek w wodzie rozp., nietrujący, antysept. do przepłuk. jam. ($\frac{1}{2}$ —2%) 1·0 = 8 kr.
- Digitalinum verum**, proszek mało rozp. w wodzie, ma dział. podobnie jak inf. fol. digit.; przetwórz dig. germanicum wewn. po 0·001—0·002! *p. d.* aż do 0·01 *p. die*; przetwory francusk. i angielsk. znacznie mniej 0·00025—0·0005 *p. d.*; także w maściach. 0·01 = 3 kr.
- ***Digitalis folia** 0·03—0·20! *p. d.* 4—6 r. dz. — 0·60! *p. die*, w proszk., pig., infus (0·50—1·0:100 Coll. wyżyć w ciągu dnia). 1·0 = 1 kr. — **Acetum digitalis** 0·50—1·0 w kropl., mixt. — **Extractum Digitalis** 0·03—0·20! *p. d.*, 1·0 *p. die*. 1·0 = 12 kr. — ***Tinctura Digitalis** 0·50—1·50 *p. d.* — 5·0 *p. die*. 10·0 = 6 kr.
- Digitoxinum** proszek nierozpuszcz. w wodzie, 0·00025—0·0005 *p. d.* 2—4 r. d. lepiej w klysma 0·0005—0·00075 nie drażni żołądka i dobrze się resorbuje. 0·01 = 35 kr.
- Dijodoform** rozkł. się w świetle, zast. jak jodoform. 1·01 = 60 kr.
- Diuretinum** (Theobromin. natrosalicyl) proszek biały w wodzie rozpuszcz., działa moczopędnie, nie wpływa na serce. 1·0—2·0 *p. d.*, 5·0—6·0 *p. die*. 10·0 = 130 kr.
- Duboisinum sulphur.** 0·01 = 7 kr. — **D. hydrobromicum** proszek bez smaku i zapachu, działa nasennie, wewn. lub podskórn. 0·0002—0·001 *p. d.* — 0·003 *p. die*; stosowany u umysł. chorych.
- ***Dulcamarae stipites** 0·50—2·0 *p. d.* k. r s d. w proszku infus., decoct. (5·0—20·0:120 coll.), także w species. —
- Extract. Dulcamarae.** 0·50—1·50 *p. d.* 1·0 = 2 kr.

- Dulein** (Paraphenetol-Carbamid.) 200 razy słodszy niż cukier, podobne zastosowanie jak saccharyny.
- Elaeosacchara** składają się 50 cukru i 1 olej eter.
- ***Electuarium aromaticum** c. opio (Theriaca) $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki 3—4 r. dz. 10·0 = 4 kr.
- ***Electuarium lenitivum sennae** 1—10 łyżeczek. 1. w mixt. 10·0 = 6 kr.
- ***Elemi resina** do maści, plastrów. 10·0 = 3 kr.
- Elixir amarum** łyżeczkę do $\frac{1}{2}$ łyżki p. d. 2—4 r. dz.
- **aurantiorum compositum** 1—3 łyżeczek p. d. k. r. d. 10·0 = 16 kr.
- Embeliae ribis fructus** 4·0—15·0 z mlekiem, stosow. przeciwnie tasiecowi.
- Emetinum purum** 0·0005—0·002 jako expector.; 0·005—0·01 jako emetyk, w proszk., rozpuszcz. 0·01 = 10 kr.
- ***Emplastrum adhaesivum** 100 □ cm. = 6 kr.
- **anglicanum** 100 □ cm. = 20 kr.
- ***cantharidum ordinarium** (vesicans) Canth. 2, ol. oliv. 1, potem cera flava 4. Tereb. 1. 10·0 = 11 kr.
- **perpetuum** (rubefaciens).
- **hydrargyri**. 100·0 = 9 kr.
- **meliloti**.
- ***oxycroceum** (Colophon. 1, Cerae flava 3). 10·0 = 14 kr.
- ***saponatum** (Empl. Diachyl. simpl. 600, Cerae alb. 100, sapo venet. 50, Camphor. 10, Ol. oliv. 40). 10·0 = 5 kr.
- Ephedrinum hydrochlor.** alk. z ephedra vulg. w 10% roztworze działa jak Homatropin.
- Equiseti herba decoct.** (5·0—30·0:150—200 coll.). 100·0 = 8 kr.
- Ergotininum** Alkaloid z sec. cornuti, przetwórz nietrwały, podskórnie 10—20 kropli z roztworu 0·001:1·0 w nerwiciach naczynioruchowych. 1·0 = 15 kr.
- Ergotinum** (Extr. sec. cornuti aquos; Bonjean) 0·10 0·50 p. d. — 2·0 p. die w pig., pastyl., rozpuszcz., mixt.; podskórnie 0·02—0·20 p. d. (nawet 0·50 p. d.) — 1·0 p. die rozp. w wodzie, gliceryn. i w wodzie, gliceryn. i alkoh.; do czopków (0·20—0·50:2), do lewatyw (1·0—3·0:100—200 aquae). 1·0 = 5 kr.
- **dialysatum** (Bombellon) 1·0 = 11 kr., stos. jak poprzedni.
- **citricum solubile** do zastrzyk. podskórnych 0·0002—0·0007 p. d.; — **Cornutinum** (Kobert) 0·0025, w krwotok., poronien. 0·10 = 50 kr.
- Eryodictionis Californici fol.** (Yerbasanta), **Syrup Er. Calif.** 0·10 = 8 kr.
- Eserinum** zob. Physostigmin.
- Eucalypti globuli, cortex—folia** 0·50—1·0 p. d. — 16·0 p. die w proszk., infus., decoct. (10·0—30·0:100—150 coll.) co 1—3 godz. w zimnicy; do płukanek, lewat. 10·0 = 2 kr. — **Vinum Eucalypti** 1—3 łyżeczki p. d. — **Oleum Eucal.** (Eucalyptolum depuratum) wew. 0·20—2·0 p. d., do nacierania (1—5:10 Ol. Oliv.), wzięwania, podskór. (0·10—0·50 p. d.). 1·0 = 3 kr. — **Tinctura Eucal.** łyżeczkami — 40·0 p. die, do płukan. i t. d. 10·0 = 6 kr. — **Eucalyptolum** wewn. 0·3—2·0 desinf., antipyr. 1·0 = 4 kr.

Euphorbiae pilluliferae herb. jako antiasthmati w decoct. z winem l. jako **Extract. alcohol.** 0·05 p. d. — 0·10 p. die; jako **Tinet. Eupohrb.** 10—30 kropl. p. d. 10·0 = 4 kr.

***Euphorbium resina** do drażniących maści (1:20) zasypek; 10·0 = 6 kr.

Euphorinum = Phenylurethanum proszek rozpuszcz. w wodzie z wyskok., wewn. 0·10 p. d. — 1·50 p. die jako antipyretic.; także jako antirheum zew. w maść., rozp. działa antysept. 1·0 = 15 kr.

Europhen (Kresoljodid). Proszek rozpuszcz. w wysk., chlorof., eterze, ma podobne własności jak jodoform, stosow. w maść. (2—10%) podskórn. (0·05—0·10) jako antiluetic. 1·0 = 30 kr.

Exalgin antineuralg. antipir. 0·10 p. d. — 0·25 p. die w proszk. l. rozp. w wodzie z dodatkiem alkoholu. 1·0 = 25 kr.

Faba calabarica zob. Physostigmin.

— **St. Ignati** podobne stos. jak nux vomic., dawka o $\frac{1}{2}$ mniejsza.

Farfarae folia et flores jak folia althaeae. 100·0 = 12 kr.

Fell Tauri (recens) 5·0—15·0 p. d. k. r. d. w rozp. mixt., z wod. aromat. do maści, liniment. — **Fel. Tauri inspisatum** 0·50—1·50 p. d. k. r. d. w pig. l. jak poprzednie, do maści, liniment., lewat. 1·0 = 2 kr. — **Fel Tauri depuratum siccum i natrium Taurochloricum** w dawk. o $\frac{1}{2}$ mniejsz.

Ferratinum połączenie białka z żelazem, w wodzie nierozp., l. w połączeniu z sodem rozpuszcz., stosow. w niedokrewn., w blednicy 0·5—1·0 p. d., 1—3 z dz. dzieciom 0·1—0·5. 1·0 = 10. kr

Ferratinum stos. jak poprzedni szczególnie u dzieci.

Ferrum aceticum liquidum (Liquor ferri acetici) (5—20 kropli p. d. k. r. d. w aromat. mixt. 10·0 = 4 kr. — **Tinet. ferri acet. aether.** 10—50 kropli p. d. 2—4 r. dz. z cukrem, syrup., winem. 10·0 = 8 kr.

Ferrum aceticum siccum 0·05—0·20 p. d. k. r. d. w pig. 1·0 = 2 kr.

— **albuminatum liquidum** (Liquor ferri albuminati) $\frac{1}{2}$ —2 łyżeczek p. d. 2—4 razy dziennie. podskórn. 0·50—1·0 p. d. 10·0 = 4 kr.

— **arsenicicum oxydulatum** 0·003—0·007 p. d. 1—2 r. dz. w pig. l. rozpuszcz. 1·0 = 10 kr.

— **bromatum** 0·05—0·25 p. d. k. r. d. w pig., rozpuszcz. 1·0 = 3 kr.

— ***carbonicum saccharatum** 0·20—0·50 p. d. k. r. d. w proszk., pig. 10·0 = 12 kr. — **Pillulae ferri carbon.** (Vallet'a) 1—10 pig. p. d.

— **chloratum** (muriaticum oxydulat.) 0·10—0·25 p. d. k. r. d. w rozp. **Liquor ferri chlorati** 0·20—1·0 p. d. 2—4 r. d. w syrup., winie. — **Spiritus ferri chlorat. aether.** zob. Ferrum sesquichlor.

— **citricum amoniatum** 0·20—1·0 p. d. w pig., proszk., rozpuszcz. 1·0 = 4 kr.

— **citric. c. chinino citrico** zob. Chininum ferrocitricum.

- Ferrum citricum oxydatum** 0·10—0·60 *p. d.* 2—4 r. d. w pig., proszk., l. syrup.; podsk. z 10% rozczynu 0·10 *p. d.*
- **hydrooxydatum dialysatum** wewn. 5—10—20 kropli *p. d.* zewn. jako haemostat i styptic. 10·0 = 40 kr.
- hypophosphorosum** 1·0 = 3 kr.; syrupus ferri hypophosph. łyżeczkami.
- **jodatum** 0·05—0·30 *p. d.*—0·50 *p. die*, w proszk., pig., rozpuszcz. (w glicerynie); do maści (1—2:5—10), do kąpeli (25·0—60·0 na kąpiel). — **Liquor ferri jodati** tak samo jak ferrum acet. liquid. — **Ferrum jodatum saccharatum** 0·25—1·0 *p. d.*—2·0 *p. die*, w proszk., pig., pastyl., rozpuszcz. 1·0 = 3 kr. — **Syrupus ferri jodati** 1·0—6·0 *p. d.* 2—3 r. dz. w mixt. l. *āā* ze syrup. simpl. 10·0 = 8 kr.
- **lacticum** 0·10—1·0 *p. d.* w proszk., pig. 1·0 = 2 kr.
- **malatis f. extractum** (Extract. ferri pomat.) 0·20—0·60 *p. d.* k. r. d. w pig., l. rozpuszcz. 10·0 = 10 kr. — ***Tinctura malatis ferri** (Tinct. ferri pomat.) 10—60 kropli (0·50—2·0 *p. d.*) k. r. d. w syrup., winie, mixt. 10·0 = 9 kr. — **Vinum ferratum** (Martialum) zaw. 1 Extr. ferri pomat : 100—200 wina. 10·0 = 8 kr.
- **oxychloratum solutum** (Liquor ferri oxychlorati)
- zobacz. Ferrum sesquichlor. solutum.
- **oxydatum fuscum** 0·20—1·0 *p. d.* w pig., proszk.
- **oxydatum saccharatum solubile** 0·50—3·0 *p. d.* (stos. w zatr. arsenikiem $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ łyżeczki co godzinę). — **Syrupus ferri oxyd. solub.** $\frac{1}{2}$ —2 łyżeczek k. r. d.
- **oxydatum oxydulatum** (Aetiops Martialis) 0·15:0·50 *p. d.* w proszk., pig. 1·0 = 2 kr.
- **peptonatum siccum** 1·0 = 7 kr. stos. jak F. alb. solub.
- **phosphoricum oxydulatum** 1·0 = 3 kr. — **Ferrum phosphor. oxydatum** stos. jak F. oxydat. oxydul.
- **pulveratum** (Limatura ferri) 0·05—0·2 *p. d.* k. r. d. 10 = 4 kr.
- **pyrophosphoric. oxydatum** 1·0 = 3 kr. stos. jak F. phosphor.
- **pyrophosphor. e. ammonio citrico** 0·10—0·50 *p. d.* w proszk., pig., rozpuszcz. 1·0 = 2 kr. — ***Ferrum et Natrium pyrophosphor.** wewn. jak poprzedni podskórnice (1:6 Aqu.) 1·0 = 2 kr.
- **hydrogenio reductum** 0·05—0·20—0·50 *p. d.* 1—4 r. d. w proszk., pig. 1·0 = 3 kr.
- **sesquichloratum crystalisatum** 10·0 = 5 kr. a z niego ***Ferrum sesquichloratum solutum** (Liquor ferri sesquichlorati) 0·10—0·50—1·0 (2—15 kropli) k. r. d. w rozpuszcz. mixt.; zewn. jako żrący, czysty albo jako styptic. (1:3—5 Aqu.) na wacie (Gossypium haemostate.); do przestrzyk. (0·10—5·0:100—500 Aqu.), jako woda do ust, oczów, uszu (0·20—4·0:100), jako płukanie (2—5%) do wziewań (1·0—20·0:500) do maści, czopków (1·0:2·0—10). 10 = 4 kr.
- **sesquichlor. basicum solutum** (Liquor ferri oxychlorati 5—20 kropli *pro die* w mixt., syrup., zewn.

- do obmywania ran. — ***Spiritus ferri sesquichlor. aether. (Tinct. ferri chlor. aether.** Tinct. nervino-tonica Bestuscheffii 0·30—1·50 *p. d.* (10—20 kropli) k. r. d. czysty lub z środkami aromat., w syropie, mixt. 10·0 = 6 kr.
- *Ferrum sulphuricum** (oxydulat) czyste 0·05—0·50 *p. d.* 2—4 r. d. w proszk., pig., pastylk., rozpuszcz.; jako zasypka z alunem lub węglem; do pęzłow., przestrzyk., do (1—2⁰/₀), do okładów (2—5⁰/₀), do kąpiei (25·0—100·0 na kąpiel), jako woda do ocz (0·05—0·40:25 Aqu.); do maści, liniment. (1·0—10·0:30). 10·0 = 2 kr. — **Ferrum sulphur. crudum** (vitriol) do odwietrz. także do kąpiei. 100 = 2 kr.
- **sulphur. siccum** 0·03—0·20 *p. d.* w pigułk. **Liquor ferri sulphur. oxydati** 0·50—2·0 czyli 8—30 kropli. zob. Antidotum arsenici.
- **tartaricum** jako kalium ferro tartaricum (Tartarus ferratus 0·20—0·50 *p. d.* k. r. d. w pig., mixt., rozpuszcz. 1·0 = 2 kr. ***Kalium ferro-tartar. crudum** (Globuli Martiales) tylko do kąpiei (30·0:120 czyli 1—4 kul na kąpiel). 1 kula = 20 kr.
- *Filicis maris rhizoma** (Radix) 12·0—20·0 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., powidełk., w zawieszynie, rzadko w decoct (30·0—60·0:100 coll.). 10·0 = 6 kr. — ***Extract. filicis maris** 2·0—10·0 *p. d.* w pig., kaps., powidełk. 1·0 = 13 kr.
- Foeniculi fructus** (semen) 0·50—2·0 *p. d.* w proszk., inf. (5·0—15·0:100) species. 10·0 = 2 kr. — ***Aqua foeniculi** łyżeczk. 100 = 8 kr. — ***Oleum foeniculi** 1—3 kropli *p. d.* 1·0 = 4 kr. — **Syrupus foeniculi** 5·0—15·0 *p. d.* corrig. 10·0 = 3 kr.
- Formaldehydum solutum** Formalina około 35⁰/₀ rozczyń. wodny czyst. form. przeważnie do dezynfekcyi; w dentyście.
- **Glutol** form. gelatyna, w połączeniu ze skrobią jako **Amyloform.**
- Formanilidum** krysz. rozp. w wodzie wewn. 0·15—0·25 k. r. d. jako antypir.; zewn. w dmuchiw. āā z amylum lub 2⁰/₀ rozczyń. do penzl. znieczula. 1·0 = 14 kr.
- Formicae rufae** do kąpiei (¹/₂—1 kilo) — **Spiritus formicarum** 20—60 kropli k. r. d.; zewn. do nacierañ, zmywań, kąpiei. 10·0 = 6 kr.
- Frangulae cortex** Decoet (10·0—25·0:100—200 coll.) łyżkami, także do lewatyw. 10·0 = 2 kr.
- Fuchsinum** (Rosanilinum hydrochloric.) 0·025—0·25! *p. d.* do 0·50! *p. die* w proszk., pig., wodach arom., mixt. 10·0 = 3 kr.
- Fungus chirurgorum** zewn. jako haemostat.
- Fungus Laricis** 0·1—0·2 k. r. d. w pig. przeciw potom suchotników. Zob. Agaricus alb.
- Galbanum gumi resina** (Peucedanum galbanifluum) 0·30—1·0 *p. d.* w pig., do plastr., do lewat. (2·0—6·0) 10·0 = 10 kr.
- Galeopsis grandiflora** Hb. w infus lub decoct. (15·0—30·0:100). 10·0 = 2 kr.
- Gallae** (halepenses, turcic.) 0·30—1·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., infus. (5·0—15·0:100) zewn. do zasypek, maści (1:10), kąpiel, (100·0—200·0 na kąpiel), lewat. 10·0 = 3 kr. ***Tinct.**

- gallarum** (0·50—2·0) 10—40 kropli *p. d.*, zewn. do penzl., płukanek, przestrzyk. (5—10⁰/₀). 10·0 = 5 kr.
- Gallanolum** (Anilid kw. gall.) zewn. w maściach (1—5:30,0) w chor. skórnych (psoriasis). 1·0 = 13 kr.
- Gallicinum** (Methylaether. k. gall.) wnieź. spojówek 1·0 = 13 kr.
- Gallobromolum** wewn. w rozc. 10:150 3 łyżki dziennie zamiast bromu w epilepsji; zewn. 1—2⁰/₀ wrzecz. 1·0 = 13 kr.
- ***Gelatina animal. alba** decoct. (1·0—8·0:100 coll.), zewn. do kąpieli (¹/₂—2 kilo na kąpiel), przeciw odmrożeniom, do lewat., jako constit. do przyrządzania leków. 10·0 = 7 kr.
- Gelsemii sempervirent. radices** 0·05—0·40 *p. d.* 10·0 = 4 kr. — **Extr. fluid. gels. semp.** 0·03—0·40 *p. d.* — 0·50 *p. die.* 10·0 = 12 kr. — **Tinct. gelsem. semp.** 5—30 kropli *p. d.* 10·0 = 7 kr. — **Gelseminum hydrochloric.** 0·001—0·005 *p. d.* — 0·015 *p. die* w pig. 0·10 = 60 kr.
- ***Gentianae radix** wewn. 0·30—1·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., macerac. (alkoh. lub wodzie), w infus. l. decoct. (3·0—15·0:150) 10·0 = 2 kr. — ***Extr. Gentianae** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w pig., mixt. 10·0 = 18 kr. — **Tinct. Gentianae** 1·0—2·0 *p. d.* 10·0 = 4 kr.
- ***Glycerinum** wewn. łyżeczk. lub łyżk. aż do 40·0—100·0 *p. d.*, zewn. czysta lub z wodą do nacierai, pęzłow., przestrzyk., lewat. (2·0—3·0), wziew. (czysta lub 1:5—10 aqu.), do tampon., jako constit. i excip. rozmaitych środków. 10·0 = 3 kr. — **Glycealeum** (składa się z Farina amygd. 1, Glycer. 2, Oliv. oliv. 6) do maści, opatrunk. — ***Unguent. glycerini** do opatr. 10·0 = 7 kr.
- Gossypium depuratum** (wata) — **Gossypii herbacei rad. cort.** 0·30—0·60 *p. d.* w proszk., decoct. (10·0—15·0:100—200 coll.). 10·0 = 3 kr. — **Extr. fluid. goss.** 1·0—5·0 *p. d.* — 15·0 *p. die.* 10·0 = 2 kr.
- ***Graminis radix.** (rhizoma) decoct. (30·0—100·0:100—200 coll.). w spec. jak succus rec. 100·0 = 8 kr. — ***Extract. graminis** łyżeczk. 10·0 = 15 kr.
- ***Granati cortex** w mac., decoct. (30·0—100·0:200—500 coll.). 10·0 = 6 kr. — ***Extr. granati** 4·0—8·0 *p. d.* 2—3 r. dz. w mixt. 10·0 = 64 kr.
- Gratiolae hb.** 0·10—2·0 *p. d.* — 3·0 *p. die*, w proszk., pig., decoct, l. infus. (2·0—10·0:100—150 coll.). 10·0 = 2 kr. — **Extr. grat.** 0·20—1·0 *p. d.* 1·0 = 5 kr.
- Grindeliae robustae flor.** jako extr. fluid. 0·20—0·40—1·0—2·0 *p. d.* w asthmie w mixt. l. mleku. — **Extr. grindel.** 0·10—0·15 *p. d.* 1·0 = 2 kr. — **Tinct. grindel.** 10—15 kropli.
- ***Guajaci lignum** wewn. 15·0—20·0 *d. die* w spec., proszk., najczęściej decoct. (15·0—20·0:100—200 coll.). 10·0 = 1 kr. — ***Resina Guajaci** 0·30—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., pig., zawiesinie (2·0—8·0:100), w mixt. 10·0 = 10 kr. — **Species lignorum** (składa się Lign. Guaj. raspat 5, Rad. ononid. 3, Rad. liquirit. i lign. sassafras āā 1) decoct. (25·0—60·0:500—1000 aq.). 100·0 = 20 kr. — **Tinct. Guaj.** 15—50 kropli *p. d.* k. r. d. w mixt. 10·0 = 6 kr.
- Guajacolum** żółtawa ciecz lub też otrzym. drogą syntet. jako

masa kryst. 0·1—0·20 w roztworze wodno alkohol., winie, tranie, także w kaps. w miejsce kreosotu u suchot. działa także rozpost. na skórce (1:3 Alkoh.) 1·0 = 12 kr. — **Guajacol benzoic. i Guaj. carbonicum** stosow. u suchotn. 0·20—0·60 *p. d.* — 5·0 *p. die.* nie psuje trawienia 1·0 = 20 kr.

***Guarana pasta** 0·50—4·0 *p. d.* w proszk., u dzieci 0·30—1·50 *p. d.* 2—3 r. dz. 1·0 = 3 kr.

***Gummi arabicum** 1·0—10·0 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., zawiesin. z syrop., jako excip. dla kamfory itd. 10·0 = 9 kr. —

***Mixt. gumm.** (składa się gum. arab. 10, sacchar. 5, aq. 150) łyżeczkami czysta l. do mixtur. — ***Mucilago gum.**

arab. (1:2 aq.) czyst. l. w mixt., jako constit. do rozmaitych lek. 10·0 = 6 kr. — ***Pasta gum. aluminata** (ciasto

ślazow.). 10·0 = 9 kr. — ***Pulvis gum.** składa się z amylum, rad. liquir. *āā* 1·0, gum. arab., sacchar. *āā* 2) jako constit. do

proszk. pig. 10·0 = 6 kr. — **Syrup. gum.** (składa się mucilag. gum. arab. syr. simpl. *āā*).

Guttapercha depur. do ustalających opatr., w dentystyce. 1·0 = 8 kr. — **Traumaticinum** (guttap. 1, Chloroform 10)

stosow. jak collodium. 10·0 = 10 kr.

Gutti gummi — resina gutti 0·01—0·30! *p. d.* — 1·0! *p. die* w pig., proszk., zawieszynie (0·30—0·50:100). 1·0 = 3 kr.

Haemato-gen żółtawy proszek łatwo rozpuszcz. w alkal., organiczny związek żelaza (zawiera 0·07% żelaza).

Haemol i Haemogaloli organo-metaliczne związki żelaza. Haemol proszek szary. 1·0 = 10 kr. Haemogallol czerwono-

brunatny. 1·0 = 12 kr. 0·10—0·50 *p. d.* 3 r. d. w proszk., pastyl.

Hamamelidis virgin. cortex 0·10—0·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., decoct. (15·0—30·0:100—200 coll.). — **Extr.**

fluid. hamamel. v. 2·0—8·0 *p. d.* 2—3 r. d. 1·0 = 1 kr. — **Extr. ham. v. siccum** (Hamamelin — Hamamelidin)

0·03—0·05 *p. d.* k. r. d. w pig., do maści (2—4:20—30), do czopk. (0·05—0·10). — **Hazelin** wodny destylat świeżej

kory ham. virg. 1·0—2·0 *p. d.*; zew. do nacierań, okładów etc. 1·0 = 2 kr.

Hellebori viridis (rad. i rhizom.) 0·03—0·30 *p. d.* — 1·0—2·0 *p. die* w proszk., decoct., macer., infus. (0·20—2·0:100,.

1·0 = 20 kr. — **Extr. hel. vir.** 0·05—0·10 *p. d.* — 0·30 *p. die.* 1·0 = 8 kr. — **Tinct. hel. vir.** 10—30 kropli *p. d.* 10·0 = 10 kr.

Helleborinum 0·01—0·03! *p. d.* — 0·12! *p. die* w proszk. mixt. w miejsce digitalis, łatwo wywołuje rozwolnienia.

0·10 = 10 kr.

Herniariae glabrae hb. do spec. i decoct. (5·0—15·0:100 coll.). 10·0 = 2 kr.

***Hirudo** (pijawki). 1 szt. = 10 kr.

Homatropinum hydrobromicum jako mydriateum 0·5—1·0:10 mniej trujący jak atropin wewn. w pig. 0·001

p. d. — 0·03 *p. die* przeciw potom nocnym u suchotn., 0·01 = 30 kr. — **H. muriaticum i sulfuricum** 0·01 = 30 kr. po 0·06! *p. die* stos. tak samo.

Hydrargyrum aceticum oxydat. rzadko wewn., naj-

częściej jako kosmetyk przeciw piegom, rozpuszcz. (1'0—1'50:100 aq.). 0'10 = 1 kr. — **H. acet. oxydulat.** do maści (1'0—2'0:25).

Hydrargyrum aethylo chloratum podskór. (0'10:10'0 aq.) $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. na raz. 0'10 = 25 kr.

— **benzoicum** w wodzie nierozp. tylko w alkohol., wewn. 0'005—0'01 w pig. lub z rozczynu 0'25:30 Aquae i 0'25 soli kuch. dziennie 1 strzykawka podskórną, zew. do okładów na ulcera luet. (0'05—0'2:30). 1'0 = 4 kr.

— ***bichlor. corrosivum** (sublimat) wew. 0'003—0'03! *p. d.*—0'10! *p. die* w pig. (często z opium) rozpuszcz. w alkohol., wodzie (0'10:20, 12—20 kropli); zew. jako środek żrący w rozczyń. zgęszczonych (0'50—1'0:10 aq., collod., alkoh.), znacznie rozcieńczony jako antysept. do płukań (0'05—0'10:500—1000), do ocz (0'01:25—100), do wzięwań, rozpylań (0'01—0'05:500—1000); do okładów, opatrunk., przepłukiw. (1'0:1000—2000 z dodatkiem soli); do cewki moczowej (0'10—0'20:100), do pochwy (0'30—0'60:100), do nosa (0'01—0'03:100) itd., do penzlowań (0'50—1'0:100 glyc., wody l. alkoh.), do kąpieli (1'0—30'0 na kąpiel), do maści (0'50—1'0:25), podskórną (10'0:100 aq., albo lepiej Hydrarg. b. chl. corr. 1:100 aq. + 3 Natr. chlorat.), t. j. 0'005—0'01 *p. d.*, 1—2 r. dz. w rozmaite miejsca ciała; także do dezynfekcyi. 1'0 = 1 kr. — **Pastilli sublim.** = à 1'0 (Zahradnik). **Aqua fagaed-nica lut.** (składa się Hydr. bichl. corrosiv. 1'0:100 aq. calcis). 100'0 = 20 kr. — **Aq. fagaed. decolor.** (składa się Hydr. bichl. corr. 1, Ammonium chlor. 2, aq. 100). 100'0 = 20 kr.; używana do opatrunków. — **Hydr. bichl. albuminat. solut.** wewn. w dawk. jak bichl. corr. w mleku, kawie i t. d., często podskór.: 0'005—0'01 *p. d.* 1'0 = 5 kr. — ***Hydrarg. bichlor. amoniat.** (H. praecipitat. album) tylko zewn. jako zasypka (1'0:25—50 sacch.), do maści (1'0:10—25). 1'0 = 3 kr. — **Hydrarg. bichl. amoniat. carb-amidatum solut.** i **Hydrarg. peptonat. solubile** stosow. jak H. bichl. solut. — **Hydrarg bichl. cum Natrio chlorat. solut.** jak sublimat. **Unguent. Hydrarg. album.** (składa się Hydr. praecip. albi 1, Paraffini 9).

— ***bijodatum rubrum** 0'005—0'01 w pig., rozp (z kal. jod.). — 0'1, *p. die* w kile, zewn. jak sublimat. 1'0 = 4 kr.

Hydrarg. carboleicum (diphenylicum) 0'02—0'03 *p. d.* 2—3 r. dz. (dzieciom 0'004—0'005 *p. d.*) jako antilueticum. 1'0 = 8 kr.

— ***chloratum mite** (Calomel laevig.) wew. 0'01—0'20 *p. d.* 3—4 r. dz. jako antilueticum; 0'10—0'50—1'0 *p. d.* jako laxans, w proszk., pig.; zewn. jako zasypka do nosa, gardła, ocz, lewatyw (0'10—0'50 z środkiem klejkimi), do maści, czopk., podskór. (0'01—0'02 *p. d.*). 1'0 = 4 kr. — ***H. chloratum mite praecipitatione parat.** $\frac{1}{3}$ dawki poprzedn. 1'0 = 4 kr. — **H. chlorat. mite vapore parat.** w dawce

- o $\frac{1}{2}$ mniejsz. 1'0 = 3 kr. — **Aqua fagaedenica nigra** (składa się: Calomel 1, Aq. calcis 60) do opatr. 100'0 = 10 kr.
- Hydrargyrum cyanatum** 0'005—0'03 *p. d.* — 0'10! *p. die* w pig., proszk., rozpuszcz., w ostatnich czasach polecony przeciw dyfter. (0'01:100, co 2 godz. łyżeczk.), jako woda do ocz (0'05—0'10:100), do okładów, przestrzykiw., podskórnie (0'006 *p. d.*), do maści (0'50—1'50:20—50). 1'0 = 5 kr.
- ***metallicum depurat.** 150—350 *p. d.* w ileus 10'0=6 kr.
- Pilul. coeruleae** (zawier. Hydrarg. 0'06) 2—8 pig *p. d.* jako laxans. — ***Emplastr. hydrarg.** (H. 1:4). 10'0 = 8 kr. — ***Unguent. hydrarg. ciner.** (1:2) do wcierań miejsc. po 0'50—4'0 *p. die* na jeden raz l. kilka razy wetrzeć (z dodatkiem K. Iod., Camphor., Opium, Bellad. i t. d.), do wcier. przy lues. (1'50—4'0 *p. die*), do czopk. (0'20—0'50—2'50:5 Ol. Cacao, sapo l. cera). 10'0 = 10 kr.
- **formamidatum solut.** ($\frac{1}{10}$) do zastrzyk. podskór. 0'01 *p. die*, t. j. jedną strzykawkę. 10'0 = 7 kr.
- ***jodatum flavum** 0'01—0'05! *p. d.* — 0'20! *p. die* w proszk., pig., past.; zewn. do maści (0'50—5'0:25—50), do maści ocz. (0'10—0'50:10—25). 1'0 = 5 kr.
- **kalium sulfurosum** nie tworzy stratu z białk. polec. do wstrz. nodskórnych (0'25:10,0 z tego $\frac{1}{2}$ 1 strzykawki *p. d.*
- **nitricum oxydat.** 1'0 = 3 kr. i **H. nitricum oxydulat.** 1'0 = 3 kr. od 0'004—0'015 *p. d.* — 0'06 *p. die* w pig., rozpuszcz., do maści (Ung. Hydrarg. citrini). do wcierań.
- **oleinicum** do wcierań 0'50—2'0 *p. d.* 1—2 r. dz. (czasem z morfiną). 1'0 = 3 kr.
- **oxycyanatum** do podsk. zastrzyk. (1'25:100 z tego jedną zastrzyk. *p. d.*) b. silny antiseptyk.
- ***oxydatum flavum** (via humid. parat.) 0'006—0'03! *p. d.* 1—2 r. dz. — 0'10! *p. die* w proszk., pig.; zew. jako zasypka czysty l. z innymi środkiem do nosa, krtani (1:8—50 sacch.), do ocz (1:5—10 sacch.), do maści (0'50—1'0:10—20), do maści do ocz (0'10—1'0:10—20). 1'0 = 4 kr.
- **oxydat rubrum** (Merc. praecip. rubr.). 1'0 = 4 kr. tak samo jak poprzedni. **Unguent. ophthalmicum** (Hydr. oxyd. flav. 0'10:50 Axung.).
- **oxydulat. nigr.** (Merc. solub. Hahnemani) 0'03—0'20 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszk., pig.; do maści (1'0—5'0:25). 0'10 = 1 kr.
- **peptonatum liquid.** do podskór. wstrzyk. 1'0 = 4 kr.
- **phosphoricum oxydat.** 0'01—0'06 *p. d.* stopniowo w górę postępuj. w pig., proszk. 0'10 = 1 kr.
- **praecipit. album** zob. H. bichloratum.
- **salicylicum** trudno rozpuszcz. w wodzie zwykłej, łatwo w wodzie z dodatkiem soli; jako antiluet. wew. w pig. 0'01—0'05 *p. d.* 2—3 r. dz., do zastrzyk. podskór., śródmięśniowych (H. sal., kali carbon. $\bar{a}\bar{a}$ 0'10:10 aq.). do okładów na owrz. syf. (0'5—3'0:1.000. 1'0 = 7 kr.
- **sulfoichthyolicum** (składa się Natr. sulfoichtyol. 10, Hydr. bichl. corrosiv. 3) zob. Ichtyol.
- **sulfuratum nigr.** (Aetiops mineral) 0'10—1'0 *p. d.* 2—3

r. dz. w pig., proszk. 1·0 = 2 kr. — **H. sulfarat. rubr.** (cynober) wewn. taksamo, zewn. do maści, nakadzań i t. d. 10·0 = 10 kr.

***Hydrargyrum tannicum oxydulat.** 0·05—0·10 *p. d.* 2—3 r. dz. (łatwo resorbuje się) w pig., proszk., czasem wspólnie z acid. tannic. l. opium. 1·0 = 8 kr.

***Hydrastis canadensis** (radix-rhizoma) haemostat. 10·0 = 8 kr., najczęściej używ. ***Extr. fluid. hydr. canad.** 0·30—2·50! (5—45 kropli) *p. d.* co 2 godz. aż do 10·0 *p. die* z winem, syrup. l. mixt. 10·0 = 13 kr. — **Extr. hydr. canad-rad. siccum** 0·35—0·25 *p. d. k. r. d.* — 1·0 = 10 kr. **Hydrastinum hydrochloricum** (Alkaloid) 0·03—0·10 *p. d.* — 0·20 *p. d.* w proszk., pig. 0·10 = 20 kr. — **Hydrastininum hydrochlor.** wew. 0·10—0·60 *p. d.* polecany w krwot. macicy; w krwotokach płucnych; w padaczce 0·01—0·02 *p. d.* 0·05—0·1 *p. die* zewn. do maści (0·50—2·0:5 Vaselini). 0·10 = 35 kr.

Hydrochinonum 0·20—0·80! *p. d.* — 1·0 *p. die* w rozp. w proszk.; zewn. (1—2⁰/₀) do przestrzyk. przy gonorrh., podskórn. (10⁰/₀ rozczyń), do maści (1·0:30). 0·10 = 1 kr.

Hydrogenium hyperoxydat. wew. jako **Aq. hydrog. hyperoxyd.** (woda utleniona) czysta l. z dodatk. kropli acid. muriat. łyżeczk. polecana w błonicy (2⁰/₀), zewn. do opatr., wziewań, płukanie. 10·0 = 3 kr.

***Hydromel infantum** (zaw. inf. lax. Vienn. 30, Syr. mannat 10) łyżeczk. 10·0 = 5 kr.

Hydonaphtholum stosowane jak Naphtol.

Hydroxylaminum mur. wewn. w 1⁰/₀ rozczyń. w dermatoterapii. 1·0 = 15 kr.

***Hyoseyami folia** (herba) wew. 0·05—0·30! *p. d.* — 1·0! *p. die* w pig., proszk., zew. do okładów, lewat. (inf. 2·0:100), wziewań (0·50—2·0:500), do okładów, papierosów; 10·0 = 3 kr. — ***Extract. hyoseyami** 0·02—0·10! *p. d.* — 0·50! *p. die* w proszk., pig., mixt., zew. do przestrzyk. (1·0—3·0:100), wziewań (0·05—0·30:100), do kąpieli (100—200 na kąpiel), do lewatyw (0·05—0·20 na lewat.), do liniment, maści (1·0—2·0:10), do czopków. 1·0 = 7 kr. — ***Ol. hyoseyami fol. coct.** 1·0—2·0 *p. d. k. r. d.* do nacierań, lewat. (5·0—30·0 na lewat.) 10·0 = 4 kr. — **Semen hyoseyami** 0·05—0·20 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig. 10·0 = 3 kr. — **Hyoseyaminum crystallis.** (alkaloid) wewn. 0·0005—0·001—0·003 *p. d.* — 0·005! *p. die* w proszk., pig., rozpuszcz., do zastrzykiw. podskórn. (0·001—0·003 jako hypnoticum), umysłowo chorym 0·003—0·005; do maści (1·0—3·0:10). 0·01 = 18 kr. — **Hyoscinum muria-ticum** 0·01 = 20 kr. — **H. hydrobrom.** 0·01 = 15 kr. — **H. hydrojodicum** 0·01 = 20 kr. wew. 0·0002—0·0007 *p. d.* — 0·001! *p. die* w pig., polecany do uspokojenia umysł. chorych; jako midriaticum (0·01 = 100 aquae), równy w dział. Scopolaminie.

Hypnalum (Monochloralantypirin) kryształki bez smaku, zapachu, łatwo rozp. w wodzie, jako hypnoticum 1·0—2·0 *p. d.* także u dzieci 1·0 = 40 kr.

Hypnonum (Acetphenon) 0·20—0·50 *p. d.* w kapsułk., perełk., (po 0·05 z dodatkiem gliceryny lub Ol. amygdal) w syropie, mixturze. 1·0 = 15 kr.

***Ichtyocolla** zob. Gelatin. animal.

Ichtyolum (Ammonium sulfoichthyolicum) b. rzadko wewn. używ. 1·0 *p. d.*—4·0 *p. die*, najczęściej zewn. do maści (40%, u dzieci 10%), do podsk. zastrzyk. (0·10:10 Aqu.). 1·0 = 5 kr.

Lithium sulfoichtyol. 1·0 = 9 kr. — **Natium sulfo-**

ichtyol. 1·0 = 7 kr. — **Zincum sulfoichtyol.** 1·0 = 8 kr.

Hydrarg. sulfoichthyolic. wewn. w roztworze wodn. 15—20 kropli *p. d.* k. r. d. w chorob. przewodu pokarm., oddech., moczowego, zewn. do penzlow. maści 1:50) itd.

Ingluvinum stosow. jak pepsinum. 1·0 = 25 kr.

***Ipecacuanhae radix** 0·005—0·05 *p. d.* jako expect. styptic. diaphoret. cholag. itd.; 0·30—1·0 *p. d.* jako emetic. w proszk., pig., macer., infus (0·10—1·0:100—200 col. jako expector.; 1·50:100—200 col. jako emetyk) do lewat. w infus. (1·0—2·0:100). 1·0 = 5 kr. — **Extr. ipecacuanh.** 0·05—0·20 w proszk., pig., rozpuszcz. — ***Pulvis ipee. opiatu** (**Pulv. Doveri**) zob. opium. — ***Syrupus ipecac.** corrig. i adjuvans, czysty łyżeczk. jako expector. lub łyżkami jako emetyk. 10·0 = 1 kr. — **Tinct. ipecac.** 5—15 kropli *p. d.* — 50 kropli, jako emetyk. — ***Trochisci ipecac.** (zaw. ipecacuanh. 0·005) 1—3 szt. jako expector. 10 szt. = 6 kr. — **Vinum ipecac.** kroplami (do 30) jako expect.; łyżeczk. jako emetyk. 10·0 = 16 kr.

***Iridis florent. rad.** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. jako expector, często jako constit. do pig., corrig. itd. 10·0 = 7 kr. — **Iridis versicolor. rad.** 0·50—4·0 *p. d.* k. r. d. — **Extract. fluid. irid. vers.** 5—15 kropli *p. d.* — **Iridinum** 0·05—0·20 w pig. 0·01 = 5 kr.

Jaborandi folia wewn. infus. (3·0—6·0—8·0!:100—200 coll.); do lew. infus. (3·0—10·0:100—200 coll.). 10·0 = 8 kr.

***Jalapae tubera** 0·05—0·30 *p. d.* k. r. d. jako rozwałn., 0·30—0·50 *p. d.* jako purg., 1·0—30 *p. d.* jako drastic. na raz lub in dosi refracta w proszk., pig., powidełk. 10·0 = 10 kr. —

***Resina jalap.** 0·03—0·20 *p. d.* k. r. d., 0·30—0·60 *p. d.* 1—2 r. d. (jako drasticum) w proszk., pig. 1·0 = 15 kr. — **Sapo jalapinus** (składa się z Resina jalap., Sapo medic. āā 4) 0·30—2·0 *p. d.* k. r. d. czyste lub z calom., z aloe itd. **Pilulae jalap.** (Jalap 1 Sapo jalap. 3) 2—10 szt. na raz, jako purg.; **Pilulae laxantes** zob. Aloë. — **Tinct. resinae jalapae** 10—30 kropli *p. d.* k. r. d. 10·0 = 8 kr.

Jambul (owoc z drzewa Syzygium jambolanum) polecany w diabetes, w proszku 20·0—40·0 sproszk. dziennie albo jako **Extr. Syzygii Jambolani fluid.**; jako **Tinct. Jamb.** kroplami 10·0 = 30 kr.

Jequirity zob. Abri praecat.

***Jodoformium** wewn. 0·02—0·20! *p. d.* — 1·0! *p. die* w proszk., pig., kapsułk., w rozpuszcz. w eterze, także perełki jodoform. (0·25 rozp. w eterze); zew. czysty, jako zasypka na rany (5·0!), do wdmuchi-

wań czysty (lub z cukrem), rozpuszcz. w oliwie, alkoh., eterze, glyceryn., do nacierań, zakraplań, penzlow., tampon. (1:20 Glycer.) jako spray (z eterem), do lewat. (1:50 białka), maści (1—5:30), do czopków (0'50—1'0), świeczek, gaza jodoform., wata jodoform. 1'0 = 6 kr. — Do odwonienia jodof. używamy Bals. Peruv., faba tonca, acid. carbol., acid. tannic. itd.

Jodolum (Tetrajodpyrrol) żółtawy proszek, trudno w wodzie rozpuszcz. zawiera 80% jodu, wewn. jako antiluet. 1'0 p. d. zewn. jak jodoform. 1'0 = 18 kr.

***Jodum** wewn. 0'005—0'03! p. d. 2—4 r. dz. — 0'10! p. die w proszk., pig. lub rozpuszcz. w alkoh., eterze, glycer., w wodnym roztworze Kali jodat.; zew. do wziewań (0'02—0'05:500 Aqu., K. Jod. 1'0) rozpylony lub jako para (z waty) — do papieros., płukanka do ust, gardła (1:100—500), woda do ócz (0'05:100), do okładów, zmywań (2'0—5'0:100), do kąpieli (5'0—15'0 na kąpiel + 10'0—20'0 K. Jod.), do przestrzyk. (0'05—0'50 Jodi, 2'0—2'50 K. Jod., 30'0—100'0 Aqu.), do maści (0'50—1'0:10—20) do liniment., plastr. (0'50—2'0:50); w roztworach zgęszcz., wodn., glycer., jako środek żrący. 1'0 = 6 kr. — **Solutio jodi Lugoli causticum** (składa się jodi 1, K. Jod. i Aqu. āā 2) i **Glycer. jodi caust.** (składa się z Glycer. 2'0, Jodi, KJ. āā 1'0) oba jako środki żrące. — ***Tinct. jodi** (Jodi 1, Alcoholi 16) wewn. 0'10—0'30! p. d. — 1'0! p. die; zewn. do penzlow. skóry, błon śluz., czysta (lub z coll., glycer.) do okładów (1'0—5'0:25 Aqu.) do zakrapl. (0'50—1'0:100—200 Anq.), do lewat. (1'0:10—20 Aqu.), do płukań, wziewań. 10'0 = 11 kr. — **Tinct. jodi aether.** (Jodi 1, Aether 12). 1'0 = 2 kr. — **Tinct. jodi fortior** (Jodi 1, Alcoh. 8).

Jodum tribromatum w rozez. 1:300 polec. do rozpylań w błonicy. 1'0 = 12 kr.

Jodum trichloratum wewn. z roztworu 0'10:120—150 łyżeczk., w dyspeps.; zewn. do przestrzyk. w blenorh. (0'10:120) 1'0 = 18 kr.

Juglandis regiae folia (antiscropholos.) wewn. w decoct. 5'0—15'0:150) także jako species, zewn. jako zasypka, do prz. strzyk. w infus. — do kąpieli) 300'0—500'0 na kąpiel. 100 = 9 kr. — **Extract. juglandis** 0'20—1'50 p. d. k. r. d. 1'0 = 4 kr. — **Juglandinum** 0'10—0'25 p. d. k. r. d.

***Juniperus fructus** (baccae juniperi) wewn. 1'0—2'50 p. d. k. r. d. w proszk., pig., powidelk., w infus. (10'0—15'0:150 col.) zewn. do wziewań, nakadzań, kąpieli (w inf. 150'0—200'0:1500). 100 = 10 kr. — ***Ol. Juniperi** 2—6 kropli p. d. k. r. d. zewn. do nacierań, maść. 1'0 = 2 kr. — ***Roob Juniperi** łyżecz. czysty lub w mixt. 10'0 = 8 kr. — ***Spirit Juniperi** stosown. jak poprzed. 10'0 = 3 kr. — ***Unguent. Juniperi.** 10'0 = 6 kr.

Kalium causticum fusum zob. Kalium hydrooxydat. fus. — **aceticum siccum** 0'50—4'0 p. d. k. r. d. w rozpuszcz.

pig., także do wachania. — ***K. aceticum solutum** (Liq. kali acet.) 2·0—12·0 *p. d.* k. r. d. — 30·0 *p. die*, czysty lub w mixt. 10·0 = 6 kr.

Kalium arsenicosum solut. (Liq. kali arsen.) zob. Acid. arsenicos.;

— **bicarbonicum** 0·20—1·50 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., limoniad. burzących; zewn. jako woda do ust (2·0—10·0:100), do przestrzyk., lewatyw. 10·0 = 5 kr.

— **bichromicum** (K. chromic. rubrum) b. trujący, wewn. rzadko używ. (0·01! *p. die*) zewn. jako środek żrący przy owrzodzeniach nowotworów, w 5% rozc. przeciw poceniu się nóg. 10·0 = 2 kr.

— **bromatum** wewn. 0·30—2·0 *p. d.* 2—4 r. d. 5·0—10·0! *p. die* (także 1·0—2·0 *p. d.* co godz. w epilepsji) w proszk. lub rozpuszcz.; zew. do maści (1·0—5·0:10), czopk., penzłow., (1:5), wziewań (1·0—10·0:500), przestrzyk. w blennorrh. (K. bromat. 1, glycer. 2, Aqu. 20), do lewat. (2·0—5·0:100) 10·0 = 7 kr.

— **carbonicum** (purum e tartaro) wewn. 0·10—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. — 5·0—10·0 *p. die* rozpuszcz. lub w saturacyi (1·0:15 octu. lub succ. citri); zewn. jako woda do ocz (0·05—1·0:100) do wziewań (1·0—5·0:500). 10·0 = 5 kr. — ***K. carbon. crudum** tylko zew. do kąpieli (100·0—500·0 na kąp.). 100 = 11 kr. ***K. carbon. solutum** (Liq. k. carbonici) zewn. do okładów, miejscowych kąpieli (2·0—25·0:1000), do przestrzyk., lewatyw, maści (1·0—5·0—10). 10·0 = 3 kr.

— **chloratum** 0·20—5·0 *p. d.* k. r. d. w proszk. lub rozpuszcz. 10·0 = 3 kr.

— **chloricum** wewn. 0·10—1·0! *p. d.* k. r. d. — 8·0! *p. die* (u dzieci z większemi dawkami b. ostrożnie, najwyżej 1·0—2·0 *p. die*) w rozpuszcz.; zewn. jako płukanka do ust, gardła. (2·0—5·0:100), do wziewań (1·0—10·0:500), penzłow. (1·0:5—10 glycer. lub syropu), przestrzyk., okładów. 10·0 = 4 kr.

— **chromicum neutrale** wewn. 0·10—0·60 *p. d.* k. r. d. w rozpuszcz.; zewn. w roztworze zgęszcz. jako środek żrący. 10·0 = 3 kr.

— **cyanatum** wew. 0·01—0·03! *p. d.* w rozpuszcz., także zew. do maści, opatr. 1·0 = 6 kr.

— **dichromicum** stosow. jak K. chromicum.

— **ferrocyanatum** 0·5—1·0 *p. d.* jako sedativ, antineuralg. 10·0 = 12 kr.

— **hydrooxydatum fusum** (Kal. caustic. fusum — lapis causticus chirurgorum) wew. 0·01—0·15 *p. d.* 2—3 r. dz., rozpuszcz. w alkohol. (Tinct. kalina); zew. jako środek żrący in subst., woda do ocz (0·05—0·10:25), do zmywań, opatrunk. (2—4%), kąpieli miejscowych i ogólnych (30·0—100·0 na kąpiel). 10·0 = 10 kr. — **Liquor Kali caustici** wew. $\frac{1}{2}$ —4 kropli (0·02—0·40); zew. jak poprzedzający, tylko w dawce dwa razy większej.

— **hydrotartaricum** (Tartarus depuratus, Cremor Tartari) wew. 0·50—2·50 *p. d.* k. r. d., jako laxans 4·0—8·0 *p. d.* 1—2 r. dz., w proszk., powidłach, kęsach, mixt.; zewn. jako proszek do oczów, zębów; do kąpieli (60·0—100·0 na kąpiel).

10·0 = 6 kr. — **Serum lactis acidum** (K. hydrotart. 1·0:100 Serum lactis) łyżeczk.

***Kalium hypermanganicum** (permanganicum) **crystal-lisatum** rzadko wew. po 0·05—0·15 *p. d.* 2—3 r. d. rozpuszcz. w wodzie; zew. w ropuszcz. (0·50—1·0:200) jako desinficiens, jako płukanie do ust, gardła (łyżkę 1% roztworu na szklanke wody), do wzięwań, rozpyl. ($\frac{1}{2}$ —1%), do penzlow. (5—10%), zastrzyk. podskórn. (1%), polecane przeciw ukąszeniu wę-
żów jadowitych. 1·0 = 1 kr.

— **hypochlorosum solutum** (Aqua Javelli) tylko zew. 100·0 = 12 kr.

— **jodatum** wew. 0·10—0·50 *p. d.* k. r. d. — 5·0—15·0 *p. die*, rozpuszcz. l. w pig.; zew. do wzięwań i rozpylań, do płu-
kania ust, gardła (0·50—5·0:100), do okładów (1·0—2·0:100), do kąpieli miejscow. i ogólnych, do nacierañ (5·0—15·0:100 spirit.), do maści (1·0—5·0:20—25), do zastrzyk. podskórn., miąższ. (0·50—2·50:500 1—2 strzykaw. 1—3 r. dz.). 10·0 = 34 kr. — **Ung. kali iodati** (składa się Kali jod. 20, Natr. thyosulf. 0·25, Aq. 15, Adeps suil. 165).

— **natrio tartaricum** (Tartarus natronatus, sal Seignetti) wew. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w proszk. l. rozpuszcz.; jako lax. 15·0—50·0 w kilku dawkach, także w lewatyw. (15·0—30·0 *p. d.*). 10·0 = 3 kr.

— **nitricum** (purum — saletra oczyszczona) wew. 0·20—1·0 *p. d.* — 10·0 *p. die* w rozpuszcz., proszk.; zew. jak K. chlo-
ricum. 10·0 = 3 kr. — **Nitrum tabulatum** (Sal Prunellae) kołaczyki zaw. 0·20 K. nitr. charta nitrata.

— **osmicum** 0·001 *p. d.* — 0·01 *p. die* w pig., podskórn. 1% roztworu. 0·10 = 50 kr.

— **permanganicum** zob. K. hypermanganicum.

— **silicium** (szkło wodne) wew. 0·50—1·0 *p. d.* 2 r. dz. w roz-
puszcz.; zew. w bólu zębów itd., do opatrunk. 100·0 = 15 kr.

— **stibio tartaricum** (Tartarus stibiatus, T. emeticus) wewn. 0·005—0·02 *p. d.* k. r. d. (expect. diaphoret. itd.), 0·05—0·10—0·20! *p. d.* co 10—15 minut (emetic.) w proszk., rozpuszcz., pastylk., mixt.; zewn. do opatr., okład. (0·05—1·0:100) jako woda do ócz (0·10—1·0:100), do wcierań (10%), lewat. (0·10—0·30:50—150 Aqu.), do zastrzyk. przy blennor. (0·10—0·20:100) do czopk. (0·10—0·30:5—10 B. Cacao), maść (0·10—0·50:10) do maści drażniących (1·0—2·0:10). 1·0 = 2 kr. — **Ung. Autenriethi** (Tartar. stib. 2 - Ung. paraff. 8). — **Vinum stibiatum** (1:250 Malag.) 10—40 kropli *p. d.* k. r. d.; jako wymiotne 15·0—40·0 *p. d.* 10·0 = 10 kr.

— **sulfuratum** (Hepar sulfur. kalinum) wewn. 0·05—0·40 *p. d.* 2—4 r. dz. w pig., rozpuszcz., mixt. zewn., do zmywań (5—15%), maści (1·0:5—10). 10·0 = 12 kr. — **Kal. sulfur. pro balneo** zewn. jak poprzedni, do kąpieli (30·0—150·0 na kąpiel), 100 = 16 kr.

— **sulfuricum** wewn. 0·50—2·50 *p. d.* k. r. d. — 8·0—15·0 *p. die* jako lax. w rozpuszcz. l. proszku.

— **tartaricum** (Tartarus tartarisatus) wewn. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. (jako diuret.) — 20·0 *p. die* w proszk., rozpuszcz., mixt. 10·0 = 10 kr.

— **tartar. boraxatum** stos. jak poprzedni. 10·0 = 15 kr.

— **telluricum** 0·02—0·04 *p. d.* w pigułk. na noc przeciw nocnym potem suchotników 0·1 = 30 kr.

***Kamala** łupka z owocu mallotus philip. wewn. 8·0—12·0 *p. d.* rozrta z wodą lub w powidełk., mixt. 1·0 = 3 kr.

Kava-Kava (Rad. piperis methystici) inf. i decoct. 4—6⁰/₁₀.

Kephir 300·0—1000·0 na raz przed l. po jedzeniu.

Keratinum używ. do obciągania piguł., które mają przejść żołądek niestrawione. 1·0 = 30 kr.

Kolanuces (zawiera Coffeinum) inf. (50·0—100·0:100—300 coll.).

***Kosso** (Kusso) wewn. 20·0 w 2 dawk. co $\frac{1}{2}$ godz. w mixt. lub tabletk. 10·0 = 12 kr. — **Kossinum crystal.** wewn. 0·50—1·0 *p. d.* (2—3 r. dz. co $\frac{1}{2}$ —1 godz.) w proszk., pig. 0·10 = 25 kr.

Kreolinum zob. Creolinum.

Kreosotal (Kreosot. carbonicum Heydeni) płyn gęsty do miodu podobny, zaw. 92⁰/₁₀ kreosotu, bez zapachu, nie szczypiący, nie drażni żołądka. 2·0—5·0 *p. d.* w tranie lub (dzieciom) w emulsyi. 1·0 = 8 kr.

***Kreosotum** wewn. 0·01—0·10! *p. d.* — 0·50! *p. die* w pig., kapsułk., mixt., zewn. w substancyi podobnie stosow. jak acid. carbolie, do okład. (Aqu. kreosoti) do maści (1·0:10). 1·0 = 2 kr.

Kresinum $\frac{1}{2}$ —1⁰/₁₀ rozczyzn. zewn. jako desiniciens. 1·0 = 1 kr.

Kumys napój przyrządzany z mleka kłaczy kirgizkich, także z innego mleka.

Lactuae virosae hb. 10·0 = 3 kr. jako **Extr.** 0·03—0·60! *p. d.* — 2·50 *p. die* w pig. 1·0 = 9 kr.

Lactophenin chemicznie powinowaty z phenacetinem — antineuralg. (ischias), także hypnot., proszek kryst. mało w wodzie rozpuszcz. 0·50—0·80—1·0 *p. d.* — polecany w durze brzuszny u dzieci. 1·0 = 10 kr.

***Lactucarium** 0·03—0·30! *p. d.* — 1·0! *p. die*, (jako hypnot. 0·50 *p. d.* — 2·0 *p. die*) w proszk., pig., emuls.; zewn. do collyr. (0·10—0·30:25). 1·0 = 5 kr. — **Extr. Lactuae virosae** 0·03—0·06 *p. d.* jako narcot. i hypnot. 1·0 = 9 kr.

Laminaria (digitata) używ. do rozszerzania ujścia macicy itd. 1 pręcik = 30 kr.

***Lanolinum** (tłuszcz obojętny) do maści, jako constit. 10·0 = 8 kr. — **Lanolinum anhydricum** (bezwodn.) żółtawą masą, przezroczystą, stosow. tak samo. 10·0 = 10 kr.

Lapides cancerorum zob. calcium. carbon.

Lauri folia stos. jak folia aurantior 100 = 10 kr. — ***Lauri fructus baccae** 0·20—1·50 *p. d.* w proszk., w infus. (5·0—20·0:100 coll. 100 = 15 kr. — ***Ol. Lauri** do maści, liniment, 10·0 = 3 kr.

***Lavandulae flores** do rozmaitych species, kąpieli i t. d. 10·0 = 7 kr. — ***Ol. Lavandulae** do maści, liniment. itd

1·0 = 3 kr. — ***Spirit. Lavandulae simplex** 10·0 = 5 kr.
Spir. Lavandulae compos. do wachania, nacierań,
 zmywań itd.

Leptandrae virginicae radix i więcej używane **Extract.** 0·50—4·0 *p. d.* czyste l. w mixt. (laxans l. drastic.). —

Leptandrinum 0·015—0·12 w pig. jako laxan. 1·0 = 20 kr.

Levistici radix wewn. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. infus., (10·0—15·0:150) jako diuret. 10·0 = 4 kr.

***Lichen islandicus** wewn. 15·0—30·0 *p. die*, jako species, decoct. (5·0—10·0:100 l. galareta (1·0:3—6). 100 = 10 kr. —

Lichen pulmonarius i **L. island.** ab **amaritiae liberat.** stosow. jak poprzed. ***Gelatina lich. island.** 100 = 60 kr. i ***pulverata** 10·0 = 10 kr.

Lignosulfit plyn gęsty, ulatniający; do wdychiwań w przewł. chorob. płuc. 1 flaszka = 1 zlr.

Lignum campechianum decoct. (5·0—15·0:100), **Extract.** **l. C.** 0·50—1·0 *p. d.* k. r. d. 1·0 = 2 kr.

— ***Quassiae** wewn. 1·0—2·0 w proszk., infus., l. maceracyi (3·0—15·0:100 wina). 10·0 = 5 kr. — **Cort. Quass.** 10·0 = 2 kr. stos. tak samo. — ***Extr. Quass.** 0·2—0·6 *p. d.* k. r. d. w pig., mixt. 1·0 = 13 kr. — **Tinct. Quass.** 20—50 kropli *p. d.* i **Quassinum** 0·02—0·10 *p. d.* 2—3 r. d. 0·10 = 15 kr.

— ***Santali rubri** zew. do nakadzań, proszk. do zębów itd. 10·0 = 1 kr. — ***Ol Santali ostindicum** 0·03 *p. d.* — 2·0 *p. die* w kaps. (jak bals. Copaivae). 1·0 = 5 kr.

— **Sassafras** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. zwykle w decoct. (10·0—30·0:100—300 coll.) tak samo **Cort. l. S.** — **Ol. l. S.** 1—5 kropli k. r. d. 1·0 = 2 kr.

***Lini semen** wewn. w decoct. (5·0—30·0:100—300 col.), zew. w decoct. do lewat., przepłuk., przestrzyk.; do kataplasm. 100·0 = 18 kr. — ***Placenta sem. lini.** 100·0 = 6 kr. — **Farina sem. lini.** ***Ol. lini** do lewat., nacierań, maści. 100·0 = 12 kr.

***Linimentum ammoniatum, L. ammoniato camphor.** zob. Ammonia.

— ***saponato camphor.** (Opodeldoc) zewn. do nacierań. 10·0 = 4 kr.

Lipanium stos. jak Ol. jecor. aselli. 10·0 = 15 kr.

***Liquiritiae radix** wewn. w proszk., do spec., infus., jako consp., corrig. i t. d. 10·0 = 5 kr. — ***Extr. liquir.** jako corrig., constit., expect. 10·0 = 18 kr. — ***Succes liquir. depuratus.** 10·0 = 7 kr. — ***Gelatina Liquir. pellucida.** 10·0 = 6 kr. — ***Pasta liquir. flava.** 10·0 = 6 kr. — ***Pulv. liquir. compositus** (Fr. foenicul., Sulf. depurat. āā 1, Rad. liquir., fol. Sennae āā 2, Sacchari 6). 10·0 = 8 kr. — **Syrup. liquir.**

***Liquor acidus Halleri** 3—20 kropl. (0·30—1·0) *p. d.* k. r. d. czysty l. w mixt. (1·0—5·0:100), jako napój (5·0—10·0: litr), do penzlowań (1·0:10·0) = 10·0 = 5 kr.

Lythargyrum zob. Plumb. oxyd. fusum.

Lithium benzoicum 0·05—0·20 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., rozpuszcz., do wziewań (0·50—2·00:100). 1·0 = 6 kr.

- Lithium bromatum** 0·20—5·0 *p. d. k. r. d.* w rozpuszcz. 1·0 = 6 kr.
- ***carbonicum** wewn. 0·05—0·30 *p. d. k. r. d.* — 2·0 *p. die* w proszk., pastyl., rozpuszcz. (Aqua lith. carbon. 0·15:100 Aq.), w sztucz. wod. mineral. (z Kal. l. natr. bicarb.); zewn. do płukań, wziewań (1—3%). 1·0 = 6 kr.
- **citricum** tak samo.
- **salicylicum** biały kryst. proszek bez zapachu, smaku słodkaw., łatwo rozpuszcz. w wodzie, winie; wewn. 0·50—1·0 *p. d.* 3—4 r. d. w proszk. l. rozpuszcz. 1·0 = 4 kr.
- **sulfo-ichtyolicum** zob. Ichtyol.
- *Lobeliae inflat. hb.** wewn. 0·20—0·50 *p. d.* (jako emet. 1·0—5·0 *p. d.*), częściej w decoct. (2·0—6·0:100). 10·0 = 4 kr. — **Extract. fluid. lobel.** 5—20 kropl. *p. d.* 1·0 = 10 kr. — ***Tinct. lob. infl.** 0·50—1·0! *p. d.* — 5·0! *p. die* czysta l. w mixt. 10·0 = 6 kr. — **Lobelinum** płyn żółty oleisty i częściej używ. **Lobelinum sulphur.** 0·02—0·06 *p. d.* — 0·20 *p. die* w asthmie zamiast tinct. lob. mało wypróbowany.
- Loretin** proszek żółty, krystal., nietrujący, bez zapachu, polecany zam. jodoformu. jako zasypka z talcum, amylum, 1·0 = 10 kr. **Bismuthum loretinie.** środek antysep. osuszający, jako zasypka w conj. phlyct. i t. d. wewn. po 0·5 w rozwolnieniach.
- Losophan** (Trijodkresol) zaw. 80% jodu, białe krystal. igielki rozpuszcz. w chlorof., eterze, stosow. w chorob. skóry (herpes tons., pitiriasis, eczema. w maści (3·0—5·0:100), w zasypce. 0·10 = 5 kr.
- *Lupulinum** 0·10—1·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., rozpuszcz., w maści (1·0:2—5). 1·0 = 3 kr.
- Lycetol** (dimethylpiperazin) wewn. 1·0 *p. d.* 3 razy dnia posiada podobne własności jak piperazina. 0·1 = 8 kr.
- *Lycopodium** wewn. 0·50—3·0 *p. d.* w mixt. (5·0—10·0:100), w powidł.; zew. jako consperg. 10·0 = 7 kr.
- Lysidinum** rozp. w wodzie trochę cuchnące ciało kryst. (w handlu zwykle 50% rozc.) wewn. 1·0—5·0 *pro die* w rozpuszczeniu w nasyconej w wodzie; rozpuszcza kw. moczowy stos. w dnie 1·0 = 35. Częściej używany stały przetwór:
- **Lys. bitartaricum** 3·0—15·0 *pro die* 1·0 = 30 kr.
- Lysol** płyn przezroczysty, oleisty, zapachu kreosotu, własności kw. karbolów., mniej trujący, do opatr. (1/2—1%) 10·0 = 4 kr.
- *Macis** 0·20—0·50 *p. d.* w proszk., pig.; jako corrig. 10·0 = 11 kr. — ***Ol. macid.** 1—2 kropl. *p. d.* w rozpuszcz., w eterze. 1·0 = 5 kr. — **Tinct. m.** 10—20 kropl. *p. d. k. r. d.* 10·0 = 7 kr.
- *Magnesia usta** zob. Magn. oxydata.
- *Magnesium carbonicum hydrooxydat.** (Magn. carbonica alba) 0·20—2·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., tablet., mixt., w wodzie (Aq. magn. carbon.); zew. jako proszek do zębów, zasypka. 10·0 = 5 kr. — **Pulvis Magnes. c. Rheo** stosow. tak samo.
- ***citricum** łyżeczk. we wodzie l. limoniadzie. 10·0 = 20 kr. — ***Magn. citr. effervesc.** (składa się Magn. citr., Natr.

bicarb., acid. citric. i sacchar.). 10·0 = 10 kr. — ***Potio magn. citr. effervesc.** (20·0) 1 doza = 56 kr. — **Magn. boro citricum** 10·0—25·0 *p. d.* in dosi refracta w proszk. l. rozpuszcz. 1·0 = 2 kr

Magnesium lacticum 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. (jako laxans 10·0—12·0 *p. d.*) w proszk., rozpuszcz. 1·0 = 4 kr.

— **oxydatum** (Magn. usta) 0·2—2·0 *p. d.* k. r. d.; (5·0—6·0 *p. d.* jako laxans) w past., tablet., mixt., proszk.; zewn. do proszku do zębów. 10·0 = 15 kr. — **hydrooxydatum** (Magn. hydrica) wchodzi w skład Antidot. arsenici albi; wewn. 0·30—1·50 *p. d.* jako antacidum (2·0—5·0—10·0 *p. d.* jako purg.) w proszk., pastyl., mixt. 10·0 = 4 kr. — **Magn. saccharata** (Magn. oxydat, 10, Syr. simpl. Aqu. āā 80) łyżeczkami, jako środek rozwałn.

— **salicylicum** 3·0—6·0 *p. die* stosow. w durze; (6·0—8·0 *p. d.* jako laxans). 1·0 = 6 kr.

***sulfuricum** (Sal. Seidlitzensis) 1·0—3·0 *p. d.* k. razy d. w proszk. lub rozpuszcz. jako digestiv., w większych dawkach 10·0—50·0 w proszk. rozpuszcz. w wodzie zawierającej Co₂ jako laxans; (do lewatyw 15·0—30·0 na lewatywę) 100 = 10 kr. — ***Magn. sulfar. siccum**, w dawkach nieco mniejszych. 10·0 = 3 kr.

— **tartaricum** 0·50—1·0 *p. d.* w proszk. 2—4 r. dz.

Maïdis stigma decoct. (5·0—15·0:100 col.) jako diuret. —

Extr. fluid. M. st. 0·50—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. 10·0 = 28 kr. —

Extr. M. ustilaginis fluid. stosown. zam. Secale cornut. 10—20 kropli *p. d.* — 4·0 *p. die*. 1·0 = 3 kr.

Malakin (Salicyl-p-Phenetidin) jasno-żółte drobne igielki w wodzie nierozpuszcz. stosowane jako antipyret, anthi-reumat, ma działać dopiero w kilka godzin po zastosowaniu, ostatnimi czasy polecane także jako antheilminticum. 1·0 = 20 kr.

***Maltum Hordei** w proszk. 0·50—1·0, w decoct. (10·0—20·0:100) do płukań, lewat., kąpiei (1—2 klg. na kąpiel.) 100 = 12 kr. — **Extract. Malti** łyżeczk. z mlekiem winem; jako excip. dla różnych środków np. Extr. M. ferrat., jodat. itd. 10·0 = 5 kr.

Malvae folia 100 = 14 kr. i ***Flores M.** 100 = 3 kr. wchodzi w skład species, decoct. (5—15·0:100).

Manganum chloratum 0·10—0·75 *p. d.* w rozpuszcz.; płukanki do ust, gardła (1—4‰). 10·0 = 10 kr.

— **hyperoxydatum nativum** 0·10—1·0 *p. d.* w proszk., pig., do maści (1·0—3·0:10).

— **sulfuricum** 0·10—0·60 *p. d.* 2—4 r. dz. w dawce 2·0—4·0 *p. d.* zażyć w 2—4 dawkach w ciągu kilku godzin jako laxans; do maści (5—10‰). 10·0 = 10 kr.

***Manna** wewn. 4·0—10·0 *p. d.* k. r. d., w dawce 50·0—100·0 (u dzieci 30·0—50·0) jako laxans, w rozpuszcz., w powidełk. 10·0 = 8 kr. — ***Syrup. mannatus** łyżeczkami, jako corrig.

Mastix (Resina Mastich) w dentystyce, także do plastrów. 10·0 = 13 kr.

Matico folia 0·50—2·0 *p. d.* w proszk., pig., w infus. 10·0—

- 30:100). 10·0 = 6 kr. — **Ol. M.** $\frac{1}{2}$ —1 kropli *p. d.* 0·10 = 6 kr.
Tinet. M. 20—40 kropli *p. d.* 2—4 r. dz. 10·0 = 8 kr.
Mel crudum i ***M. depuratum** wewn. 50·0—100·0 *p. d.* czysty lub rozpuszcz. jako laxans, mniejsze dawki jako expector.; zewn. do płukanek ust, gardła, penzlow., katapl., lewatyw itd. 100 = 24 kr. — ***M. rosatum** zewn. do penzl., płukanek. 10·0 = 4 kr.
***Meliloti herb.** do species, plastr. 10·0 = 3 kr. — ***Empl. Meliloti.** 10·0 = 4 kr.
***Melissae folia** infus. (5·0—25·0:160·0); do species, kapieli. 10·0 = 4 kr. — ***Spir. M. compos.** 20—40 kropli *p. d.* k. r. d.; do wachania, nacierań. 10·0 = 4 kr.
***Menthae crispae** 10·0 = 3 kr. i ***M. piperitae folia** 10·0 = 3 kr., stos jak folia Melissae; — ***Ol. M. pip.** wewn. $\frac{1}{2}$ —3 kropli k. r. d. 1·0 = 14 kr. — ***Rotulae M. pip.** 10·0 = 5 kr., — ***Spiritus M. pip.** 20—20 kropli *p. d.* k. r. d. w mixt. (5·0—10·0:100); zewn. do wachania, nacierań. 10·0 = 4 kr. — **Syrup. M. pip.** corrig. 10·0 = 3 kr.
***Mentholum** wewn. w migrenie po 0·30—1·0 *p. d.* także jako antineuralg., anaesthetic. w gruźlicy po 1·0—1·50 5—6 razy dnia w proszk., pig.; zewn. w bólu zębów (nacierań 1·0:5·0—10·0 alkoh.), w formie laseczki (Migrainestift), także do wziewań, penzl. 1·0 = 5 kr.
Methylacetanilid zob. Exalgin.
Methylalum (Methylen, Dimethylaether) rozpuszcz. w wodzie, alkohol., działa w maśc. liniment. (1·0:6—10) kojąco, podskórn. (1·0:4 Aq.) jako nasenny; antidot. dla strychniny. 1·0 = 6 kr.
Methylenblau (przetwór ma być wolnym od chlorkucynku) wewn. 0·1—0·50 w zimnicy — podskórn. 0·02—0·08 w 2⁰/₀ rozczyźnie. 1·0 = 15 kr.
Methylenum bichloratum używany (szczególnie w Anglii) w miejsce chloroformu — skład przetworu niepewny.
Methylum chloratum (Chlormethyl) zewn. do znieczul. miejscowych stos. cienkim strumieniem na miejsce mające być znieczulonem. 1·0 = 6 kr.
Microcidin (Natriumnaphtolicum) proszek w wodzie rozp., antyseptyk nietrujący stosowany w miejsce karbolu. 1·0 = 2 kr.
Migraenin mieszanina antipyryny, coffeiny, kw. cytryn. 1·10 *p. d.* co 2 godz. zwykle 1—2 proszk. przynoszą skutek 1·0 = 20 kr.
Millefolii heb. infus. (5·0—15·0:100) species, zewn. do kapieli, lewatyw. 10·0 = 1 kr. — **Extr. Mill.** 1·0 = 3 kr. — **Ol. Mill.** 1·0 = 20 kr.
Minium zob. Plumb. oxyd. rubrum.
***Mixtura oleoso balsamica** zob. Balsam vitae Hofmanni
***Mixtura sulfurica acida** zob. Liquor acidus Halleri.
Mollinum (składa się z tłuszczu 100, ługu potas. 40, gliceryny 30⁰/₀) constit. do maści, mydek. 10·0 = 8 kr.
Monobromphenylacetamid (Antiseptin) wewn. 0·1—0·25 w pig., proszku ma łączyć własności antifebryny i bromu stos. w gościecu z bólami — sprowadza łatwo sinicę.

Morphinum aceticum 0·03! *p. d.* 0·1! *pro die* 0·10 = 3 kr.
— **hydrobromicum** 0·03! *p. d.* 0·10 *p. d.* polec. w miejsce chloralhydrat.

— ***hydrochloricum** (muriaticum) 0·005—0·03! *p. d.* — 0·12! *p. die*, 2—4 r. dz. w proszk., pig., rozpuszcz.; zewn. do pędzlow. (0·50—1·0:20 — 100) do lewatyw, (0·01—0·03 *p. d.*) do wzięwań, rozpylań (0·02—0·10:100) jako proszek do wdmuchiw. (0·50—1·0:2—10 sacch., gummi arab. etc.), do czopków (0·005—0·02) do maści (1·0—5·0:50), do zastrz. podskórnych i miąższowych (0·005—0·02!). 0·10 = 4 kr. — **oleïnicum** jest to morph. hydrehl. rozpuszczone w Acid. oleïnicum 0·05—0·10:3·0 używ. do wcierań.

— **phthalicum** po podsk. zastrz. 0·10 = 12 kr.

— **sulfuricum** stos, jak mor. hydrochloricum. 0·10 = 6 kr.

— **valerianicum**. 0·10 = 10 kr.

Morhuolum produkt tranu, zawierający w znacznej ilości jod, 0·20 *p. d.* w kapsułk. 4—6 kaps. dziennie dla dorosłych, 2—4 kaps. dla dzieci. 1·0 = 7 kr.

Moschus tonquinensis 0·10—0·30—0·60 *p. d.* co 2—3 godziny (dzieciom 0·01—0·15 *p. d.*) w proszk., pig., powidełk., emulsyi, do lewatyw (0·50—1·0 na lewat.) podskórnie (0·30—0·60). 0·10 = 60 kr. — **Tinct. Mosch.** 20—50 kropli k. r. d. 1 kropla = 3 kr.

Muscarinum 0·0005—0·002 *p. die* w pig. l. podskórnie. 0·01 = 24 kr.

***Myristicae semen**. zob. Nux moschata.

***Myrrha** (Gumi resina) 0·20—0·50—1·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., mixt., zawiesinie; do proszków do zębów, do płukanek ust, gardła, do maści, liniment. 10·0 = 8 kr. — **Extr. m.** tak samo stosowany. 1·0 = 3 kr. — ***Tinct. myrrhae** 10—40 kropli *p. d.* k. r. d.; zewn. do płukanek ust, dardła (5·0—15·0:100), do penzlow. 1·0—3·0:10·0 mel.), do przestrzykiwań (1·0—10·0:100), do maści (1·0:3·0—10·0). 10·0 = 5 kr.

Myrtholum ciecz jasna, dość przyjemnej woni, antysept. stosow. wew. w zgorzeli płuc, bronch. putrida (0·30 *p. d.*) w kapsułk. co 2 godziny. 1·0 = 20 kr.

Napellinum (sedativum) 0·01—0·07 *p. d.* k. r. d. w pig., rozpuszcz., także pośkórnie. 0·01 = 10 kr.

***Naphthalinum purris**. (alcoh. depurat.) 0·02—1·0! *p. d.* — 4·0! *p. die* w proszk., pig., kapsuł., stosow., jako antidiarrhoic. także w durze brzuszny, w niezżytach pęcherza; zewu. w maściach l. rozpuszcz. w oliwie (1·0:10—15), do lewatyw. 1·0—5·0:100). 10·0 = 6 kr.

Naphtalolum zob. Betol.

***Naphtolum** (Izo-Beta naphtol) część składowa dziegciu, polecana w chor. skórnych, zew. w rozpuszcz. w alkohol. (2·0—10·0:100), w maści (1·0—3·0:30·0), w mydłach (2·0—15·0:100). 10·0 = 12 kr.

— **camphoratum** — stos. w gruźley do wstrzykiwań miąższowych w dawce 0·15 w oliwie — także zewn. z cocainą.

Narceinum 0·01—0·10 *p. d.* 2—3 gr. dz. w proszk., pig., rozpuszcz., do lewat., do czopk. (0·01—0·05), także podskórn. 0·01 = 3 kr.

Naregamiae radicis extr. fluid. 0·02—0·05 *p. d.* k. jako expectorans dział. podobne do ipecac.

Natrium aceticum 0·50—4·0 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., w mixtur. 10·0 = 4 kr.

— **aethylicum** pro cauterisatione, środek żrący, stosow. w rozpuszcz. 1·0:3·0:3·0). 1·0 — 8 kr.

— **arsenicum** 0·001—0·002 *p. d.* 1—2 r. dz. w rozpusz. 1. pig., do kąpieli (2·0 -10·0 na kąpiel), do wzięwań. 0·01 = 1 kr.

— **benzoicum** 0·20—1·0 *p. d.* — 15·0 *p. die* w proszk., rozpuszcz., pig., mixt.; zew. do wdmuchiwań, wzięwań (5⁰/₁₀) rozpylań, penzłow.; jako płukanka, woda do ocz. 1·0 — 3 kr.

— ***bicarbonicum** (Natr. carb. acidum, N. hydrocarbonic., Bicarbonas sodae) wew. 0·30—1·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., płacuszki., mixt., saturacyi, w rozpuszczaniu (Aq sodae); zew. do płukań, wzięwań (0·20—2·0:1·00), do kąpieli (150—400 na kąpiel). 10·0 = 2 kr. — ***Pastillae e natr. hydrocarb.**

(Past. Bilinenses s. de Vichy à 0·10. 10 pastyl. = 14 kr. — ***Pulvis aërophorus simplex** (anglicanus) (składa się Natri bicarb. 2·0 i osobno acid. tartarici 1·50). 10 doz = 30 kr. — ***Pulvis aërophorus laxans Seidlitzensis**

(Natri bicarb. 3·0, Sal Seignetti 10·0 i do tego Acid. tartaric. 3·0). 10 doz. = 80 kr.

— **boracicum** zob. Borax veneta.

— ***bromatum** stos. jak Kali bromat. 10·0 = 8 kr.

— ***carbonicum purum** s. crystallisatum stosow. jak Natr. bicarbon. 10·0 = 4 kr. — **Natr. carbon. crudum** zewn. do kąpieli (1/4 kilo — 1 kilo na kąpiel). 100·0 = 3 kr. — ***Natr. carbon. siccum** 0·20—1·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig.; do proszku do zębów, do maści (1·0—2·0:20). 10·0 = 4 kr.

causticum solutum (Liquor natr. caustici) stos. tak samo jak Liquor Kali caustici.

— **chloratum** (sól kuchenna) wewn. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. łyżeczk. rozpuszcz. przy krwiopluciu, w neurozach — także jako antidot.; zewn. do lewatyw (1—2 łyżki na lewat.), do okładów suchych, oziębiających (1 soli, 2 śniegu lub lodu), do kąpieli (1—5 klg. na kąpiel), do wzięwań (1·0—10·0:500). 100·0 = 8 kr.

— **chloricum** 0·50—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., rozpuszcz. (3·0—5·0:100), do płukań, wzięwań jak Kalichlorie. 10 = 6 kr.

— **dithiosalicylum** szary w wodzie łatwo rozpuszczalny proszek, wewn. 0·20 *p. d.* 2—4 razy dnia w gościeu staw. 1·0 = 8 kr.

— **hypochlorosum solutum** (Liquor natrii chlorati Javell'a) 0·20—1·0 (5—15 kropli) *p. d.* k. r. d.; zew. do płukań ust, gardła (3—10⁰/₁₀), do przestrzykiwań (1—5⁰/₁₀), do lewatyw (30—40 kropli), do kąpieli (1/2—1 klg. na kąpiel). 100 = 12 kr.

— **hypermanganicum** jak Kali hypermanganic.

— **hypophosphorosum** (subphosphorosum) 0·50—2·0 *p. die* w rozpuszcz. 1·0 = 3 kr.

- ***jodatum** jak Kali jodatum. 10·0 = 43 kr.
- **la eticum.** 1·0 = 3 kr.
- **nitricum** jak Kali nitricum. 10·0 = 3 kr.
- **nitrosus** 0·05—0·15! *p. d.* rozp. w wodzie (w asthmie, epileps.). 1·0 = 12 kr.
- **paracresotinicum** działanie podobne do acid. salicyl. 1·0—1·50 *p. d.* — 4·0 *p. die*, u dzieci 0·10 *p. d.*, 1·0 *p. die* najlepsze skutki osiągnięto w gastroenteritis acuta u dzieci.
- ***phosphoricum** 0·50—2·0 *p. d. k. r. d.*; 20·0—50·0 jako laxans w proszk. l. rozpuszcz. 10·0 = 7 kr.
- ***salicylicum** wewn. 0·50—1·0 *p. d. k. r.* (w ostr. gościeu stawow. 1·0—2·0 *p. d.* co godzina) u dzieci 3·0! *p. die*, w proszk., pig., rozpuszcz., mixt.; zewn. do przestrzykiwań, lewatyw. 1·0 = 2 kr. — **Nar. borosalicylicum** 0·50—2·0 *p. d. k. r. d.* rozpuszcz. w wodzie l. alkoholu. 10·0 = 30 kr.
- **santonium** wewn. dorosłym 0·1—0·20!; dzieciom 0·05—0·10! zamiast flor. cinæ 1·0 = 10 kr.
- ***silicium** (Liquor natrii silicici) wewn. 0·10—0·25 *p. d. k. r. d.* w pig., rozpuszcz. (w wodach alkalicz.); zewn. do przestrzykiwań (1—2 $\frac{0}{10}$), do zmywań, opatrunk., lewat. 100·0 = 16 kr.
- **subsulfurosus** 0·50—1·50 *p. d.* — 5·0 *p. die* w rozpuszcz. do kąpieli siarczanej. (50·0—150·0 na kąpiel z dodatkiem 30·0—60·0 octu). 10·0 = 1 kr.
- **sulfoichthyolicum** zob. Ichthyol.
- ***sulfuricum crystall.** (Sal mirabile Glauberi) 1·0—2·50 *p. d. k. r. d.* (jako laxans 10·0—50·0 *p. d.*) w proszku, emuls., w wodach mineral. (sztucznych), do lewatyw (10·0—50·0). 100·0 = 11 kr. — **Natr. sulfur. siccum** w dawce o $\frac{1}{2}$ mniejszej. 10·0 = 4 kr. — **Sal thermar. Carolin. artific.** łyżeczkę aż do 15·0 *p. d.* w rozpuszcz. 10·0 = 6 kr.
- **tartaricum** jak kal. tar.
- **telluricum** w dawce 0·05 wewn. lub podskórn. celem zmniejsz. chorobowych potów. 0·01 = 5 kr.
- Nerium oleander** i **Tinct. ner. oleandr.** ma działać podobnie jak Folia digitalis 10—15 kropli *p. d.* 10·0 = 1 kr.
- Neurodinum** antineuralg., antipyretic. 1·0 *p. d.* 1·0 = 20 kr.
- Nicotianae folia** (tytoń) wewn. 0·03—0·15 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., infus. (0·20—1·0:150), do lewatyw (0·50—2·0:100—150 coll.), do kąpieli (15·0—60·0 na kąpiel), do zmywań (5·0—10·0:100); jako woda do ocz. (inf. 0·50—1·0:25). 10·0 = 8 kr. — **Nicotinum** 0·001—0·003! *p. d.* w rozpuszcz. w alkoholu l. w klejkach pokarmach. 0·01 = 2 kr.
- Nitroglycerinum** (Glonoinum) z 1 $\frac{0}{10}$ roztworu alkohol. od 1 do 10 kropli. (0·0001—0·0005) powoli dawkę powiększając, 3 r. dz. przeciw stanom astmatycznym, w połowicz. bólu głowy, także podskórn. (20—30 kropli, 1 $\frac{0}{10}$ alkohol. roztworu : 10 Aquae). 1·0 = 10 kr. Nitr. intabula (*pr. d.* 0·0005) 1 szt. = 4 kr. Nitr. in Martindale (à $\frac{1}{100}$ gr.) 1 szt. = 5 kr.
- **cajeputi rectific.** wewn. 0·05—0·5 *p. d. k. r. d.* w pig. lub rozp. w alkoh. jako antispasm, także jako środek napotny; zewn. 1:10 jako drażniący. 1·0 = 2 kr.

Nitroglycerinum camphoratum drażn. czysty lub jako dodatek do linim., maści. 10·0 = 15 kr.

Nucleinum wyciąg ze śledzion cieląt, proszek bezbarwny, rozpuszczalny w alkaliach, ma posiadać własność pomnażania ciałek białych krwi (leukocytosis); podskórn. (2·0—3·0). 0·10 = 60 kr.

***Nux moschata** (semen Myristicae) stosow. jak Macis w dawkach 2 razy większych. 10·0 = 14 kr. — ***Ol. N. m. expressum** do maści, liniment, plastr. 1·0 = 2 kr.

Oleum amygdalarum zob. Amygdalae.

— **animale aether.** (Dippelli) 5—20 kropl. postępując z dawką w górę, w pig., kapsułk. 1·0 = 3 kr.

— ***Bergamottae** 1—4 kropl. p. d. k. r. d. 1·0 = 3 kr.

— ***Cadinum** zob. Ol. Juniperi empyreumat. 10·0 = 2 kr.

— ***Crotonis** wewn. 0·006—0·025! ($\frac{1}{2}$ —2 kropli) p. d., w pig., proszk., kapsuł., rozpuszcz., w emulsyi; zew. do nacierań (w równych częściach z olejami), do lewatyw (1—2 kropl. : 100—150 emulsyi). 1·0 = 3 kr.

Sapo croton.

— **hydrargyri** (cinereum) gęsty olej złożony z 3 części rtęci utartej z lanoliną i 4 części Ol. olivarium — używany do podskórnych wstrzykiw. przy leczeniu kiły. 0·10—0·15 p. d. 1·0 = 5 kr.

— **Hyoseyami (infusum coctum)**, zewn. do nacierań 10 = 2 kr.

— ***jecoris aselli** 1—8 łyżek (dzieci 1—4 łyżeczk.) p. d. 2—3 r. dz. czysty, w kapsułk., emulsyi, żelatynie, albo z żółtkiem z dodatkiem 10 kropl. Ol. menth. pip.; zewn. do nacierań lewat. jako excip. do rozmaitych środków. n. p. Ol. jecor. as. ferratum, jodoferratum itd. 100·0 = 23 kr.

— ***Juniperi empyreumat.** (Ol. Cadinum). 1·0 = 2 kr. zob. Juniperus.

— ***Olivarium.** ***provinciale** wewn. łyżeczk.; do liniment, emulsyi, ***commune** do nacierań, maści, plastrów, lewatyw. 10·0 = 3 kr.

— **Petrae italicum** zob. Petrol. 100·0 = 30 kr.

— ***Pini pumilion.** zew. do nacierań, wzięwań, rozpylań 10·0 = 17 kr.

— **Rapae** jak Ol. olivar. 100·0 = 10 kr.

— ***Ricini** wewn. $\frac{1}{2}$ —3 łyżeczk. (8·0—30·0) p. d. k. r. d. w mleku, herbacie, kawie, kapsuł., emulsyi, mixt., do lewatyw 1—4 łyżki. 100·0 = 20 kr.

— ***Santali** zob. Lignum Santali. 1·0 = 5 kr.

— ***Terebinthinae** wewn. 5—20 kropl. (0·25—1·0) p. d. czysty w kaps. pig., emulsyi, mixt. (z eterem) jako antidot. w zatruciu fosforem; zew. do wzięwań, płukań, lewatyw (3·0—15·0:150—200 emuls.), do opatr., nacierań, penzl. skóry, maści (1:3—5), do plastr. (1:5—8 żywicy), do mydeł. 100·0 = 13 kr. —

***Ol. Tereb. rectificatum** stos. jak poprz. 10·0 = 2 kr. —

Ol. Tereb. ozonisatum 5—20 kropl. p. d. co 2—4 godz. z miodem l. żółtkiem; zew. jak poprzedni, działa silniej.

- ***Olibanum** (gummi resina) 0·20—1·0 *p. d.* k. r. d. w pig.; zew. do nakadzań, plastr. maści. 10·0 = 5 kr.
- ***Ononidis spin. rad.** wewn. 1·0—3·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., decoct. (10·0—25·0:150), do species. 100·0 = 11 kr.
- ***Opium** wewn. 0·008—0·15! *p. d.* k. r. d. — 0·50! *p. die* w proszk., pig., mixt., emulsyi; zew. w bólach zębów, do kataplast., papierosów, maści (1·0—5·0:10—25), do czopków (0·10—0·20), do gałek pochw. (0·10—0·20), do lewatyw (0·03—0·10 najlepiej w emulsyi). 1·0 = 5 kr. — ***Electuarium Theriaca** (Elect. aromaticum c. opio) $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki *p. d.* 3—4 r. dz. 10·0 = 5 kr. — **Emplastrum opiatum** (odontalgicum, składa się opii 1:20). — ***Extr. opii** 0·005—0·10! *p. d.* — 0·40! *p. die* w proszk., pig., pastyl., rozpuszcz.; do płukanek ust, gardła (0·20—1·0:150), do wziewań, rozpylań ((0·05—0·20:100), do przestrzykiwań (0·10—0·50:50), do lewatyw (0·05—0·10); czopków. (0·05—0·10), do maści (0·50—1·50:10), do podskórnych zastrzyk. (1·0:2—10). 1·0 = 14 kr. — ***Tinct. opii simplex** (thebaica). 1·0 = 1 kr., ***Tinct. opii erocata** 1·0 = 2 kr. (zawiera w 1 gramie 0·01 morfiny) wewn. 0·10—1·50! *p. d.* (3—25 kropli) — 5·0! *p. die*; zew. do płukanek ust, gardła (0·50—2·0:100), do wziewań, rozpylań (0·20—2·0:100) jako krople do zębów, do penzlow. (czysta l. 1·0:1—2 aquae), do ocz. (czysta l. 1·0:1—2 aquae), do przestrzykiwań (1·0—12·0:100), do opatrunków (2·0—6·0:100), do lewatyw (3—20 kropli na lewat.), do maści (1·0—5·0:25). — **Tinct opii benzoica** (składa się: Opium, Acid. benz., camphor., Ol. anisi, spirit. dilut.) 20—60 kropli *p. d.* (1·0—3·0) 2—4 r. dz., dzieciom 5—20 kropli, w mixt., syrop. l. czysta. 10·0 = 20 kr. — ***Pulvis Doveri** (Pulvis Ipecacuanh. opiatu, składa się Opii, radix ipecacuanh. $\bar{a}\bar{a}$ 1, Sacch. 8) 0·10—1·50! *p. d.* — 5·0! *p. die*. 1·0 = 2 kr. — **Unguentum opii** (zaw. Extr. opii 0·10:20).
- Orexinum hydrochloricum** bezbarwne igielki, rozpuszcz. we wodzie, smaku gorzkiego, stosow. jako stomachicum przy braku apetytu, 0·20—0·50 *p. d.* w oplatk., pig. 1·0 = 35 kr. ostatnimi czasy pol. **orex basicum** w tej samej dawce.
- ***Organi hb.** do spec., kataplast. 100·0 = 13 kr.
- Oryzae amyllum i farina** jako środek odżywczy i do celów kosmetycz. 100·0 = 24 kr.
- Ossa sepie** do proszk. do zębów. 10·0 = 4 kr.
- Ovum gallinaceum albumen et vitellum ovi** jajo kurze.
- ***Oxymel simplex** dodatek do mixt. (15·0—30·0:100) jako napój (50·0—100·0:1000); zew. do płukanek, lewatyw (60·0—100·0 na lewatywę). 10·0 = 4 kr.
- ***Scillae** zob. Bulbus Scillae.
- **Oxysparteinum** (hydrochl.) wewn. i podsk. w dawce 0·09 aż do 0·10 pr. d. zwalnia tętno i pobudza serce niezmienniejąc napięcia ścian naczyń — polec. w wadach sercowych.
- ***Paleae haemostaticeae** (Pengawar Djambi). 1·0 = 2 kr.

Pancreatinum (różne preparaty), zwykle od 0·50—15·0 *p. d.* w pig., z pokarm. mięsnymi, w lewatywie. 1·0 = 6 kr.

Papainum biały proszek z owoców *Carica papaya*, 0·1—0·3, poprawia trawienie zwłaszcza trawienie istot. białkow. zewn. do penzl. (10%) w błonicy. 1·0 = 40 kr.

Papaveris fructus (capsul.) **immaturi** wewn. w decoct. (5·0—15·0:100—200); zew. do okładów, kataplasz. (w decoct. 10·0—20·0:100), do płukań, lewatyw. 10·0 = 3 kr. — ***Flores papav. rhoeados** do species. 10·0 = 7 kr. — **Ol. papaver.** jak **Ol. amygdal.** 10·0 = 2 kr. — **Semen papaver.** w emulsyi (5·0—15·0:100). 100·0 = 16 kr. — ***Syrupus Diacodii** (Syrup. papav. albi, składa się: Tinct. papav. 50, rad. liquir. 25., Aq. font. 350 ad col. 250 + Sacchar. 400) łyżeczk. corrig. 10·0 = 3 kr.

Papaverinum hydrochl. kryształki trudno w wodzie rozp., wewn. dzieciom 0·005—0·05 w proszku z cukrem — zmniejsza ruchy peristalt. nie sprowadzając snu — wskazany zamiast opium w biegunkach. 0·10 = 4 kr.

Papayotinum 0·05—0·50—1·0 *p. d.* w rozpuszcz., proszk., pig., do wdmuchiwań w proszku, do penzlow. (5—10%). 0·10 = 12 kr.

Paracotoinum alkaloid z kory coto we 0·10—0·20 *pr. d.* w biegunkach 0·10 = 10 kr.

Paraffinum liquidum płyn oleisty używ. jako constit. dla maści liniment. 10·0 = 4 kr. — **Paraff. solidum** biała masa, topniejąca przy 78°, do maści, plastr. opatrunk. itd. — **Charta paraff.** — **Unguent. paraff. s. Vaselinum** (składa się Paraff. solidi 1, Paraff. liquid. 4) stosow. jak poprzedni. 10·0 = 4 kr.

Paraldehydum jako sedativ. 1·0—2·0 *p. d.*; jako hypnotic. 3·0—10! *p. d.* w 3—4% rozpuszcz. wodnem z dodatkiem sacchar. na 2—3 razy wyżyć, także w kapsuł., emulsyi; antidot. przy zatruciu strychniną; zewn. do czopków, lewatyw (4·0 na lewatywe). 1·0 = 3 kr.

Pasta dentifricia dura (Pulv. sapon. venet. 20, Calc. carbon. 8, Carmin 0·20, Ol. menth. pip. 0·50, Spirit. vini 5). —

Pasta dentifr. mollis.

Pelletierinum sulfuricum 0·01 = 8 kr. i **P. tannicum** alkaloid z cortex punie. granat. 0·20—0·50! *p. d.* — 5·0! *p. die* w rozpuszcz., najlepiej w infus. sennae. 0·10 = 18 kr.

Pengawar Djambi środek hemostatyczny.

Pental (Trójmetyletylen) płyn bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie, tylko w chloroformie, eterze, wyskoku, używ. do narkozy podobnie jak chloroform. 1·0 = 10 kr.

***Pepsinum** (solubile) 0·15—0·50 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., rozpuszcz., kaps. (z dodatkiem kw. cytrynowego, winnego, mlecznego) należy zażywać wśród jedzenia. 1·0 = 4 kr. — **Vinum pepsini** łyżeczk. 10·0 = 8 kr. — **Syrup pepsini** łyżeczkę *p. d.*

Peptonum bardzo wiele przetworów (fabr. Merck, Sanders itd.) łyżeczk. do rosołu; do lewatyw. 1·0 = 4 kr.

Petroleum (rectificatum) 5—15 kropl. *p. d.* w kaps., rozpuszcz.,

- eterze, do nacier., penzl., okład. — **Aether petrol.** stosow. jak poprzedni, także do znieczulań miejscowych. 10·0 = 3 kr.
- Phelandri fructus** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., spec., infus. (5·0—15·0:100—200). 10·0 = 3 kr.
- Phenacetinum** (Paraacetphenetidin) antipyr. 0·30—0·70 *p. d.*; 1·0 i wyżej *p. d.* dzieciom 0·15—0·3 pr. d. jako antineuralg. w proszk., pigułek., kapsułek., także rozpuszczony w alkohol. 1·0 = 4 kr.
- Phenocollum hydrochloricum** (Paramidoacetphenitidin) wew. 0·50—1·0 *p. d.* rozpuszcz. w wodzie jako antipyr., antirheumat. także w zimnicy 1·0 = 20 kr.
- ***Phenolum** zob. Acid. carbolicum.
- Phosphorus** 0·0005—0·001 *p. d.* — 0·005! *p. die* rozpuszcz. w eterze, alkohol., oliwach, rzadko w pig., zew. (także w rozpuszcz.) do maści (0·05—0·30:25), do liniment. 1·0 = 2 kr.
- **Aqua phosphor.** łyżeczk. — **Ol. phosphor.** (1:80—100 oleum) 2—5 kropli *p. d.* w mixt., emuls., kapsułek., także zewnątrz. do nacierań. 10·0 = 10 kr. — **Ol. jecoris aselli phosphor.** (0·01:100 oliwy) łyżeczk. *p. d.* — **Aether phosphor.** (1·0:150) kropl. 10·0 = 15 kr.
- Physostigmatis Semen** (Faba Calabar.) 0·01 = 1 kr. jako **Extr. F. C.** po 0·0015—0·02! *p. d.* — 0·06! *p. die*, w pig., rozpuszcz., (z 1% roztworu wodnego lub glicerynowego 5—10 kropli *p. d.* 2—4 r. dnia), do ocz (kropl. z roztworu 1: glicerini, Aquae aa 10).
- ***Physostigminum salicylicum** (Eserinum salicyl.) 0·0005—0·001! *p. d.* — 0·003! *p. die* w pig. lub rozpuszczeniu; podskórnice w dawce 0·0005—0·001 *p. d.* (z roztworu 1%), do ocz kropl. (0·02—0·05:10 Aq.). 0·01 = 4 kr.
- **sulfuricum** w dawkach, jak poprzedni.
- Phytolaccin** (Extr. Phytolacca decandra) wew. 0·1—0·2 w pig. środek rozwalniający.
- Picrotoxinum** 0·0005—0·001! *p. d.* — 0·02! *p. die* w pig., pastylk., rozpuszcz., zewn. w maściach 0·10 = 15 kr.
- Pichy-Pichy** Extr. fluid., ciecz ciemnobrunatna, przyjemnego zapachu, mocno gorzka, zastosow. i wskazanie jak dla Balsam Copaiv., Ol Santali itd. 1·0 = 3 kr.
- ***Pilocarpinum hydrochloricum** alkaloid z Folia Jaborandi 0·01—0·03! *p. d.* 0·06! *p. die* w pig. roztworach (0·01—0·02:80) co godz. łyżeczkę polecany w błonicy u dzieci; podskórnice (2% roztwór) w dawce 0·015—0·03! *p. d.* (dzieciom 0·001—0·01 *p. d.*); do ocz (0·10—0·20:10 Aq.). 0·01 = 6 kr.
- Pimpinellae radix** stosow. jak Radix Imperat. 10·0 = 2 kr.
- Tinct. Pimp.** 10—30 kropli *p. d.* k. r. d. do płukan. 10·0 = 4 kr.
- Piper album** 10·0 = 5 kr. — **Piper nigrum** 10·0 = 5 kr. 0·20—1·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., w maceracyi (5·0—10·0:100 spirit. l. vini) także zewn. do maści.
- Piperazinum** (Diaethylendiamin) purum l. hydrochloricum, krystaliczne białe igielki łatwo w wodzie rozpuszcz., używa się w dniu, kamieniach pęcherza, w dawce 1·0—2·0 *p. die*

w rozpuszcz. w wodzie (sodowej); także do przepłukiwań pecherza (1—2%). Do okładów i zastrzykiwań podskórnych w miejsca obrzękle. 1·0 = 50 kr.

Piscidia Erythrinae radice cort. 0·50—1·0 p. d. 2—4 r. d. w proszku (sedativ i hypnotic., dział. podobne do opium) — **Extract P. siccum** 0·25—0·50 p. d. — **Extract. P. fluidum** 2·0—6·0 p. d. — 12·0 p. die. — **Tinct. P.** 40—50 kropli p. die.

***Pix liquida** (Resina empyrheumat. liquida) wewn. 0·30—1·50 p. d. 2—3 r. d. w pig., kapsułk.; zewn. do wzięwań, wcierań, (czysty lub z alkohol., tłuszczami, mydłem w stosunku 1:2—10). do maści (1:4—6), do plastrów (1:2 cera). 100 = 10 kr. — **Aq. Picis** (picea) łyżeczk. — łyżk. 2—4 r. dz.; do wzięwań, przestrzyk. opatrunków. 100 = 10 kr. — **Sapo picis.** 10·0 = 4 kr. — **Unguent. picis sulf.** — **Pix litanthracis** smoła z węgla kamienn. tylko zewn. jako środek dezynfekcyjny.

Plantaginis herb. zwykle jako decoct. (15·0—50:100—200 col.). 10·0 = 2 kr.

Platinum natriochloratum stosow. jak aurum natr. chlorat. 1·0 = 10 kr.

***Plumbum acetium** wewn. 0·005, 0·008—0·10! p. d. — 0·50! p. die w proszku, pig., rozp., mixt., emulsyi, w krwiopluciu od razu większe dawki (0·06—0·10 co 2 godziny); zewn. jako zasypka do wdmuchiwań gardła, krtani (1:5—10 Sacchari), jako płukanka do ust i gardła (0·10—0·50:100), do lewatyw (0·10—0·50), do przestrzyk. (0·30—1·0:100) do pędzlow. (1·0—2·0:10), do wzięwań (0·10—1·0:100), do ocz. (0·20—2·0:100), do okładów, zmywań (0·50—1·0:100), do maści (1·0:5—10). 10·0 = 5 kr. — **Plumb. acet. solutum** (1·0:6 Aqu.). — ***Plumb. acet. basicum solutum** (Liquor plumb. subacetici) zewn. do płuk. ust i gardła (0·50—1·50:100·0). do pędzlow., okładów, zmywań, opatr. (w dawce 3—5 razy w większej, jak plumb. acetic.); do ocz. (0·50—1·0:100), do przestrzyk. (2·0—6·0:100), do lewatyw (0·50—6·0 na lewat.), do maści (1·0:5—10). 10·0 = 3 kr. — ***Aqua plumbi** (Plb. acet. basic. solut. 1, Aquae 49) i ***Aq. plumbi spirituosa** czyli ***Aqua Goulardi** (Plb. acet. basic. solut. 2, Spirit. vini 5, Aquae 100) do okładów, zmywań, przestrz., lewatyw (100·0—200·0 na lewatywę). — ***Ung. plumbi acetici.** 10·0 = 5 kr.

— ***carbonicum** (Cerussa) zasypka, także do maści, plastr 10·0 = 4 kr. — ***Emplastr. Cerussae** (Empl. Diachyl simpl., Cerussae āā 1, Ung. simplic. 70). 10·0 = 5 kr. — ***Unguent. Cerussae** (Emplastr. Diachyl 1, Cerussae 3, Axungiae 5). 10·0 = 5 kr.

— **jodatum** 0·05—0·50 p. d. k. r. d. w proszku, pig., do maści (1:5—10). 1·0 = 5 kr.

— **nitricum** stosow. jak Pl. aceticum.

— ***oxydatum fusum** (Lithargyrum). 10·0 = 3 kr. do ***Emplastr. Diachyl. simpl.** 10·0 = 3 kr. i ***Empl. Dia-**

chyl. compos. (Adhaesivum, Empl., Plumbi, Gum. resina). — **Emplastr. diachyl. linteo extens.** — **Ung. Diachyl. Hebrae.**

***Plumbum oxydatum** (hyperoxydatum) **rubrum** (Minium) 10·0 = 3 kr. do ***Empl. Minii adust.** (Empl. fuscum camphor.). 10·0 = 5 kr.

— **tannicum.** 1·0 = 2 kr., do Unguent. Plumb. tannici.

Podophylli peltati rad. 0·50—1·0 *p. d.* jako purg. 1·50—2·0 *p. d.* jako drastic. w proszk. — **Podophyllinum** (resina P.) 0·05—0·10 *p. d.* w pig, jako purg., przy zaparciu stolca nawykowem do stałego użytku 0·005—0·02 *p. d.* (dzieciom po 0·005—0·02 jako purg.) w pig., mixt., proszk., rozpuszcz., w alkoholu. 1·0 = 6 kr. — **Podophyllotoxinum** 0·015—0·02! *p. d.* — 0·05! *p. die* rozpuszcz. w alkoholu lub w pig. 0·10 = 16 kr.

Propylaminum (Trimethylamin) 1—2 krople w klejkich płynach 0·10—3·0! *p. d.* — 10·0 *p. die* w kaps., kropl., mixt. 1·0 = 3 kr.

Pruni virginianae cort. z niego Extract. fluid. P. v. 2·0—4·0 *p. d.* jako tonicum.

Pulmonariae folia stosow. jak folia Altheae. 10·0 = 2 kr.

***Pulpa prunorum** zob. Senna. 10·0 = 4 kr.

Pulsatillae herb. 10·0 = 2 kr. — **Extr. P.** 0·05—0·20 *p. d.* — 1·0 *p. die* w mixt., pig. 1·0 = 6 kr. — **Tinct. P.** 10—40 kropl. — 3·0 *p. d.* — 10·0 *p. die.* 10 = 20 kr.

***Pulvis aërophorus** zob. Natrium hydrocarbonic.

***Pulvis ipecac. opiat. Doveri** zob. Opium.

Pyoctaninum (Coeruleum; aureum) barwiki anilinowe, używane jako antisept. zewn. czysty jako zasyпка, w roztworze 1·0:1000), w maści (20/0). 1·0 = 18 kr.

***Pyretri Romani rad.** do płukania do ust, gardła, w decoct. lub infus. (3·0—10·0:100—200 col.). 10·0 = 6 kr.

Pyridinum purissimum (antiasthmatic) 3·0—5·0 wylane na talerz ulatniają się (w ciepłocie pokoju 20—25°), chory pozostaje w pokoju 20—30 minut; zastosować można 2—3 razy w ciągu dnia. 1·0 = 3 kr.

Pyrocinum (Acethylphenylhydracin) proszek kryst. trudno w wodzie rozp. wew. 0·05—0·10 *p. d.* k. r. d. jako antipyret po większych dawkach występuje haemoglobinuria.

***Pyrogallol** zob. acid. pyrogallicum.

***Quebracho cortex.** 10·0 = 4 kr. i **lignum Q.** 10·0 = 2 kr. 0·30—0·50 *p. d.* w proszk., maceracyi lub decoct. (5·0—15·0:100—300 col.). — ***Extract. fluid. Q.** 1—2 łyżeczek *p. d.* 8·0 *p. die.* 10·0 = 11 kr. — **Tinct. Q.** łyżeczk. czysta lub z pokarmami klejkiemi. 10·0 = 5 kr.

Quebrachinum hydrochl. 0·05—0·10 *p. d.* 0·5 *p. d.* w pig. lub rozp., w dusznościach z powodu wady serca. 0·01 = 15 kr.

***Quercus cortex** wew. 0·50—1·50 w proszk., l. decoct. (15·0—25·0:120—200); zewn. do zasypek l. (w decoct.) do płukań gardła, ust, przestrzykiwań, kapieli (1/2—1 klg. z 2 litrami wody zagotowane wlać do kapieli). 10·0 = 4 kr. — ***Semen**

(glandulae) **Quercus tostum** (1—3 łyżeczk. na filiżankę wody). 100·0 = 16 kr.

Quillajae saponariae cort. decoct. (3·0—5·0:200 łyżeczkami). 10·0 = 2 kr.

***Ratanhae rad.** wew. 0·50—1·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., decoct. (5·0—15·0:100); zew. do proszków do zębów, w decoct. do płukania ust i gardła, przestrzykiwań i lewatyw. 10·0 = 9 kr. — ***Extr. R.** 0·20—1·0 *p. d. k. r. d.* w pig., placuszk., mixt.; płukanie do ust, gardła (5—10⁰/₁₀), do penzlowań (1·0—5·0:25), do okładów, zmywań, maści. 1·0 = 7 kr. — ***Tinct. R.** wew. 20—40 kropl. *p. d.* do płukań, penzlowań 10·0 = 5 kr.

Resorbinum mieszanina ol. amygd., cera, lanolinum, sapo i gelatina jako constituens do maści. 10·0 = 10 kr.

Resorcinum (Dioxybenzol) wew. jako antiferment., antisept., antipyret. po 0·20—0·50—3·0! *p. d. k. r. d.* — 10·0! *p. die* w proszk. w opłatkach, mixt., kapsułk., w rozpuszcz.; zew. jako środek żrący w substancji l. w rozpuszcz.; jako woda do ocz (2·0:100), do przestrzykiwań pęcherza (2·0—5·0—10·0:100), do cewki moczow. (2·0:100), do lewatyw (1·0:200), do wziewań (0·50—1·0:100), do maści (5·0:30). 1·0 = 3 kr.

Rhamni Catharticae fruct. 10·0 = 2 kr. — **Syrup. Rh. C.** jako laxans łyżeczk. (1—4) do mixtur.

— **Frangulae cortex** w inf. (10·0—30·0:100—200 col.).

— ***Purshiani cort.** zob. Cascara Sagrada.

***Rhei chinensis rad.** (Rhabarbarum) jako stomachic. 0·10—0·50 *p. d. k. r. d.*; jako purg. 0·50—5·0 *p. d.* w proszk., pig., kapsułk., infus. (2·0—5·0:100), do lewatyw (10·0—20·0:100). 10·0 = 15 kr. — ***Extr. rhei. ch.** 0·05—0·30 *p. d.* jako tonicum; 0·50—1·0 *p. d.* jako laxans w pig., rozpuszcz. 1·0 = 7 kr.

Extr. rh. ch. compos. (Extr. rh. ch. 3, Aloë, Sapo med., Jalapa *āā* 1) 0·10—0·30 *p. d.* jako stomachic., 0·30—0·50 *p. d.* jako laxans w pig. 1·0 = 6 kr. — ***Syrup. rh. ch.** łyżeczk., łyżkami, do mixtur. 10·0 = 3 kr. — ***Tinct. rh. ch. aquosa** $\frac{1}{2}$ —4 łyżeczk. *p. d. k. r. d.* 10·0 = 4 kr. — ***Tr. rh. ch. vinosa** (Vinum rh. Darrhelli) dawka jak poprzedni. 10·0 = 11 kr.

Rhododendri folia 0·50—1·0 *p. d.* w proszk., infus. (5·0—15·0:100 col.).

***Rosae flores** 10·0 = 5 kr. — ***Aqua rosae** 100·0 = 10 kr. —

***Ol. rosae** 0·10 = 17 kr.

***Rosmarini folia** do spec., zew. w infus. do zmywań, okładów. 10·0 = 1 kr. — ***Ol. rosmarini** do maści, liniment. 1·0 = 3 kr.

Rubi Idaei fruct. 100·0 = 20 kr. — ***Syrup. rubi idaei** 10·0 = 4 kr.

Rubidium jodatum kryształ w wodzie rozpuszcz. 5·0—10·0:200·0 Aquae 3 razy dnia łyżkę zamiast jodkalium — nie wpływa na serce. 1·0 = 40 kr.

Rutae folia 0·50—1·50 *p. d. k. r. d.* w proszk., infus. (10·0—15·0:100—200 col.); do płukań ust i gardła, lewatyw. 10·0 = 3 kr. — **Aqua rutae** 100·0 = 12 kr. — **Ol. rutae** 1—3 kropl. *p. d.* 1·0 = 5 kr.

***Sabadillae fruct.** (semen) 0·10—0·25! *p. d.* — 1·0! *p. die* w proszk., pig., infus. (0·50—1·0:100 col.); zewn. jako zasyпка; do zmywania, lewatyw, maści (1·0:4—10). 10·0 = 7 kr. — ***Ung. sabad.** (1·0:4·0). 10·0 = 6 kr. — **Tinct. sabad.** wewn. 0·15—0·50! *p. d. k. r. d.*; zewn. do nacierania.

***Sabinae summitates** (frond.) 0·20—1·0! *p. d.* — 2·0 *p. die* w proszk., pig., infus. (2·0—8·0:100 col.); zewn. do zasypek, maści, do płukania, przestrzykiwania (5·0:100). 10·0 = 5 kr. — **Extr. Sab.** 0·03—0·20! *p. d.* — 1·0! *p. die.* 1·0 = 10 kr. — **Ol. Sab.** $\frac{1}{2}$ —3 kropl. *p. d.* 2—3 r. d. w oleosach., w pig 1·0 = 3 kr. — **Tinct. Sabinae** 20—60 kropl. *p. d.* 10·0 = 20 kr.

Saccharinum łatwo w wodzie rozpuszcz., 280 r. słodszy od cukru, stosow. tam, gdzie cukier przeciwskazany (diabetes), do osłodzenia bardzo gorzkich leków, jak strychniny, chininy. Sprzedawany w tabletkach. 1·0 = 20 kr.

***Saccharum albissimum** 10·0 = 2 kr. — ***Sacch. lactis** jako łagodny laxans 10·0—20·0 *p. d.* z mlekiem. 10·0 = 5 kr. —

***Syrup simplex** 10·0 = 2 kr.

Sal Carolinum fact. zob. natr. sulfuric.

— **Seidlitzensis** zob. Magn. sulfuric.

— **Seignetti** zob. Kal. Natr. tartarie.

Salacetol połączenie kw. salicylowego z acetolem, proszek białawy, krystal., w wodzie nierozp., antiseptic. stosowany wewn. w biegunkach, czerwonce 2·0—3·0 *p. d.* (dzieciom 0·50 *p. d.*) (w Ol. ricini) ma działać lepiej od salolu. 1·0 = 21 kr.

***Salep tubera** 0·50—1·0 *p. d.* — 10·0 *p. die* w proszk., decoct (0·25—1·50:200—300 col.), w żelatynie (1·0:50); zewn. do lewatyw (w decoct. 2·0:100). 10·0 = 12 kr. — **Mucilago Salep** (1·0:100 Aq.) łyżeczk., łyżkami.

***Salicis cortex** infus., decoct. (10·0—25·0:100—200 col.) stosow. jak cortex Quercus. 100·0 = 11 kr. — **Extr. fluid. salic. nigr.** (antiaphrodisiac.). 3·0—5·0 *p. die.* 1·0 = 3 kr.

Salicinum 0·50—2·0 *p. d.* — 10·0 *p. die* w proszk., pig., mixt. 1·0 = 4 kr.

Salicilamidum krystal. żółte blaszki, rozpuszcz. w eterze, wysoku, wodzie mało; stosow. jak kw. salicylowy 0·15 *p. d.* co godzinę — 1·0 *p. die.* 1·0 = 12 kr.

Salipirinum, Antipyrinum salicylic. (fabric. Riedel), biały proszek, krystal., trudno w wodzie rozpuszcz. 1·0 *p. d.* — 6·0 *p. die* w proszk., mixt., działa podobnie jak natr. salicylic.; także w przypadłościach miesiączk. 1·0 = 10 kr.

Salicoll (Phenocollum salicylicum) 1,0—2·0 *p. d.* w proszku jak Phenocoll. mur. 1·0 = 20 kr.

Salolum (Phenolsalicylat) biały proszek. krystal., bez smaku, zapachu, w wodzie nierozpuszcz., tylko w wysoku, eterze, 1·0—2·0 *p. d.* — 10·0 *p. die*, w proszk., tabletk., mixt.; zewn. jako zasyпка (czysty, l. $\bar{a}\bar{a}$ z amylum), rozpuszcz. w alkohol. l. eterze do płukania, okładów do maści. 1·0 = 4 kr.

Salophenum (Acetylparamidosalol) zawiera 50% kw. salicyl. blaszki krystaliczne, bez smaku, zapachu, rozpuszcz. w eterze, alkoholu, mało w wodzie gorącej, w dawce po 4·0—6·0 *p. die* stosow. jako antineuralg., antirheumat. 1·0 = 18 kr.

- Saluminum** (sol. i insolubile) = Aluminium salicylicum do zasypek, wdychiwań do nosa w ozaena. 1·0 = 8 kr.
- ***Salviae folia** 0·50—2·0 *p. d.* w proszk. l. infus. (5·0—15·0: 100—200 col.), jako płukanka do ust, gardła (infus.), do przestrzykiwań, zmywań i t. d. 10·0 = 6 kr. — ***Aqua S.** 100 = 12 kr. — **Extr. S.** 0·50—1·50 *p. d.* k. r. d. — 1·0 = 5 kr.
- Ol. aether. S.** 1—3 kropli k. r. d.; do płukań, kropli do zębów itd. 1·0 = 5 kr.
- ***Sambuci flores** podobnie jak flor. chamomil. w inf. (5·0—15·0: 100—200). 10·0 = 2 kr. — **Aqua S.** 100·0 = 12 kr. — **Roob. S.** (succus s. inspissatum) łyżeczk., do mixt. (10·0—30·0: 100). 10·0 = 4 kr.
- Sanguinariae canadens. rad.** 0·20—0·60 *p. d.* w proszk., pig., decoct. (2·0—5·0: 100—200 col.). — **Sanguinarium** 0·005—0·008 *p. d.* jako expector; 0·01—0·02 *p. d.* — 0·05 *p. die* jako emetocathartie.
- Sanguis draconis** (resina draconis) do plastr., zasypek. 10·0 = 14 kr.
- Santali lign. zob. Lignum Santali.**
- Santoninoxim** wew. 0·075—0·10 w proszku jako anthelminticum w miejsce santoniny.
- ***Santoninum** 0·03—0·10 *p. d.* — 0·30! *p. die* w proszk., pig., do lewatyw (0·05—0·10: 50), do czopków (0·05—0·10). 0·10 = 1 kr. — ***Trochisci S.** (0·025—0·05). 10 szt. = 8 kr. — **Natrium santon.** 0·10—0·20 *p. d.* 2—3 r. d. w proszk., pig. 1·0 = 10 kr. — **Calcium santon** 1·0 = 10 kr.
- ***Sapo kalinus, virid.** 100·0 = 10 kr. — ***S. medicinal.** (amygdal.). 10·0 = 7 kr. — ***S. venetus** (oleac). 10·0 = 4 kr. — **S. jalapinus** wew. 0·10—0·30 k. r. d. w pig. 1·0 = 10 kr. — **S. picis** 10·0 = 4 kr. — **S. sulfuricus.** — ***Spiritus saponatus** 10·0 = 2 kr. — ***Spir. saponis kalini** do nacierań, zmywań, kąpeli ($\frac{1}{4}$ —1 klg. na kąpiel). 1·0 = 4 kr. — **Spir. saponato camphorat.** zewn. do nacierań.
- Saponariae herb. infus.** (10·0—30·0: 100—200 col.). 10·0 = 3 kr. — **Rad. sapon.** w decoct. i infus. 10·0 = 3 kr. — **Extr. sapon.** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w pig., mixt. 1·0 = 3 kr.
- ***Sarsaparillae rad.** wewn. 1·0—2·0 *p. d.* w pig., w decoct. (15·0—60·0: 250—300 col.), w macerac. alkohol. lub wodnej. 10·0 = 6 kr. — ***Decoct. Sars. composit. fortius** (Zittman). 100·0 = 48 kr. — ***Decoct Sars. Zittmani mitius** 100·0 = 30 kr. — **Extr. Sars.** 0·50—1·0 *p. d.* k. r. d. 1·0 = 15 kr. — **Syrup. Sars. compos.** (Roob Laffecteur) 1—2 łyżeczk. 2—4 r. dz.; wskazania jak decoct. Sarsap.
- ***Sassafras rad.** wchodzi w skład species lignor. 10·0 = 2 kr.
- Scammonium halepense** (resina) 0·05—0·15 *p. d.* k. r. d.; w dawkach 0·30—0·60 *p. d.* co godz. jako drastie. w pig., proszk., emuls. 1·0 = 6 kr.
- ***Scillae bulbus** (rad.) wewn. 0·03—0·20—0·50! *p. d.* 3—4 r. d. w proszk., pig., decoct, infus. (1·0—3·0: 100); zew. do maści (1·0: 4·0), do okładów (w infus. 5·0—10·0: 200). 1·0 = 2 kr. — ***Acetum Sc.** 2·0—5·0 *p. d.* k. r. d. w mixt.; zew. do zmy-

wań, lewat., płukan. 10·0 = 3 kr. — ***Extr. Sc.** 0·05—0·20! *p. d.* — 1·0! *p. die* w proszk., pig., mixt. 1·0 = 5 kr. — ***Oxymel. Sc.** łyżeczk., do mixt. (10·0—20·0:100). 10·0 = 5 kr. — **Tinet. Sc.** 10—20 kropli (0·50—1·50) *p. d. k. r. d.* 10·0 = 4 kr.

Scopoliae lucid. folia jako Tinet. Scop. (1·0:8·0 alk.); 20 kropli *p. d.*, do ócz jako midriatic. — **Scopolaminum hydrochloric.** stosow. podobnie jak atropin., w roztworze (1—2%) nie podnosi parcia śródocznego, działa silniej niż atropin. wewn. 0·0002—0·0005! *pr. d.* podsk. 0·0001 jako sedativ. u umysł. chorych. 0·01 = 13 kr.

Scoparinum 0·50—1·0 *p. d.* w proszk., pig., podskórn. 0·03—0·06 *p. d.* 0·10 = 30 kr.

Sebum ovile constit. do maści, mydeł, czopk. i t. d. 100·0 = 15 kr.

***Secale cornutum** wewn. 0·30—0·60—1·0! co 2—4 godz (w celu wzmocnienia bólów co $\frac{1}{4}$ godz. po 1·0—5·0. *p. die*) w pig., proszk., infus., decoct. (2·0—5·0:100), zewn. w proszk., w infus. (2·01—5·0:100·0) do lewat., przestrzyk. 1·0 = 1 kr. — **Extr. secal. cornuti** zob. Ergotin. 1·0 = 6 kr. — **Tinet. sec. cornuti** 0·50—2·0 *p. d.* — 8·0 *p. die* w mixt. 10·0 = 20 kr.

***Senegae rad.** 0·50—2·0 *p. d.* w proszk., pig., infus. lub decoct. (5·0—15·0:100—200 col.). 10·0 = 7 kr. — ***Syrup. S.** łyżeczk., do mixt. 10·0 = 5 kr.

***Sennae (alexandrinae) folia** 0·30—0·50 *p. d. k. r. d.*; jako laxans 0·50—2·0 *p. d.* (1—2 razy), jako silny purgans 2·0—5·0 *p. d.* w pig., proszk., infus. (5·0—20·0:100). 10·0 = 5 kr. —

***Fol. Sennae sine resina** (F. S. Spirit. extract.). 10·0 =

8 kr. — ***Electuarium lenitivum S.** łyżeczk. lub do mixt. 10·0 = 6 kr. — ***Infus. Senn. composit.** (Aqua

laxativ. Viennensis) łyżeczk. — łyżkami 50·0 *p. d.* 10·0 = 4 kr. —

***Spec. laxant. St. Germain** łyżeczkę na filiżankę infus. 10·0 = 8 kr. — ***Syrup Sennae c. Manna** (manna-

tus) łyżeczk. lub w mixt. 10·0 = 3 kr. — **Acidum catharticum** 0·30—0·50 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., pig., mixt.,

podskórn. 0·20—0·30 *p. d.* (z roztworu alkohol.). 0·10 = 2 kr.

***Serpylli herb.** do spec.; zewn. do okładów, kąpieli i t. d. 10·0 = 1 kr. — **Ol. Serp.** 2 kropli *p. d. k. r. d.*; do maści. 1·0 = 4 kr. — **Spirit. Serp.** zewn. 100·0 = 20 kr.

Sesami oleum jak Ol. amygdal. 10·0 = 2 kr.

***Sinapis Semen** wewn. 1·0—4·0 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszk., infus. (2·0—10·0:100), macer. (5·0—15·0:100), z mlekiem (25·0—50·0:500); zewn. w infus. do płukan. ust, gardła, zmywań, okładów, kąpieli (100·0—250·0 na kąpiel), do pryszczyleł,

kataplasm. 100·0 = 18 kr. — ***Farina Sinap.** — **Ol. si-**

nap. 0·004—0·01 *p. d. k. r. d.* w emuls.; zewn. rozpuszcz. w alkohol. lub olejach (0·20—1·0:25). 1·0 = 12 kr. — ***Spirit.**

Sinap. wewn. 2—10 kropli *p. d. k. r. d.*; zewn. jako rubefac. 10·0 = 4 kr. — **Charta sinap.** Kartka = 8 kr.

Solaninum hydrochloricum 0·05—0·10! *p. d.* — 0·50 *p. die* w pig., w proszk., podskór. 0·05 *p. d.* (z 1^o/₁₀ rozczynu). 0·01 = 8 kr.

Solutol przeważnie do dezynfekcyi. 10·0 = 3 kr.

Solveol jako desinfic. i antiseptic. przewyższa w działaniu kreoline, kw. karbol., nie jest trujący, (0·5^o/₁₀ solveol daje te same usługi co 2^o/₁₀ kw. karbol.). 10·0 = 11 kr.

Solvin S. Polysolve przetwór uzysk. z oleju rącznikowego stos. jako constituens do maści.

Somnal 2·0—4·0 *p. d.* jako hypnoticum. 1·0 = 6 kr.

Sozal proszek kryst. rozp. w wodzie używ. w 1^o/₁₀ rozczywie do okładów jak Liquor alum. acetic. 1·0 = 3 kr.

Sozodolum; Kalium sozodolicum 1·0 = 15 kr. —

Acidum sozod. Hydrarg. soz. żółty proszek nierozp. stosowany zewn. w kile i chorobach skórnych. 1·0 = 24 kr.

Natrium sozodolic. proszek bez zapachu, podobnie stosow. jak jodoform w chorob. skórnych i kile, w proszk., maść, rozpuszc. w wodzie i alkoh. 1·0 = 16 kr.

Zincum sozod. adstring. i antisept. do przepłukiwań (1—2^o/₁₀) pęcherza cewki; w maści (5—10^o/₁₀) w odmrożeniach, wysypkach; w proszku jako zasyka w otitis med. 1·0 = 20 kr.

Spartii scoparii herb. i flores w infus., decoct. (5·0—20·0: 100—300), jako diuretic. — **Sparteinum sulfuric** 0·01—0·03 *p. d.* 2—4 r. dz. — 0·10—0·25 *p. die* w pig., rozpuszcz. w wodzie. 0·10 = 5 kr.

***Species amaricantes** (Hb. Absynth., Centauri min., Flav aurant. āā 20, Fol. trifol. fibr., rad. Calam., rad. Gent. āā 10, cort. cinam. 2·50) stosow. jak infus. (5·0—15·0:100 col.). 100·0 = 26 kr. — ***Spec. aromaticae** (Hb. Salv., Menth., pip., flor. Lavand. āā) wew. jak poprzed.; zew. do okładów (w infus.) kąpieli (1¹/₂—1 klg.). 100·0 = 36 kr. — ***Spec. aromat. pro cataplasma.** 100·0 = 47 kr. — **Sp. diureticae** 2 łyżeczki na 6 filiż. wody a 4 filiż. col. wypić w ciągu dnia. — ***Spec. emollientes** do kataplasma. 100·0 = 18 kr. — ***Spec laxant St. Germain** zob. Senna. — ***Spec. lignorum** zob. Guajaci lign. — ***Spec. pectorales** zob. Altheae.

***Spilanthis oleraceae hb.** 10·0 = 5 kr. do ***Tinct. Spilanth. compos.** stosow. w bólu zębów, do płukań ust. 10·0 = 6 kr.

***Spiritus aetheris** (Liquor mineralis Hoffmanni) 10—30 kropl. czysty lub w mixt. 10·0 = 3 kr. — **Spirit. aether. nitrosi** (Spir. nitr. dule.) wewn. kropl.; zewn. do płukań, penzlowań. 10·0 = 5 kr. — ***Spir. vini rectificatus** (concentratus). 100·0 = 10 kr. — ***Spir. vini dilutus** 100·0 = 8 kr. — ***Spir. vini Cognac.** 10·0 = 9 kr. — **Spir. frumenti.** 10·0—2 kr. — **Spir. solani tuberosi.**

Spongia compressa (gąbka); **Sp. carbolisata**; **Sp. tosta** (Carb. Spong.). 10·0 = 10 kr.

Staphisagriae semen tylko zewn. w proszk., maść, decoct (10·0—15·0:100) jako antiparasitic. 10·0 = 4 kr.

Stibium chloratum (Liquor stibii chlorat.; Butyrum Antymonii) środek żrący. 1·0 = 2 kr.

- ***Stibium sulfuratum aurant.** wewn. 0·015—0·10 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., trochisci (po 0·03). 1·0 = 5 kr.
- **sulfuratum nigrum** (laevigatum) 0·20—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. w pig., proszk., trochisci (po 0·18). 10·0 = 3 kr.
- ***Stramonii folia** wewn. 0·03—0·15—0·30! *p. d.* 3—4 r. dz. — 1·0! *p. die*, w proszk., pig., infus. (0·20—1·0:100); zewn. do palenia (Cigarettes antispasmodiques), do maści (1·0:10). 10·0 = 2 kr. — **Extr. Str.** 0·01—0·10! *p. d.* — 0·40! *p. die*, zewn. do wcierań, wody do ocz (0·50—2·0:100), do maści (1·0:25). 1·0 = 7 kr. — **Sem. Str.** 0·01—0·10 *p. d.* **Tinct. Str.** 5—10 kropli. (0·50!) *p. d.* — 2·0! *p. die*.
- Strontium bromatum** krystal. igiełki łatwo rozpuszcz. w wodzie 1·0 *p. d.* — 4·0 *p. die*, w dyspeps., gastralg., hysteryi. 10·0 = 3 kr.
- **jodatum** w tej samej dawce co kalium jod. i w miejsce tegoż 1·0 = 10 kr.
- **lacticum** proszek biały, ziarnisty, 1·0 *p. d.* 2—3 r. d. w chorobach nerek, białkomoczu u ciężarnych, także przeciw tasiemcowi. 1·0 = 4 kr.
- Strophanti hispidi** (semen) w infus. lub decoct. zamiast digitalis; do ***Tinct. Stroph. h.** (1·0:20) 5—15 kropli (1·0) *p. d.* 2—4 r. d. — 40! kropli (3·0!) *p. die*. 1·0 = 2 kr. — **Strophantinum** bardzo silnie trujący, mało wypróbowany 0·0001—0·0005 *p. d.* rozpuszcz. w alkaliczn. wodach lub stos. pigułkach. 0·01 = 3 kr.
- ***Strychnos nux vomica** (semen strychni) 0·03—0·12! *p. d.* — 0·50! *p. die* w proszk., pig., do lewatyw (w decoct 0·25—0·50:100). 1·0 = 1 kr. — ***Extr. Str.** (nuc. vomie. spirit.) 0·01—0·05! *p. d.* — 0·15! *p. die* w proszk., pig. 1·0 = 14 kr. — ***Tinct. Str.** (Tinct. nuc. vomie.) 0·10—1·0! *p. d.* — 3·0! *p. die*; zew. do nacierań. 10·0 = 4 kr. **Tinct. nuc. vomie. aetherea; Strychninum purum** i ***Str. nitricum** 0·003—0·007! *p. d.* — 0·02! *p. die* w proszk., pig.; zewn. w rozpuszcz. w olejach lub maści (0·05—0·30:10), podskórn. (1% rozczyzn.) 0·001—0·01 *p. d.* 1—2 r. dz. 0·01 = 1 kr. — **Str. arsenicosum** podskórn. 0·001—0·004 *p. d.* — **Str. aceticum** i **Str. sulfuricum** stosow. jak Str. nitricum. 0·01 = 1 kr.
- ***Styrax liquidus** (Balsam Styr., Ambra liquid.) wewn. 0·50—2·0 k. r. dz. w pig. lub rozpuszcz. w alkoh.; zewn. do maści, liniment. āā Ol. Olivar. 10·0 = 7 kr. — **Linimentum Styrax.** (Styrax 3, Ol. Oliv. 6, Spir. vini 1); — **Ungu. Styrac. sulfuratum** antiscabiotic. 10·0 = 8 kr.
- Succinum** jako proszek do kładzideł. 10·0 = 5 kr. — **Ol. Sue.** 5—15 kropli. *p. d.* k. r. d. w pig., kapsułk., jako krople do uszów, zębów itd. 10·0 = 3 kr.
- Sulfonalum** kryształki bez smaku, zapachu, 1·0—3·0 *p. d.* jako hypnotic, aż 4·0! *p. d.* — 8·0! *p. die*, w pig., pastylk., z gorącą herbatą, rosółem itd. 1·0 = 7 kr.
- ***Sulfur sublimatum** i **Sulfur sublimat. depuratum** (flores Sulfuris) wewn. 0·30—1·0 *p. d.* k. r. d.; jako laxans 2·0—8·0 *p. d.* w proszk., trochisci (po 0·18); wewn. do

wdmuchiwań gardła, krtani, do płukań w emulsyi (1:0—2:0 :100), do nakadzań, maści (1:0:2—5). 10:0 = 3 kr. — ***Ung. sulfurat.** antiscabiotic. 10:0 = 5 kr. — ***Sulfur praecipitatum** (Lac. sulfuris mleko siarczane) 0:10—0:50 *p. d.* k. r. d. jako laxans 1:0—2:0. 10:0 = 8 kr. — **Sulf. chloratum** do pedzłow. — **Sulf. jodatum** wewn. 0:05—0:10 *p. d.* 2—4 r. d. pig., glicerynie; zewn. do maści, mydeł. 1:0 = 10 kr.

Symphorol N. (Natr. coffeīnosulfuricum) wewn. 1:0 *p. d.* k. r. d. w proszku, działa moczopędnie. 1:0 = 25 kr

Syrupus Diacodii zob. Papaver.

— ***Menthae.** 10:0 = 4 kr.

***Syrupus Mororum** 10:0 = 3 kr.

— ***Rubium.** 10:0 = 3 kr.

— ***Rubi ideae.** 10:0 = 3 kr.

Taleum praeparatum zob. Alumen plumosum.

Tamarindi Pulpa Tamarindorum cruda, zewn. w decoct. (25:0—60:0:1000) jako napój; (8:0—50:0:100—300 Aqu.), jako laxans. — ***Pulp. Tamar. depurata** 25:0—60:0 *p. d.* k. r. d. czysta lub mixt, powidełk.; do lewatyw. 10:0 = 6 kr.

Tanaceti herb. 1:0—2:0 *p. d.* k. r. d. w proszku, infus. (10:0—20:100). 10:0 = 2 kr. — **Flores T., Oleum Ta.** 1—2 kropli k. r. d. w alkoh. lub z olejami; zewn. do nacierañ. 1:0 = 15 kr.

Tannalbin proszek żółtawy; 1:0 *p. d.* k. r. d. dzieciom 0:5 *p. d.* w biegunkach, w gruźlicy jelit, w nephritis. 1:0 = 6 kr.

Tannalum (Aluminium tannicotartar.) wewn. jako środek ściągający do zasypek, zadmuchiwań, wcierań i penzlowań (20%₀) 1:0 = 10 kr.

Tannigen szary proszek nierozp. w wodzie rozszczepia się w jelitach uwalniając kw. karbnik.; wewn. na koniec noża k. r. d.; zewn. do nadmuchiwań. 1:0 = 10 kr.

Taraxaci folia do species, decoct. (10:0—15:0:100). 100 = 10 kr. — ***Rad. Tarax.** tak samo stosow. 10:0 = 1 kr. — ***Extract. Tarax.** 10:0—30:0 *p. d.* 10:0 = 16 kr.

Tartarus boraxatus (kalium tartaric. boraxat.) 0:50—2:0 *p. d.* w rozpuszcz. (jako diureticum), 5:0—7:0 *p. d.* jako laxans. 10:0 = 15 kr.

— **depuratus** zob. kalium hydrotartaricum.

— **natronatus** zob. Kalium natrotartaric.

— **stibiatus** zob. Kalium stibiotartaric.

Taxi baccatae folia 0:10—0:50 *p. d.* k. r. d. w proszku, inf. (0:50—2:0:100). Extr. T. b. 0:05—0:30 *p. d.*

***Terebinthina** (communis) zewn. do maści, plastr. (1:0:3) 100 = 8 kr. — ***Tereb. veneta.** wewn. 0:30—1:0 *p. d.* k. r. dz. w pig., emulsyi; zewn. do przestrzykiw. (1:0—4:0:100), wziewań, maści, liniment., lewatyw (4:0—8:0). 10:0 = 3 kr. — **Tereb. cocta** stosow. tak samo. — ***Ol. Tereb.** 100 = 13 kr. — ***Ol. T. rectificatum** 10:0 = 2 kr. — **Sapo Tereb., Ungu. Tereb.** stosow. szczególnie w odmrożeniach. 1:0 = 4 kr.

Terpinolum płyn bezbarwny, lotny, w wodzie nierozpuszcz.,

- stosow. w nieżytach dróg oddech. 0.10—0.50 *p. d.* w kaps. 1.0 = 5 kr.
- Terpinum hydratum** 0.20—0.40 *p. d.* — 1.0 *p. die*, w proszkach, pig., mixt. 1.0 = 3 kr.
- Tetronalum** kryształki rombiczne, bezbarwne, w wodzie słabo rozpuszcz., 1.0 *p. d.* jako hypnotic. 1.0 = 60 kr.
- Teuerinum** (Teucrium Scordium) płyn ostrego smaku, zapachu czosnku, stosow. w miejscowej gruźlicy celem wywołania reakcyi, 3.0 na jedno zastrzyknięcie; wewn. 0.50 *p. d.* jako stomaec. 1.0 = 3 zhr.
- Thallinum sulfuricum** wewn. 0.20—0.50 *p. d.* jako antipyretic. rozpuszcz. w wodzie lub winie, z dodatkiem Syrup. cortic. aurantior.; zewn. do przestrzyk. (1—2%) do świeczek. 1.0 = 40 kr. — Tak samo stosuje się **Thall. tannicum** 1.0 = 25 kr. i **Thall. tartaricum** 1.0 = 35 kr.
- ***Theae folia** 10.0 = 16 kr. — **Theinum** zob. Coffeinum.
- Theobrominum natriosalicylicum** zob. Diuretinum.
- Thermodinum** (oxyphenylurethan) kryształki słabo w wodzie rozpuszcz., antipyretic. w dawce 0.50—0.70 *p. d.* (dla dzieci 0.20—0.30). 1.0 = 20 kr.
- Thilaniin** constit. do maści, zawiera 3% siarki. 1.0 = 5 kr.
- Thioform** (Bismuthum dithiosalicylicum) 0.3 *p. d.* jako antyseptyk kiszkowy; zewn. czysty do zasypek na wrzody, oparzenia. 1.0 = 10 kr.
- Thiolum** (fabric. Riedel) jako **Th. siccum** 10.0 = 90 kr. brunatny proszek i **Th. liquidum** 10.0 = 30 kr. ciecz ciemnobrunatna syropowata, oba łatwo w wodzie rozpuszcz. stosow. zewn. w rozpuszcz. (10%) w ostrych zapalnych chorobach skóry.
- Thiophendijodid**. tabliczki krystal., nierozpuszcz. w wodzie, stosow. w proszku zam. jodoformu lub w postaci gazy (10%). 1.0 = 60 kr.
- Thioresorcinum** szary proszek nierozp. w wodzie polec. w miejsc. jodoformu; do maści 5%. 1.0 = 8 kr.
- Thiosinaminum** polecony do wstrzykiwań podskórnych w liszaju żrącym (lupus). 1.0 = 18 kr.
- Thujae frond.** tylko zewn. jako zasypka. 10.0 = 3 kr.
- Thymi herb.** i **Ol.** stosow. jak Herb i Ol. Serpylli. 1.0 = 3 kr.
- ***Thymolum** 0.05—0.10 *p. d.* k. r. d. jako antifermentativ.; 1.0—2.0! *p. d.* jako antifebril., antirheumatic, w proszku lub rozpuszcz. w alkohol., alkaliach; zewn. jak acid. carbolie. 1.0 = 8 kr.
- Thyreodinum nieccatum** (Merk) w niskiej ciepłocie wysuszony i sproszkowany gruczoł tarczycowy owcy. 0.1—0.2 *pro die* w proszku lub pastylkach postępując w górę aż do 0.4 *pro die* stos. w myxoedema, psoriasis. 1.0 = 30 kr.
- Thyrojodin** działający składnik gruczołu tarczycowego, około 10% jodu zawierający (w handlu znajduje się mieszanina z cukrem w tym stosunku że 1.0 mieszaniny zawiera $\frac{3}{10}$ jodu, 0.3— *pro dosi* 1—3 razy dnia w proszku, tabletkach — najwyżej 2.0—4.0 *pro die*; dzieciom o połowę mniej.
- ***Tiliae flores** 10.0 = 3 kr. stosow. jak Flor. Sambucci.

- ***Tinct. amara** (Hb. centauri, Fruct. aurant. immat., Rad. Gent., Rhiz. Zedoar) 20—60 kropli *p. d. k. r. d.* 10·0 = 5 kr.
- Tinct. aromatica** (Cort. Cinam. Cas. 5, Rh. Zing. 2, Fruct. Cardam, Caryoph. $\bar{a}\bar{a}$ 1:50 Spirit. diluti). 10·0 = 4 kr. —
- Tinct. aromat. acida.** 10·0 = 4 kr.
- Tolypyrinum** (fabric. Riedel) kryształki bezbarwne, smaku gorzkiego, w wodzie rozpuszcz., działa podobnie jak antipyrina (antineuralg., antirheum.) 1·0 *p. d.* co godz. (4 proszki). 1·0 = 20 kr.
- Tolysalum** (Tolypir. salicylicum) kryształy w wodzie rozpuszcz. działa podobnie jak poprzedni 1·0—2·0 *p. d.* co godz. (6·0! *p. die*). 1·0 = 15 kr.
- Tormentillae rhiz.** 0·50—2·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., decoct. (5·0—20·0:100), zewn. do płukań, przestrzyk., okładów. 10·0 = 4 kr.
- Tragacantha** (gummi) wewn. 1·0—4·0 *p. d.*; zewn. jako emulg, constit. 10·0 = 16 kr.
- Tribromphenol** zob. Bromol.
- ***Trifolii fibrini fol.** 10·0 = 4 kr. — ***Extr. Trif. f.** 10 = 18 kr., stosow. jak Fol. i Extr. Centauri.
- Trimethylaminum** zob. Ppropilaminum.
- Trionalum** delikatne kryształki, rozpuszcz. w letniej wodzie 1·0—1·50 *p. d.* ma działać pewnie w bezsenn. 1·0 = 16 kr.
- Tritici farina** 100 = 8 kr.
- Trypsinum** 0·10 = 10 kr., stosow. jak pancreatinin.
- Tumenolum** constit. dla maści, także rozpuszcz. w alkoh. jako tinct., pasta, stosow. w chorob. skóry. 1·0 = 7 kr.
- Tussol** (Antipyrin. phenolo-glycolicum) proszek w wodzie rozpuszcz.; stosow. w krztuścu, w dawce do 1 roku 0·01; do 3 lat 0·10; do 5 lat 0·25 *p. d.* 1·0 = 18 kr.
- ***Unguent. aromaticum Autenriethi** zob. Kal. stibiotaric. 10·0 = 5 kr.
- **basilicum** (z Terebin.). 10·0 = 4 kr.
- **cereum** (cerae flav. 3, Ol. Oliv. 7).
- ***emolliens** zob. Cetaceum. 10·0 = 10 kr.
- ***simplex** zob. Axungia. 10·0 = 4 kr.
- Uranium nitric.** żółte w wodzie rozp. krysz. 0·05—0·1 *p. d.* 2 razy dnia aż do 0·5—1·0 *p. d.* polecane w cukrówie. 1·0 = 20 kr.
- Urethanum** jako hypnotic. 1·0—30 *p. d.* także jako odtrutka w zatruciu strychniną (4·0—5·0) w proszk., (charta cerata), w kapsułk., w rozpuszcz. w wodzie; podskórn. 0·25 *p. d.* 1·0 = 10 kr.
- Uricedinum** 1·0—2·0 *p. d. k. r. d.* w skazie moczowej. Mocz staje się alkalicznym. 10·0 = 45 kr.
- Uropherinum salicylicum** (Lith. theobrom. salicyl.) 3·0—4·0 *p. die* w roztworze wodn.; moczopędny jak diuretinum. 1·0 = 4 kr.
- Urotropinum** rozp. w wodzie proszek oddz. alkalicz. posiada własn. rozpuszcz. kw. moczowego, 1·0—15 *p. d.* rozp., w wodzie rano zażyć. 0·10 = 4 kr.

- ***Uvae ursi folia** 0·50—3·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., decoct. (20·0—60:100 coll.) do species. 100 = 13 kr.
- ***Valerianae radix** 0·50—2·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., maceracyi lub infus. (5·0—15·0:100); do lewatyw (w decoct). 10·0 = 4 kr. — **Aqua Valer.** 100 = 12 kr. — **Extr. Valer.** 0·50—1·0 *p. d.* w pig., mixt., do lewatyw. 1·0 = 3 kr. — ***Ol. Valer.** 1—4 kropli *p. d. k. r. d.* 1·0 = 10 kr. — ***Tinct. Valer.** 20—50 kropli *p. d.* 10·0 = 3 kr. — **Tinct. Valer. aether.** 10·0 = 5 kr. — **Tinct. Valer. ammoniata** 10·0—20 kropli *p. d. k. r. d.*
- ***Vanillae fruct.** 0·05—0·60 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., infus. (3·0—5·0:100); zew. jak corrig. consperg. 1·0 = 12 kr. — ***Tinct. V.** 30—60 kropli *p. d. k. r. d.* 1·0 = 3 kr. — **V. saccharata** (Elaeosacchar. V.). — **Vanillinum** 0·01—0·02 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszk., pig., mixt. 0·10 = 15 kr.
- ***Vaselinum** zob. Paraffinum.
- Veratri albi radix** (rhiz.) 0·05—0·15—0·30! *p. d.* — 1·0! *p. die* w proszk., pig., w infus. l. decoct. (0·30—1·0:100); zewn. jako proszek do wdmuchiwań do nosa, w decoct. do okładów, także do maści (1·0:5·0). 10·0 = 6 kr. — **Tinct. Ver.** 3—10 kropli (0·50!) *p.* — 2·0! *p. die* z istotami klejkami; zew. do penzlow. 10·0 = 6 kr.
- ***Veratrinum** wew. 0·0005—0·001—0·005! *p. d.* — 0·02! *p. die* w pig., proszk., rozpuszcz. w alkoholu; zewn. do nacierań (0·10—0·50:10 alcohol.), do maści, podskórnice (0·001). 0·01 = 4 kr.
- ***Verbasci flores** 10·0 = 6 kr. — **V. folia** stosow. jak flor. i fol. Malvae.
- Viburni prunifolii cort** jako Extr. 2·0—5·0 *p. d.* 1—4 r. dz. 1·0 = 2 kr.
- ***Violae tricoloris herb.** 1·0—5·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., inf., decoct. (10·0—15·0:100), succus recens; zewn. do okładów, kąpieli (infus.). 100·0 = 14 kr.
- Xeroform** zob. Bismuthum tribomphen.
- Xylolum** wew. 15—30 kropli w kapsułk. 1·0 = 1 kr.
- ***Zedoariae rad** (rhiz) stosow. jak Rad. Zingiberis. 10·0 = 4 kr.
- Zincum aceticum** wewn. 0·03—0·10! *p. d. k. r. d.* — 0·30! *p. die* (jako środek wymiotny 0·50 aż do skutku); zewn. do płukań (1·0:100), do opatrunków, przemywań, przestrzykiwań (1·0—5·0:100), do cewki moczowej (0·25—1·0:100), do ucha (2·0—4·0:100), w maści (1·0—10·0). 1·0 = 1 kr.
- ***chloratum** wewn. 0·003—0·01—0·015! *p. d.* — 0·10 *p. die* rozpuszcz. w wodzie, eterze lub pigułk.; zew. w substancyi przeciw bólowi zębów, do opatrunków (1·0:100—500), do przestrzykiwań (0·25—0·50:100), do penzlow. (0·10—1·0:25), do maści (1·0:10·0), jako pasta żrąca (1·0:4·0 pulv. rad. alth.). 10·0 = 10 kr. — **Liquor Landolfi s. Aurum chloratum** (Zinc., aur., stib., Brom. chlorat. āā 1, Farina tritic.).
- **cyanatum** 0·005! *p. d.* postępując w górę aż do 0·03 *p. d.* 1—4 r. dz. w proszk., pig., do maści do ocz (0·10:1). 0·01 = 1 kr. — **Z. ferrocyanat.** 0·03—0·15 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig. 1·0 = 3 kr.

- ***Zincum oxydatum** 0·05—0·20—0·40 *p. d.* k. d. — 2·0 *p. die* w pig., proszk., mixt.; zewn. jako zasypka, proszek do ocz (1·0:1—5 sacch.), do wdmuchiwań do krtani, woda do ocz (0·20—1·0:25), do maści (1·0—5·0:20), do czopk. (1·0:5·0). 10·0 = 20 kr. — ***Uguent. Zinci oxydat** 10·0 = 12 kr.
- **phosphoratum** 0·001—0·005 *p. d.* 2—3 r. d. w pig., proszk., 0·10 = 1 kr.
- **sulfocarbolicum** tylko zewn. do okładów, opatrunk. (1·0:100—200), do przestrzykiwań do cewki (0·05—1·0:100), do pochwy (0·10—1·0:100). 1·0 = 2 kr.
- ***sulfu icum** 0·005—0·01—0·05! *p. d.* — 0·30! *p. die*; jak, alter. inauseos; jako emetic. 0·30—0·50—0·80! *p. d.* aż do skutku; zew. do wdmuchiwań do nosa, krtani, ocz (1·0:5·0 sacch.), do płukań gardła (0·10—0·50:100), do penzlow. (1—20/0), do kąpieli, maści (0·10—1·0:100), jako środek żrący w pręcikach l. w zgęszczonym rozpuszcz. (1·0:2·0). 10·0 = 3 kr. — ***Collyrium adstring. luteum** (Zinc. sulf. 1, Aqu. 100, Spirit. ammon. chlor., Camphor., Crocus). 10·0 = 3 kr.
- **valerianicum** 0·03—0·06! *p. d.* — 0·30! *p. die* w proszk. lub pig. 1·0 = 4 kr.
- ***Zingiberis rad.** (rhiz) 0·30—1·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., powidelk., infus. (5·0—20·0:100); zew. do płukań (w infus. 10·0—15·0:100). 10·0 = 5 kr. — **Tinct. Z.** 10—30 kropli *p. d.* 10·0 = 5 kr.



Najwyższe dawki środków leczniczych

których lekarz przekraczać nie powinien
nie oznaczywszy wykrzyknikiem (!)

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0·005	0·02
„ carbolicum	0·10	0·50
Apomorphinum hydrochloricum	0·01	0·05
Aqua Amygdalarum amarum concentrata.	1·50	5·00
„ Laurocerasi	1·50	5·00
Argentum nitricum	0·03	0·20
Atropinum sulphuricum	0·001	0·003
Cantharides.	0·05	0·20
Chloralum hydratum	3·00	6·00
Chloroformium	0·50	1·00
Cocainum hydrochloricum	0·10	0·30
Codeinum mur.	0·05	0·15
Codeinum phosph	0·10	0·40
Coffeinum	0·20	0·60
Cuprum sulfuricum qua emeticum	0·40	—
Extractum Aconiti radices	0·03	0·12
„ Belladonnae foliorum.. . . .	0·05	0·20
„ Cannabis Indicae	0·10	0·30
„ Colocynthis	0·05	0·20
„ Conii herbae	0·20	0·60
„ Hyoscyami foliorum	0·10	0·50
„ Opii	0·10	0·40
„ Scillae	0·20	1·00
„ Secalis cornuti	0·50	1·50
„ Strychni	0·05	0·15
Folia Belladonnae	0·20	0·60
„ Digitalis	0·20	0·60
„ Hyoscyami	0·30	1·00
„ Stramonii	0·30	1·00
Fructus Colocynthis	0·30	1·00
Herba Conii	0·30	2·00
Hydrargyrum bichloratum corrosivum	0·03	0·10
„ bijodatum rubrum	0·03	0·10
„ jodatum flavum	0·05	0·20
„ oxydatum flavum	0·03	0·10
Jodoformium	0·20	1·00
Jodum	0·03	0·10
Kreosotum	0·10	0·50

	pro dosi	pro die
Lactucarium	0·30	1·00
Morphinum hydrochloricum	0·03	0·12
Oleum Crotonis	0·05	0·10
Opium	0·15	0·50
Paraldehydum	5·0	10·0
Phenacetinum	0·50	3·0
Phosphorum	0·001	0·005
Physostigminum salicylicum	0·001	0·003
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06
Plumbum aceticum	0·10	0·50
Radix Aconiti	0·10	0·50
„ Belladonnae	0·07	0·30
Santoninum	0·10	0·30
Secale cornutum	1·00	5·00
Semen Strychni	0·12	0·50
Solutio arsenicalis Fovleri	0·5	2·00
Stibium Kalio-tartaricum	0·2	0·50
Strychninum nitricum	0·007	0·02
Sulfonalum	4·0	8·0
Thallinum sulfur	0·20	1·50
Tinctura Aconiti radiceis	0·50	1·50
„ Belladonnae foliorum	1·00	4·00
„ Cantharidum	0·50	1·00
„ Colchici seminis	1·50	5·00
„ Digitalis	1·50	5·00
„ Jodi	0·30	1·00
„ Lobeliae	1·00	5·00
„ Opii crocata }	1·50	5·00
„ „ simplex }	1·50	5·00
„ Strophanthi	1·00	3·00
„ Strychni	1·00	3·00
Veratrinum	0·005	0·02
Vinum Colchici seminis	1·50	5·00
Zincum sulfuricum qua emeticum	0·80	—

Waga różnych dawek.

Łyżeczka cieczy waży mniej więcej 3—5 grm. Łyżeczka cukru, soli, siarki 2·5—5 gram., proszków różnych 2·50. Łyżka wody 15 grm. Łyżka syropu 20·0. Garść nasion 70—80 grm; Garść liści 20—30 gr. Szczypta kwiatu 2 grm. Litry wody dest. 1000·0; litr spirytusu 850; litr chloroformu 1480; litr oliwy 920·00 szklanka 200—250·0; kieliszek 70—80 grm.

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	od 5—10 lat
Hydrargyrum tannicum oxydulat.	0·005	0·02	0·03
Hydrochinon	0·05	0·2	0·3
Kalium bromatum	0·1	0·3	0·5
Kalium chloricum } pro die . . .	1·0	2·0	3·0
Kalium jodatum }	0·1	0·5	1·0
Kreosotum	0·005	0·01	0·02
Liquor Ferri sesquichlorati pro die	0·3	0·5	0·5
Liquor Kalii arsenicosi	—	0·05	0·1
Morphinum hydrochloricum	—	0·001	0·003
Naphtalinum	0·05	0·2	0·2
Natrium paracresotinicum	—	0·25	0·5
Natrium salicylicum pro die . . .	1·0	2·0	3·0
Phenacetinum antipyr.	—	0·1	0·3
antispasm.	0·001	0·05	0·1
Pilocarpinum hydrochloricum (inj.)	0·001	0·002	0·004
Plumbum aceticum	0·003	0·005	0·01
Phosphorus	—	0·0001	0·0002
Podophyllum	—	0·005	0·015
Pulvis Ipecacuanhae opiatu . . .	—	0·005	0·02
Radix Ipecacuanhae emetic. . . .	0·05	0·1	0·2
Resorcinum	0·2	0·4	0·5
Santoninum	—	0·01	0·02
Syrupus Ferri jodati	1 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Strychninum nitricum (inj.) . . .	—	0·0005	0·001
Tartarus stibiatus	—	0·0075	0·01
Thallinum sulphuricum	0·01	0·02	0·03
Tinctura Opii simplex	0·025	0·05	0·2
Tinctura Strophanthi	0·02	0·05	0·10
Urethanum	0·05	0·1	0·2

Porównanie dawki leków

według rozmaitego wieku chorych.

Dawki zmieniają się mniej więcej, jak następuje:

aż do ukończonego	1	roku	$\frac{1}{10}$
od 2	do 4	"	$\frac{1}{8}$
" 5	" 7	"	$\frac{1}{5}$
" 8	" 10	"	$\frac{1}{4}$
" 11	" 14	"	$\frac{1}{2}$

Począwszy od roku 50 należy dawki znowu zmniejszać tak, iż u starców między rokiem 60 a 70 należy znów dawać tylko $\frac{1}{3}$ dawki dla osób dorosłych.

Kobietom zadają się wogóle mniejsze dawki, mniej więcej $\frac{2}{3}$ tej, jaką się przepiśuje mężczyznom odpowiedniego wieku.

Cennik robót receptowych

według „Arznei-Taxe für das Jahr 1897“.

L. p.

1. Za **odparowanie** w kąpieli wodnej 100 gr. plynu po 10 ct.
2. Za sporządzenie **rozczyntu** z leków stałych, powidełek (Roob), wyciągów suchych i ciągnących się, jakoteż z oleju-cukru (włącznie ze zrobieniem tegoż), w płynie o zwyczajnej lub też podwyższonej ciepłocie wraz z cedzeniem — następnie za **rozcieranie** powideł, pulp i miękkich mydeł celem zrobienia płynnego lekarstwa — wreszcie za rozcieranie ciał różnej konsystencji z płynami, w których nie są weale, lub częściowo tylko rozpuszczalne 7 ct.

Uwaga:

- a) W razie, gdyby sporządzenie leku wymagało kilku zajęć, objętych l. p. 2, wolno cenę 7 ct. zaliczyć raz tylko.
- b) Jeżeli środek, użyty do rozczyntu, zawarty jest w cenniku lekarstw w dwojakiej postaci: krystalicznej i sproszkowanej, zalicza się cenę krystalicznego.
- c) Za rozpuszczanie względnie rozcieranie substancyj, wymienionych pod l. p. 2, nie wolno nie liczyć, jeżeli to służy do sporządzenia powideł, plastrów i woskowca (ceratum), pigułek, galek i pastylek, mazidla (linimentum), czopków, kul lub pręcików. (Zob. l. p. 16, 19—31-42—49).
3. Za rozczynienie fosforu w tłustych i eterycznych olejach, eterze lub alkoholu 15 ct.
4. Za **ściśnięcie** ciał suchych (tabletki) włącznie z wszystkiemi do tego potrzebnemi robotami należy się za każdą sztukę po 5 ct.
5. Za sporządzenie **odwaru** (decoctum) wraz z ważeniem wody i cedzonki (colatura) w ilości do 200 gr. 18 ct.
za każde 100 gr. nadwyżki po 2 ct.
6. Jeżeli lekarz żąda, by gotowanie trwało przynajmniej całą godzinę, podwyższa się cenę o 7 ct.

Uwaga:

Jeżeli do odwaru wsypuje się przy końcu inną substancję, nie przedłużając przez to czasu gotowania, to czynność ta nie wchodzi w rachubę. Jeżeli zaś inną substancję zaparza się gotowym już odwarem, to cena odwaru zwiększa się o połowę.

7. Za sporządzenie **naparu** (infusum) włącznie z odważeniem wody i cedzonki do 200 gr. 15 ct.
a za każde dalsze 100 gr. po 2 ct.

L.p.

8. **Wytrawianie** (digestio), nie trwające dłużej jak 24 godzin, liczy się jako napar;
za następne 24 godzin przy jakiegokolwiek ilości więcej o 5 ct.
9. Za **wymoczenie** (maceratio), trwające 24 godzin, liczy się połowę tego, co za napar;
za każde następne 24 godziny przy jakiegokolwiek ilości więcej o 2 ct.
10. Za **wydanie i zapakowanie** (dispensatio) leku niepiynnego, n. p. ziółek lub proszku, należy się z papierem i sygnatura za 200 gr. = 3 ct.; od 200 do 500 gr. = 5 ct.;
za ilość większą 7 ct.
11. Za wydanie plastra nierozsmarowanego lub też woskowca (ceratum) wraz z papierem woskowym, zawinięciem, umieszczeniem napisu za 200 gr. = 5 ct.; nad 200 do 500 gr. = 7 ct;
za większą ilość 10 ct.
12. Za wydanie plastra rozsmarowanego w ilości 500 cm. [2]
wraz z papierem woskowym, zawinięciem i sygnaturą 5 ct.
za większą ilość 8 ct
13. Za sporządzenie **mleczanki** (emulsio) wraz z ważeniem użytej do tego wody i cedzonki bez względu na ilość 12 ct.
14. Za każde przepisane lub nieodzownie konieczne **przesączanie** w ilości do 100 gr. 3 ct.
ponad 100 do 500 gr. = 5 ct.; za każde następne 500 gr. po 2 "
15. Za zrobienie **galarety** w ilości 200 gr. 25 "
nad 200 gr. za każde 100 gr. 10 "
16. Za zrobienie **powideł** (electuarium) w ilości 200 gr. 15 "
a za każde 100 gr. nadwyżki 5 "
17. Za sporządzenie **serwatki**, żentycy (serum lactis) włącznie z potrzebnem do tego mlekiem, lecz bez wypienienia (clarificatio) za 200 gr. 20 ct.
a za każde dalsze 200 gr. po 10 "
18. Za tożsamo lecz z **wypienieniem** za pomocą białka i przesączaniem za 200 gr. 30 ct.
za każde następne 200 gr. po 15 "
19. Za sporządzenie **plastra** (empl.) przez rozmięczenie, mieszanie, ugniatanie i wałkowanie (malaxatio) w ilości 200 gramów 10 ct.
za każde dalsze 100 gr. po 3 "
20. Za sporządzenie plastra lub woskowca (ceratum) przez topienie wraz z domieszaniem innych ciał i wałkowaniem za 200 gr. 20 ct.
dalsze 100 gr. po 5 "
21. Za **rozsmarowanie** plastra lub woskowca z rozmięczeniem lub topieniem za 100 [2] cm. 15 ct.
za każde następne 100 cm.² po 5 "
22. Za potrzebne do tego **płócienco** lub szyrtyng o powierzchni 100 cm.² po 3 ct.
a materyę jedwabną lub skórę za każde 100 cm.² 10 "
23. Za zrobienie **masy** do **pigułek**, gałek (bolus), lub pastylek (trochisci) za 10 gr. 10 ct.
dalsze 10 gr. po 5 "

I. p.

24. Za przetopienie wosku i t. p. z balsamem lub olejem do sporządzenia masy pigułkowej, dolicza się jeszcze nadto za wszelką ilość 5 ct.
25. Za **ukształtowanie** 30 lub mniej **pigulek** bez względu na ich wielkość, za ważenie i posypanie ich widłakiem (lycopodium) 10 ct.

Uwaga:

- a) Jeżeli lekarz nie wymienia, jaka ma być podsypka, należy użyć widłaka.
- b) Jeżeli lekarz zapisuje inną podsypkę, to liczy się za nią osobno według taksy, biorąc w rachubę $\frac{1}{3}$ część ciężaru masy pigułkowej.
26. Za ukształt. i powleczenie 30 pigulek balsamem tolutańskim lub innym środkiem, poniżej nie wymienionym, wraz z tymże 15 ct.
27. Za ukształtowanie i posrebrzanie 30 pigulek 20 "
28. Za ukształtowanie i pozłocenie 30 pigulek 30 "
29. Za ukształtowanie i powleczenie pigulek kleiną (collodium) lub gelatyną (robienie gelatyny osobno) za sztukę po 1 ct.
30. Za ukształtowanie i powleczenie pigulek keratyną, włącznie z masą keratynową — za sztukę po 4 ct.
31. Za ukształtowanie galek (bolus) lub pastylek (trochisci) wraz z potrzebnem do tego ważeniem, jakoteż posypaniem proszkiem do 10 sztuk. za każdą po 2 ct.
a nad 10 za każdą następną po 1 "
32. Za **rozcieranie** leków w kryształach, które mają być wydane jako **proszek**, należy się za 10 gr. 5 ct.
jeżeli taksa nie podaje ceny za lek już sproszkowany — nadto za każde dalsze 10 gr. o 1 ct. więcej.

Uwaga:

Za rozcieranie proszków drobnych nie należy nie liczyć.

33. Za **zmieszanie** proszków wraz z potrzebnem do tego rozcieraniem należy się za 100 gr. 10 ct.; za większe ilości 15 ct.
34. Za mieszanie proszków z płynami lub gęstymi wyciągami (extractum), oraz za sporządzenie olejocukru w razie potrzeby domieszania go, należy powyższe ceny o połowę zwiększyć bez względu na to czy proszki będą podzielone czy nie.
35. Za **podzielenie** i zapakowanie pewnej ilości proszków wraz z ważeniem, torebkami ze zwykłego papieru, kopertą (convolutum) i napisem, za każdy do 10 włącznie po 2 ct.
a następne po 1 "
36. Jeżeli torebki zrobione z papieru, napojonego woskiem lub parafiną, należy policzyć za każde 2 sztuki o 1 centa więcej niż powyżej.
37. Jeżeli proszki mają być wydane w opłatkach (*in capsulis amyloaceis*) liczy się za rozdzielenie i za kapsułki do 10 sztuk po 3 ct.
a za każdą następną tylko po 2 "

L.p.

38. Za wydanie proszków lub innych leków w kapsułkach nakrywkowych (*in capsul. gelat. operculatis*) należy się za każdą kapsułkę po 3 ct.
39. Jeżeli do proszków mają być dołączone białe opłatki pocięte, to zalicza się za każde 2 sztuki wraz z wydaniem w kopercie po 1 ct.

Uwaga:

Określenie „pulv.“ w cenniku należy pojmować jako pulvis subtilissimus.

40. Za mieszanie proszków **nie miałkich** bez względu na to, czy będą podzielone czy nie, liczy się za 200 gr. 5 ct.
a za następną taką ilość po 3 „
41. Za dzielenie takichże proszków lub ziólek na więcej części należy się z odważeniem, torebkami, kopertą i napisem za każdą dawkę do zawartości 100 gr. po 2 ct.
a gdy zawartości większe po 3 „

Uwaga:

Za mieszanie ziólek samych nie się nie należy.

42. Za zrobienie **maści** lub **mazidla** (linimentum) przez zmieszanie kilku maści i tłuszczów z mydłem potasowem lub z płynnymi środkami, bez topienia, za 200 gr. 10 ct.
za większą ilość 15 „

Uwaga:

- a) Za mieszanie olejków eterycznych lub tłuszczów płynnych z innymi płynami wolno liczyć tylko za samo ważenie. Wyjątek od tego stanowi sporządzanie mleczanki (zob. l. p. 13).
- b) Za zrobienie mieszaniny z liniment. saponato-camphor. z chloroformem lub innymi płynami należy oprócz ważenia policzyć jeszcze 5 ct. za topienie. Mieszanie opodeldoku z wyciągami lub lekami stałymi ocenia l. p. 44.
43. Za zrobienie maści lub mazidla przez zmieszanie proszków, wyciągów i innych niepłynnych substancyj z maściami i tłuszczami bez topienia za 200 gr. 15 ct.
a za większą ilość 20 „
44. Za zrobienie maści przez topienie wraz z domieszaniem innych leków za 200 gr. 20 ct.
za większą ilość 25 „
45. Za rozdzielenie lub wydanie maści w kilku dawkach wraz z ważeniem, papierem woskowym, zawinięciem (convolutum) i napisem, do 10 dawek za każdą po 3 ct.
za każdą następną 2 „
46. Za **nasycenie** (saturatio) wraz z potrzebnym do tego rozczynem bez względu na ilość 15 ct.
47. Za ugniecenie lub stopienie masy celem sporządzenia **czopków** (supposit.), kul (globul.), lub pręcików z masła Cacao, gelatyny i innych środków, za 15 gr. 10 ct.
za następną taką ilość po 5 „

L. p.

48. Za kształtowanie czopków i kul wraz z odważeniem, posypaniem i zawinięciem, za sztukę 5 ct.
49. Za kształtowanie przecików (bacilli) wraz z odważeniem, posypaniem i zawinięciem, do 10 sztuk, za każdą po 10 ct. za następne po 6 „
50. Za **opieczętowanie** naczyńia gdzie to jest wskazane 3 „
51. Za każde do sporządzenia lekarstwa potrzebne **ważenie** lub odliczanie kropeł, jakoteż **liczenie** pigułek lub pastylek należy się 1 ct.

Uwaga:

Jeżeli lekarz zaznaczył na receptce: „detur bis, ter“ i t. d., powinno się za wielokrotne, ale równoczesne wydanie lekarstwa liczyć tak, jakoby w całości zostało sporządzone i na kilka części podzielone.

Zwykłe flaszki ze szkła zielonego wraz z korkiem i napisem:

$$a) \text{ okrągłe: } \frac{50 \text{ gr.}}{6 \text{ ct.}}, \frac{200 \text{ gr.}}{7 \text{ ct.}}, \frac{300 \text{ gr.}}{8 \text{ ct.}}, \frac{500 \text{ gr.}}{10 \text{ ct.}}$$

ponad 500 gr. za każde dalsze 500 gr. pojemności o 4 ct. więcej

b) Sześcioboczne na leki do zewnętrznego użytku:

$$\frac{50 \text{ gr.}}{7 \text{ ct.}}, \frac{200 \text{ gr.}}{8 \text{ ct.}}, \frac{300 \text{ gr.}}{10 \text{ ct.}}, \frac{500 \text{ gr.}}{14 \text{ ct.}},$$

ponad 500 gr. za każde dalsze 500 gr. pojemn. o 5 ct. więcej.

Flaszki o szerokich szyjkach mogą być o 2 ct. drożej policzone.

Silne białe flaszki na leki wraz z korkiem i napisem:

$$a) \text{ okrągłe: } \frac{50 \text{ gr.}}{9 \text{ ct.}}, \frac{200 \text{ gr.}}{11 \text{ ct.}}, \frac{300 \text{ gr.}}{13 \text{ ct.}}, \frac{500 \text{ gr.}}{16 \text{ ct.}},$$

ponad 500 gr. pojemności za każde następne 500 gr. o 6 ct. więcej.

b) Sześcioboczne na leki do zewnętrznego użytku:

$$\frac{50 \text{ gr.}}{10 \text{ ct.}}, \frac{200 \text{ gr.}}{13 \text{ ct.}}, \frac{300 \text{ gr.}}{15 \text{ ct.}}, \frac{500 \text{ gr.}}{19 \text{ ct.}},$$

ponad 500 gr. pojemności, za każde następne 500 gr. o 8 ct. więcej.

Flaszki o szerokich szyjkach mogą być o 3 ct. drożej policzone.

Żółte, niebieskie lub czarne flaszki na leki z korkiem i napisem:

$$a) \text{ okrągłe: } \frac{20 \text{ gr.}}{10 \text{ ct.}}, \frac{50 \text{ gr.}}{12 \text{ ct.}}, \frac{200 \text{ gr.}}{14 \text{ ct.}},$$

ponad 200 gr. pojemności, za każde następne 100 gr. o 2 ct. więcej.

b) Sześcioboczne na leki do zewnętrznego użytku:

$$\frac{20 \text{ gr.}}{11 \text{ ct.}}, \quad \frac{50 \text{ gr.}}{13 \text{ ct.}}, \quad \frac{200 \text{ gr.}}{15 \text{ ct.}},$$

ponad 200 gr. za każde następne 100 gr. pojemności o 3 ct. więcej.

Flaszeczki z dzióbkiem patentowane (kroplomierze) z napisem:

$$\frac{15 \text{ gr.}}{25 \text{ ct.}}, \quad \frac{50 \text{ gr.}}{30 \text{ ct.}}$$

Pudełka na masę: z drzewa napuszczanego z nakrywką i napisem:

$$\frac{20 \text{ gr.}}{6 \text{ ct.}}, \quad \frac{50 \text{ gr.}}{7 \text{ ct.}}, \quad \frac{100 \text{ gr.}}{8 \text{ ct.}}, \quad \frac{200 \text{ gr.}}{10 \text{ ct.}}, \quad \frac{300 \text{ gr.}}{12 \text{ ct.}}, \quad \frac{500 \text{ gr.}}{15 \text{ ct.}},$$

za dalsze 100 gr. 3 ct.

Słoiki zwyczajne szklane z napisem:

$$\frac{20 \text{ gr.}}{6 \text{ ct.}}, \quad \frac{100 \text{ gr.}}{8 \text{ ct.}}, \quad \frac{200 \text{ gr.}}{10 \text{ ct.}}, \quad \frac{300 \text{ gr.}}{14 \text{ ct.}}, \quad \frac{500 \text{ gr.}}{22 \text{ ct.}},$$

za następne 500 gr. pojemności o 12 ct. więcej.

Słoiki porcelanowe z nakrywką metalową i napisem

$$\frac{20 \text{ gr.}}{10 \text{ ct.}}, \quad \frac{50 \text{ gr.}}{15 \text{ ct.}}, \quad \frac{100 \text{ gr.}}{20 \text{ ct.}}, \quad \frac{200 \text{ gr.}}{30 \text{ ct.}},$$

nad 200 gr. pojemności, za każde następne 100 gr. o 10 ct. więcej.

Pudełka tekturowe bez wcięcia na brzegu z napisem

$$\frac{50 \text{ gr.}}{5 \text{ ct.}}, \quad \frac{100 \text{ gr.}}{6 \text{ ct.}}, \quad \frac{200 \text{ gr.}}{8 \text{ ct.}},$$

za następne 100 gr. pojemności o 1 ct. więcej.

Pudełka tekturowe o brzegu wciętym i z napisem:

$$\frac{20 \text{ gr.}}{5 \text{ ct.}}, \quad \frac{50 \text{ gr.}}{7 \text{ ct.}}, \quad \frac{100 \text{ gr.}}{8 \text{ ct.}}, \quad \frac{200 \text{ gr.}}{12 \text{ ct.}},$$

nad 200 gr. pojemności za każde następne 100 gr. o 2 ct. więcej.

Pudełka takie złożone mogą być dwa razy droższe.

Pudełka szufladkowe (przesówki) z napisem:

na 6 proszków, jeżeli nie ważą razem nad 6 gr., sztuka 6 ct.

nad 6 proszków, dla 6 następnych o 2 ct. więcej; —

na 6 proszków, jeżeli razem ważą więcej niż 6 gr., sztuka 8 ct.;
gdy więcej proszków, dla następnych sześciu o 3 ct. więcej.

Uwaga: Jeżeli zwrócono aptecze próżne pudełko, jakoteż czystą flaszeczkę lub słoik, należy się pół ceny odliczyć.

Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich.

Na kąpiel pełną (po szyję) dla osoby dorosłej, liczy się 200—300 litrów płynu. 50 200 litrów na kąpiel dla dzieci. Na kąpiel sięgającą tylko do dołka podsercowego 100—150 litrów: kąpiel nasiadową 20—30 litrów, na kąpiel na nogi 10 litrów.

Za zimną uważa się kąpiel do + 15° R.			
"	chłodną	"	+ 15 do 22° R.
"	letnią	"	+ 22 " 27° R.
"	cieplą	"	+ 27 " 32° R.
"	gorącą	"	+ 32° R.

Kąpiele gorczyczne. Na kąpiel pełną daje się 100—250·0 grubo potłuczonej gorczycy. Do kąpeli miejscowej np. na nogi 50—120·00.

K. igliwowe. Ponieważ przez wygotowanie igliwia nie można otrzymać eterycznych, a właśnie głównie działających pierwiastków, stósownej przeto dawać ekstraktu. (Extr., turionum pini sylv. ad balnea, Nitribitta w Krynicy) 150—500 gram.

K. jodowe. (Wanna drewniana). Kali jodati 50—100·0 na kąpiel pełną; 5·0—10·0 na litr wody. — Jodi 10·0 kali jodati 20·0 rozpuścić w kilogr. wody i dodać do kąpeli, przyczem należy tak osłonić wannę, aby pacjent nie wdychał parującego jodu.

K. klejowe. 1—2 funtów Colla animalis, rozpuszczonego we wrzącej wodzie.

K. z kory dębowej lub z kory wierzby, kasztana itp. ddwar z 1 funta w 2 litrach wody, lub też (ponieważ tutaj chodzi o środek ściągający), można użyć Taniny (acid. tannicum) 20—100 grm. rozpuszczonej w szklance wody.

K. z kiści orzecha włoskiego. (Fol. Juglandis) Dekokt z 1—2 fnt.

K. ługowe. Dwa do ośmiu funtów popiołu bukowego lub dębowego, gotuje się z kilkoma litrami wody, lub też potażu ($\frac{1}{4}$ — funta, na kąpiel pełną, dla dzieci połowę tej ilości).

K. mrówczane. Napar (Infusum) z 300·0—700·0 formica rufa.

K. mydlane. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ funta pokrajanego mydła na pełną kąpiel! (Sapo domesticus, Sapo aromatic. lub Sapo kalinns).

K. z otrąb. 1—3 funtów otrąb pszenicznych odgotowanych w woreczku w 2—6 litrach wody.

K. siarczane. 50·0—200·0 Kalium snlphuraturn ad balneum, w celu wzmocnienia działania dodaje się 15—20·0 Acidum sulphur. crud.; aby jednak złagodzić, dodać można Colla animalis $\frac{1}{2}$ funta.

Bogatszym można zapisać:

Rp. Calcii snlphurati crudi 20·00,

Natri chlorati 7·50,

Extr. Saponar. 5·00.

F. c. Aq. font q. s. Globulus Dtur. tal. dos. 5.

S. Jedną kulę do kąpeli.

(Wanna drewniana, nie metalowa).

K. słodowe. Słodu jęczmiennego 4—6 funtów gotuje się z kilka litrami wody przez $\frac{1}{2}$ godzinę, odcedza i wlewa do kąpieli.

K. słone. 3—5—15 funtów soli kuchennej lub morskiej.

K. sodowe. Natri carbon. crud. 200—500·0 na kąpiel pełną. 100—200·0 na kąpiel miejscową.

K. sublimatowe. (Tylko w wannie drewnianej) 2·50—10·0 Hydrarg. bichlor. corros. rozpuszczonego w 50—200·0 Aq. Na kąpiel miejscową tj. ręce i nogi 0·05—0·25.

K. ziołowo-aromatyczne. Napar rumianku lub mięty, korzenia tataraku, lub spec. aromatic. z 200—500·0 na 2000·0 wody wlewa się do kąpieli, albo też dodać można: Aq. coloniens., Spir. Calami., Spir. Angelicae, Spir. Serpyll. (60·0—100·0 na dawkę). Dla dzieci połowę tych ilości.

K. żelaziste. Ferrum sulphur. siccum (50·0—200·0), Liquor ferri sesquichlorati (15·0—60·0), Tart. feratus s. globuli martiales pulv. (50—200·0), lub też do przyrządzenia kąpieli żelazistej z kwasem węglowym; 1 część Ferr. sulph. sicc. (30·0), 2 części Natr. chloratum (60·0), i 3 części (90·0) Natr. bicarbon. nasypuje się warszami do szklanki i razem wrzuca do wody (pro balneo 150·0—200·0 tej mieszaniny).

Rp. Ferri sulphur. sicci

Argillae aa. 100·00,

Mf. pulv. d. tal. dos. 10.

S. Jeden proszek do kąpieli.

Dla dzieci wszystkich przetworów po $\frac{1}{2}$ części.

Szkodliwe połączenia leków.

1. Dając kwas solny wewnątrz, nie należy przepisywać kalomelu, bo w żołądku utworzy się sublimat.

2. Nie należy kłaść plastru merkurialnego na miejscu po smarowaniu jodem, bo wytwarza się Hydr. bijodat, rubrum, wywołując ból i papalenie.

Nie dawać do wewnątrz jodu ani bromu gdy się oko posypuje kalomelem (najwcześniej można zasypać oko kalomelem w 24 godzin po ostatniej dawce jodu).

4. Nie łączyć kali chloricum z garbnikiem, kamforą, siarką, węglem w proszkach, bo nieostrożne potarcie wywołuje eksplozyę.

5. Nie łączyć kwasów z zasadami, bo tworzą się sole.

6. Nie łączyć opium z garbnikiem, bo tworzą się garbnikany nierozpuszczalne.

7. Nie łączyć Arg. nitr. z Aq. amygd. amar., bo wytworzy się sinek srebra.



BADANIE MOCZU.

Badając mocz zwracamy uwagę na następujące szczegóły:

I. Przeźroczystość.

Prawidłowy mocz jest przeźroczystym. Jeżeli mocz jest mętnym, to bada się *oddziaływanie*. Przy oddziaływaniu **kwaśnem** zmętnienie pochodzi najczęściej od *kwaśnych moczanów*: osad barwy pomarańczowej (*sedimentum lateritium*). Wykazać to można przez lekkie ogrzanie (nie zagotowanie), mocz się powinien wyjaśnić. Mocznany kwaśne znajdują się w każdym moczu, pozostają jednak z reguły w roztworze. Do wydzielenia ich może się przyczynić znaczne oziębienie moczu, zagęszczenie tegoż, znaczna ilość soli moczanowych lub silnie kwaśne oddziaływanie. Najczęściej spotykamy się z osadem moczanowym przy gorączce i przy zastoiu w układzie żylnym.

Jeżeli zmętnienie po ogrzaniu nie ustępuje, to przy oddziaływaniu kwaśnem może ono zależeć tylko od *uksztaltowanych składników*. Należy wykonać badanie drobnowidowe. Osad otrzymuje się przez odsączenie, centryfugowanie, lub odstawienie w kończystym kieliszku i zebranie pipetą. W osadzie można znaleźć rozmaite bakterie (przyczem mocz może być początkowo kwaśny), ciała ropne, czerwone, rozmaite przybłonki, wałeczki, nitki nasienne i komórki nowotworów. Największe znaczenie mają *wałeczki*: świadczą one o chorobie nerkowej w ogóle, gdyż w moczu prawidłowym ich nie znajdujemy, lub chyba bardzo wyjątkowo i tylko odosobnione. Z rozmaitych ich postaci można wnioskować o rozmaitych sprawach w nerkach, nie można jednak rozpoznać wprost samej choroby. Wałeczki krwawe i wałeczki obłożone ciałkami krwi świadczą o krwotokach nerkowych; przybłonkowe o złuszczeniu się przybłonek; wałeczki z ciałkami białymi o sprawach wypocinowych; z kulkami tłuszczu i komórkami stłuszczonej i o sprawie zwyrodnienia tłuszczowego w nerce.

W jednostajnie mętnym, wolnym od białka moczu o oddziaływaniu obojętnem, lub słabo kwaśnem, zależy zmętnienie, które przy ogrzaniu się nie wyjaśnia, a także przy sączeniu nie wiele, lub wcale nie, prawie bez wyjątku od rozmaitego rodzaju bakteryj.

Niekiedy spotykamy przy znacznej kwasocie piaskowaty, mniej, lub więcej zabarwiony osad, który jest prawie zawsze krystalicznym kwasem moczowym. Od tego odróżnić trzeba wydalanie „żwiru moczowego“ w okrągłych ziarnkach złożonych także z kwasu moczowego, z czem się spotykamy przy kamicy.

Jeżeli mocz oddziaływa **alkalicznie**, to o przyrodzie osadu rozstrzyga badanie mikroskopowe. Oprócz wymienionych już składników możemy stwierdzić obecność szczawianu wapniowego w 8-sciennych kryształkach, fosforanu wapniowego bezpostaciowego w nieregularnych płytkach z ziarnistą powierzchnią, fosforanu magnowo-amonowego w krzysztalkach trumienkowatych i moczanu amonowego o postaci koleczugowatej.

II. Barwa.

Prawidłowa barwa jest żółtą, mniej lub więcej wysyconą.

1. Wzmoczenie prawidłowego zabarwienia do barwy pomarańczowej okazuje mocz przy małej ilości, a następnie przy większej zawartości urobiliny, co się zdarza przy gorączce, zastoju w układzie żylnym, w początku i w końcu żółtaczki t. j. przed pojawieniem się i po zniknięciu barwika żółci, wreszcie po znacznych wewnętrznych krwotokach z powodu przemiany barwika krwi na barwik żółci.

2. Barwa czerwona pochodzi najczęściej od przymieszki krwi. Potwierdzenie daje badanie drobnowidowe osadu. Ciałka czerwone są często pokurczone, morwowe, innym razem znów obrzękłe. Z reguły zawiera mocz równocześnie rozpuszczony karwik krwi, hemoglobinę, często nieco zmieniony (methemoglobina). Badanie widmowe w przypadkach wątpliwych nie zawsze daje wyniki pewne. Najprostszą jest *próba Hellera*. Dodaje się do moczu parę kropli ługu sodowego, ogrzewa do zagotowania i odstawia na parę minut. Powstaje w każdym wypadku kłaczkowaty osad fosforanów ziemnych; przy obecności barwika krwi zawiera ten osad hematynę i ma barwę czerwonawą, a na brzegach odcień zielonawy. Mocz oddany po użyciu rzewienia, senesu i santoniny daje podobne oddziaływanie, jednak, jeżeli się osad wymyje i rozpuści w kwasie octowym, to roztwór ma barwę cytrynowo żółtą, a następnie przybiera na powietrzu barwę fioletową.

Mocz po użyciu sulfonalu jest niekiedy zabarwiony czerwono skutkiem zawartości hematoporfiryny. Łatwo ją można poznać po 2 smugach absorbcyjnych, jeżeli się mocz zakwasi kwasem solnym i bada widmowo.

3. Barwa brunatna z żółtą pianą pochodzi prawie bez wyjątku od barwika żółci. Do udowodnienia tegoż służy *próba Gmelina*. Kieliszek wypełnia się blisko do połowy moczem, nachyla się go o 45° i wlewa po ścianie parę cm.³ kwasu azotowego zmieszanego z kilkoma kroplami kw. azot. dymiącego. W miejscu zetknięcia powstają barwne pierścienie: zielony, niebieski, fioletowy i czerwony. Mocze zawierające dużo indykanu dają podobne oddziaływanie; przytem w wątpliwych wypadkach próba Gmelina czasem zawodzi, niema więc ona dla rozpoznania większego znaczenia. Więcej zaleca się *próba chloroformowa*. Mocz zakwasza się kwasem octowym i kłóci z chloroformem. Jeżeli osiadający na dnie chloroform jest żółty, lub żółto zielonawy, to mocz zawiera barwik żółci.

4. Barwę oliwkową do czarnej okazuje moczu po użyciu karbolu i środków pokrewnych. „Mocz karbolowy“ jest znakiem, że środki te powinny być odstawione.

5. Zielonawo-żółta barwa zdarza się po użyciu rzewienia i santoniny. W obu przypadkach barwi się mocz po dodaniu ługu sodowego fioletowo-czerwono. W pierwszym przypadku także po dodaniu węglanu sodowego, w drugim nie, lub dopiero powoli.

6. Ciemne zabarwienie przy staniu na powietrzu może pochodzić od melaniny, względnie melanogenu (przy guzach melanotycznych). Z reguły jest wtedy mocz już przy oddaniu nieco ciemno zabarwiony, a ciemnieje jeszcze więcej przy lekkim ogrzaniu z kwasem azotowym, roztworem kw. chromowego, lub chlorku żelazowego.

7. Barwa niebieska od błękitu indyktu zdarza się, zresztą b. rzadko, przy barwikowych rakach żołądka i wątroby. Chloroform kłócony z takim moczem barwi się niebiesko.

III. Ilość moczu i ciężar gatunkowy

stoją do siebie w odwrotnym stosunku. Przy ilości 1500 na dobę, wynosi c. g. 1'017—1'020. Nawet c. g. 1'030 może, mianowicie w lecie, być prawidłowym, jeżeli ilość moczu jest odpowiednio zmniejszona.

Mała ilość przy wysokim c. g. i ciemnem zabarwieniu wskazuje na gorączkę, utratę wody innemi drogami, lub obniżenie parcia w układzie tętnicznym, jakie widzujemy przy chorobach serca i płuc.

Wysoki c. g. przy bladej barwie i prawidłowej, lub zwiększonej ilości wskazuje na moczówkę cukrową.

Bardzo niski c. g. prawie zawsze jest związany z wielką ilością moczu, jak to widzimy przy moczówce prostej, marskości nerek; zwykle jednak nie ma to większego znaczenia (blednica, histerya).

IV. Oddziaływanie.

Oddziaływanie powinno być kwaśne, jednak mocz oddany po obiedzie oddziaływa b. często alkalicznie. Jeżeli całodzienny mocz jest alkaliczny, to trzeba przedewszystkiem stwierdzić, czy zależy to od stałych zasad, czy od węglanu amonowego. Odróżnienie jest łatwe. Jeżeli papierek lakmusowy trzymany, lub zawieszony nad moczem przyjmuje barwę niebieską, chodzi o węglan amonu, w przeciwnym razie o *stałe zasady*. W tym ostatnim wypadku niema to większego znaczenia i zależy od roślinnego pożywienia, albo od lekarstw (saturacye, sole kwasów roślinnych, węglany alkaliów). Alkaliczne oddziaływanie może być także wynikiem często powtarzających się wymiotów z powodu utraty kwasu solnego, wreszcie może zależeć od wessania alkalicznych przesieków.

Obecność *węglanu amonowego* jest ważna, świadczy bowiem o amoniakalnem kiśnieniu moczu, przyczem moczownik przecho-

dzi w węglan amonowy. Mocz posiada wtedy i inne cechy: 1) charakterystyczny zapach moczu rozłożonego nie zależący od węglanu amonowego i co do swej istoty jeszcze nie zbadany; 2) jest zupełnie mętny z powodu ogromnej ilości bakteryj, co można stwierdzić badaniem drobnowidowem; 3) zawiera osad nieorganiczny pływający częściowo na powierzchni, częściowo rozdzielony w moczu, lub trzymający się ścian i dna naczynia, a złożony z fosforanu wapniowego, fosforanu magnezowo-amonowego i moczanu amonowego. Sole te mogą się znaleźć także w moczu prawidłowym po użyciu soli kwasów roślinnych, jednak taki mocz jest przezroczysty i nie zawiera węglanu amonowego.

Każdy mocz, nawet pierwotnie kwaśny, prędzej lub później przechodzi na powietrzu kiśnienie amoniakalne. Czynniki przyspieszającymi są: wysoka ciepłota otaczająca i obecność krwi, ropy lub białka. Jest więc rzeczą bardzo ważną stwierdzić, czy mocz już w chwili oddania jest amoniakalnym. Taki mocz zdarza się mianowicie przy niezżytach pęcherza moczowego, szczególnie na tle porażeń pęcherza, gdy pęcherz nie opróżnia się całkowicie, resztki rozłożonego moczu zalegają i zakażają ustawicznie mocz zdrowy przyływający z moczowodów.

V. Białko.

Białka w moczu prawidłowym nie znajdujemy, chyba tylko bardzo wyjątkowo i w bardzo małej ilości, co najwyżej 0.05%, jako t. z. *białkomocz fizjologiczny* (po ciężkiem znudzeniu, po ucztach, zimnych kąpielach, wzruszeniach umysłowych) i u dzieci jako białkomocz okresowy (mocz z nocy białka nie zawiera, dopiero po wstaniu z łóżka pojawia się ono codziennie).

Zresztą obecność białka jest zawsze objawem chorobowym i może zależeć a) od przymieszki krwi, lub ropy z nerek, lub dróg moczowych (wejrzenie moczu, badanie mikroskopowe), b) od obecności hemoglobiny (wejrzenie, próba Hellera), albo też c) jest to prawdziwy białkomocz nerkowy t. j. białko przechodzi do moczu już w kłębuszkach skutkiem zmian w przybliżeniu tychże. Mogą to być zmiany lekkie, a białkomocz trwa wtedy z reguły krótko (gorączka, lekkie zatrucie, napad padaczkowy i inne stany nerwowe, moczysko ołowiowe, zastój w układzie żylnym), albo też chodzi o ciężkie zmiany, jakie spotykamy przy zapaleniach nerek.

1. Próba Hellera z kw. azotowym. Kieliszek napełnia się blisko do połowy moczem, nachyla o 45° i nalewa po ścianie kwasu azotowego zgęszczonego. Granica obu płynów powinna być ostra. Jeżeli jest białko, to występuje na niej mniej, lub więcej zbity, jednostajna, ściśle odgraniczona, biała smuga. Niekiedy pojawia się ona dopiero po odstaniu (ilość białka wynosi wtedy 0.003%). Łatwiej ją dostrzedz na czarnem tle. Po używaniu terpentyny i balsamu kopaivowego, lub tolutaińskiego (pigułki i kapsułki kreozotowe) występuje tensam odczyn, jednak zmętnienie po zmąceniu z kwasem azotowym można

usunąć przez klócenie z wysokiem. W moczach wysyconych pojawia się często smuga obłoczkowata położona znacznie wyżej nad granicą płynów (kwaśne moczały), ustępuje ona przy słabem ogrzaniu, lub nie pojawia się po rozcieńczeniu moczu.

2. Próba z zagotowaniem jest mniej czułą. Mocz powinien być zupełnie przeźroczysty. Jeżeli samo przesaczenie nie wystarczy do usunięcia zmetnienia, dodaje się na koniec noża magnezyi palonej, lub kilka kropli roztworu siarkanu magnezowego, a potem kilka kropli roztworu węglanu sodowego, klóci silnie, a potem sączy. Czysty mocz ogrzewa się teraz w próbówce aż do zawrzenia i dodaje kilka kropli kwasu octowego. Zmetnienie dowodzi obecności białka. Dodatek kwasu octowego jest konieczny, bo nawet z moczu kwaśnego może się przy zagotowaniu stracić fosforan wapniowy, który się jednak w kwasie octowym rozpuszcza.

3. Próba z żelasinkiem potasowym. Mocz zakwasza się kw. octowym i dodaje kroplami 10% roztworu żelasinku potasowego. Powstaje biały osad, lub zmetnienie. Próba b. czuła, pewna i dogodna.

4. Próba sublimatowa. Mocz zakwasza się kw. octowym i dodaje w równej objętości następującego roztworu (Jolles). Sublimatu 10,0 kw. bursztynowego 20,0, chlorku sodowego 10,0, wody przekropl. 500,0. Powstaje biały osad, lub opalescencya. Próba pewna i b. czuła, wykazać można jeszcze 0.001% białka.

Jeżeli badanie wykazało tylko ślady białka, to trzeba jeszcze zrobić próbę *na mucynę* (nukleoalbuminę) przez silne zakwaszenie moczu na zimno kw. octowym. Zmetnienie świadczy o obecności mucyny i pozwala wnioskować, że oddziaływanie na białko pochodzi od mucyny.

VI. Chlorki.

Mocz zakwasza się kw. azotowym i wpuszcza kroplę azotanu srebrowego (1:8). Powinna powstać zbita grudka chlorku srebrowego szybko opadająca na dno. W stosunkach chorobowych, szczególnie przy zapaleniu płuc, chlorki mogą być zmniejszone: powstaje osad wiotki, kaszkowaty, lub tylko mniej, lub więcej znaczne zmetnienie. Mała ilość chlorków zależy od małej ilości przyjmowanych pokarmów, lub od rzeczywistego zatrzymywania chlorków w ustroju. Obfite pojawienie się następowe chlorków w moczu jest dobrym znakiem.

VII. Cukier.

Jeżeli w moczu jest cukier, to chodzi albo tylko o przejściowy *cukromocz* (po przyjęciu obfitych pokarmów skrobiowych i cukrowych, po pewnych zatruciach np. tlenkiem węgla, morfiną, przy pewnych chorobach gorączkowych np. węgliku, cholerze, przy chorobach układu nerwowego, mianowicie przy zmianach w okolicy rdzenia przedłużonego, przy chorobach trzustki), albowież chodzi o *cukrzycę*.

1. Próba Trommera. Do moczu dodaje się $\frac{1}{3}$ objętości łągu sodowego, następnie kroplami wśród silnego klócenia rozczynu siarkanu miedziowego (1:10) dotąd, aż część niebieskawego stratu nawet przy silnem wstrząsaniu już się nie rozpuszcza. Jeżeli mocz zawiera dużo cukru, powstaje płyn ciemno niebieski. Ogrzewa się teraz do zawrzenia. Jeżeli mocz zawiera cukier, to występują szybko nieprzeźroczyste, żółte, pomarańczowe i czerwone smugi wodnika, względnie tlenku miedziawego. Tylko wtedy jest odczyn pewny. Trzeba jednak pamiętać, że przy używaniu pewnych lekarstw, jak chroralu, kw. salicylowego, kw. będzwinowego mocz daje tensam odczyn. Proste żółknięcie cięczy, gdy ona pozostaje przeźroczystą, nie dowodzi cukru; także gdy odczyn powstaje dopiero przy dłuższem gotowaniu, albo później po oziębieniu. Jeżeli próba była wątpliwą, to dobrze jest powtórzyć ją z moczem rozcieńczonym 5-krotnie.

2. Próba Böttgera (nie zbyt czuła). Do moczu dodaje się tyle węglanu sodowego, ile się go rozpuszcza przy ogrzaniu, następnie b. małą ilość azotanu bizmutowego zasadowego i gotuje przez kilka minut. Zabarwienie czarne, względnie szare, świadczy o obecności cukru, jednak tylko w moczu bezwzględnie wolnym od białka.

3. Próba fermentacyjna jest najpewniejszą. Mocz się gotuje, studzi, dodaje dobrych drożdży i wlewa do odpowiednich rurek: Z ilości wytworzonego CO_2 można nawet w przybliżeniu oznaczyć ilość cukru.

VIII. I n d y k a n.

Próba Jaffego. Do moczu dodaje się równą objętość kw. solnego, a następnie kroplami wśród wstrząsania rozczyunu podchlorynu wapniowego (5:100, przesaczyć, rozczyn musi być często zmieniany). Jeżeli mocz przybierze barwę zieloną, potem niebieską, to zawiera wiele indykanu; niekiedy może się nawet błękit indychtu w postaci kłaczków na dnie naczynia osadzić. Wielka ilość indykanu zdarza się przy niedrożności jelit, zapaleniu otrzewny, wreszcie przy chorobach wyniszczających. Barwa moczu nie jest zmienioną, bo indykan jest bezbarwnym.

Mocz prawidłowy przybiera przy tej próbie często barwę fioletową, albo nawet czerwoną. Pochodzi to od czerwieni indychtu, która przechodzi do eteru, jeżeli się mieszaninę przedtem zalkalizuje. W stosunkach chorobowych jest niekiedy to zabarwienie czerwone bardzo wybitnem, choć przyczyny tego są nieznane.

Lz.





Ostre otrucia

z oznaczeniem przybliżonej dawki zabójczej, objawów
i sposobów leczenia.

Zestawił Dr Fr. Simon.

Aconitinum. Najsilniejszy alkaloid lecz niestwały. W rozczy-
nach łatwo rozkłada się. **Dos. letal.** = 0.003. — Objawy zob.
Tojad.

Acid. arsenicosum — $As_2 O_3$ — połączenia: **Zieleń
Scheleego** (octan As.) i **Z. szweinfurtska** (octan
As. i miedzi). Także w barwikach anilinowych jako zanie-
czyszczenie chemiczne. — **Dos. letal.** = około 0.10 gr. **Dos.**
toxica = mniej więcej 0.01 gr. — Otrucie ostre objawia się
po $\frac{1}{2}$ —1 godziny w rozmaitej postaci: I. postać (na czczy
żołądek) Arsenicismus gastrointestinalis podobny do cholery
azyatyckiej lub zatrucia grzybami. Nudności, wymioty (cor-
pus delicti), bóleści w żołądku i brzuchu, biegunka gwał-
towna, stolce krwawe obrzydliwie cuchnące, później wo-
dniste albo odrazu ryżowe. Rysy zaostrome. Pragnienie.
Tętno szybkie, drobne, czasem sinica, zapad. Już po 12 go-
dzinach śmierć albo pozorną poprawą, potem dreszcz, osutka
płonicza, stranguria (w moczu arsen) zapad i śmierć 4.—8.
dnia. II. postać (na pełny żołądek) Ars. cerebrosppinalis:
zawroty i ból głowy, ból w kończynach, niedowład, pareste-
zye, nagły zapad bez objawów jelitowych, sinica, coma,
czasem drgawki i szybko śmierć (6—8 godzin). Rokowanie
gorsze niż w I.-szym. — III. Postać mieszana. Często. IV. Na
skórę i bł. śluz. pochwy stosowany (pasta) tworzy w miejscu
bolesne owrzodzenia a stąd zresorbowany daje objawy po-
wyższe. — **Leczenie:** Jeżeli wymioty słabe $\frac{1}{2}$ —1 Pravaza
Apomorphini 1% lub pulv. Ipecac. 1.00 naraz a nigdy Tart.
stib! Przepłukać żołądek dokładnie! (Nie podawać kwasów).
Potem dopiero Antidotum Arsenici albi: Rp. Magn. hydro-
oxyd. recenter parati in Aqua. Dtur. 200, gr. DS. zażyć $\frac{1}{3}$
część naraz a resztę co 10 minut łyżkę. — Później ol. ricini
i diuretica. Leczenie symptomatyczne. — Śmiertelność w ogóle
mniejsza niż 50%.

Acid. carbolic. $C_6 H_5 OH$. U chirurgów zdarzały się zatrucia
chron. — dziś rzadko, — **Dos. tox.** = 1—10 gr. — **Dos. letal.** =
10 gr. Zatrucia podostre wskutek okładów i opatrunków
karbolowych dłuższy czas stosowanych objawiają się odu-
rzeniem, nudnościami, wymiotami. Skóra chłodna, lepki pot.
Mocz okazuje zabarwienie zielonawe, które na powietrzu
brunatnieje. Reakcya chlorkiem baru okazuje zmniejszenie
siarkanów. **Leczenie:** usunąć przyczynę. — Zatrucie ostre po
wypiciu silnego rozczyntu lub zgęszczonego karbolu. **Objawy:**

piekący ból w ustach, gardle, przełyku i żołądka: zbielenie błony śluz, wymiociny białe, śluzowe, zdradzają zapach karbolu. Zawroty głowy, szum w uszach, bladeść twarzy, zwięzienie źrenic, utrata przytomności, oddech nieregularny, osłabienie tętna, zapad, śpiączka. *Leczenie*: Emetica. Przeplukanie żołądka wodą wapienną. Wewnętrznie: Calcaria saccharata w roztworze zgęszczonym (Huseman). Sól glauberska, (do iniekcji podskórnych), mleko, kleiki, excitantia, sztuczne oddechanie.

Acid. hydrochloric. — HCl . — **Dos. letal.** = 10 — 20 gr.

Objawy zależne od ilości i zgęszczenia. Skóry nie nadżera, tylko dermatitis. Na błonie śluz. tworzy czasem nekrotyczne strupy mogące imitować błony dyfterytyczne. Stomatitis. Silne palenie gardła i przełyku, gastroenteritis. Wymiociny żółte, brunatne zwykle z krwią, silnie kwaśne. Zawroty głowy, drgawki, zapad. Śmierć w ciągu doby lub nephritis. *Leczenie*: Zimne mleko, dużo płynów, woda białkowa lub mydlana. Magnezja usta in aqua, a z konieczności kreda lub soda ostrożnie w małych ilościach. Pompa żołąd. tam, gdzie nie ma obawy perforacji. Później przeciw bólom narkotyk. Środki osłaniające jak kleiki, guma. Lód. W razie zapadu excitantia.

Acid. hydrocyanicum (kwas pruski CNH), **Sinek potasu, Aq. laurocerasi** (= 0.1% CNH), gorzkie migdały.

Czasem w likierach. **Dos. letal.** = 0,06 gr. = 1 kropla. Cyankali = 0,25 jeżeli niezanieczyszczony potażem. 50—60 migdałów g. Połączenia podwójne z żelazem trują jeżeli się rozłożą w żołądku. *Objawy*: Dawka zabójcza po 2—5 minutach powala o ziemię, krzyk, ból głowy, utrata świadomości. Kurcz oddechowy, wydech ciężki, przedłużony. Gałki oczne wytrzeszczone, lśniące. Czasem brak drgawek. Źrenice szerokie. Śmierć w kilku minutach z porażenia oddechania. Plamy pośmiertne i krew jasno czerwone. Gdy dawka nie wystarczająca objawy szybko ustępują. Sinek potasu działa nadto żrąco na bł. śluz. żołądka. *Leczenie*: Pobudzić do wymiotów, w początkach sonda żołądkowa. Sztuczne oddechanie. Excitantia podskórnie. Zlewania zimne w ciepłej kąpieli. Venesectio z transfuzją krwi.

Acid. nitricum. HNO_3 . — **Dos. letal.** = 8 — 15 gr. — Działa żrąco analogicznie jak HCl , lecz silniej. Pary drażnią silnie przewód oddechowy. Palący ból w ustach, gardle i t. d. Kaszel. Uczucie trwogi. Wymioty treścią brunatną, (od krwi) a w nich żółte strzępy. Zapach właściwy. Znekrotyzowana bł. śluz. warg, jamy ust etc. tworzy charakterystyczne cytrynowo żółte lub brunatne strupy. Brzuch wzdęty, bolesny. Stolec zwykle zaparty. Anuria. Dyspnoe. Tętno drobne, zapad. Czasem oedema glottidis, które grozi uduszeniem. Śmierć przeważnie już w I. lub II. dobie. *Leczenie* ma na celu przede wszystkim szybko rozcieńczyć kwas i zneutralizować. Zobacz wyżej Acid. hydrochl. — W razie obrzęku głośni tracheotomia.

Acid. oxalicum. Kw. szczawiowy. $C_2H_2O_2$ — **Dos. letal.** = 4·0 — 40·0. Objawy: smak bardzo kwaśny z następowem paleniem. W gardle uczucie dławienia. Piekący ból w żołądku, wymioty. Ogromne osłabienie, omdlenie, śpiączka. Bładość lub sinica powłok. Ciepłota ciała obniża się, oddechy płytkie. Mrowienie kończyn, bóle ciągnące w łędźwiach, drgawki, biegunka krwawa. Mocz u skąpo, w nim kryształki szczawianu wapn. cukier i białko. Czasem anuria. Śmierć w kilka godzin lub dni z porażenia serca, uraemii. *Leczenie:* przede wszystkim przetwory wapienne, Aqua Calcis co 10 minut szklanke kilka razy. Kreda, Calcaria saccharata, Magnesia usta. Symptomatycznie lodowe pigułki, narkotyki, gorzyczniki. Przeciw anuryi diuretica i diaphoretica. — Excipientia.

Acid. piconitricum. Dawki powyżej 2 gr. mogą spowodować śmierć. Smak gorzki. Rozkłada ciała krwi. Gastroenteritis. Wymiociny żółte. Zabarwienie żółte skóry i spojówek. Mocz żółty lub czerwony. Zajęcie sensorium. Kurcze. Nephritis. — *Leczenie:* Przepłukanie żołądka, ol. ricini, sól glauberska. Mocna kawa. W cięższych przypadkach hypodermoklizy, infuzye soli kuchennej, transfuzya krwi.

Acid. sulfuricum. H_2SO_4 . — **Dos. letal.** = na próżny żołądek 4 gr. zgęszczonego kwasu. — Silnie nadżera odcinając chciwie wodę. Wargi i usta sparzone, często i skóra rąk. Wymioty treścią czekoladową lub czarną (od krwi), bezwoną, silnie kwaśną. Z okropnego bólu drgawki i omdlenie. Kaszel, oddechy powierzchowne, tętno drobne, ciepłota ciała obniżona. Coma. Nierzadko perforacya żołądka, peritonitis, i szybka śmierć. — *Leczenie* jak przy Acid. nitric. — Nie używać pompy żołądkowej! — Tracheotomia.

Aether sulfur. — Wypity w większej ilości może spowodować uduszenie z wzdęcia, pęknięcie żołądka lub przepony. Używany długi czas jako napój sprowadza zatrucie chroniczne podobne jak w alkoholizmie. Wdechowany działa na środki kory mózgowej i rdzenia przedłużonego powolniej i łagodniej niż chloform (porównaj), podniecenie dłuższe, narkoza słabsza. Ślinotok. — Początkowo zaczerwienienie twarzy, tętno silniejsze i szybsze — oziębnienie ciała większe niż po chloroformie. Odruch rogówkowy zwykle się utrzymuje. — Groźnym objawem jest ustawianie oddechu. Śmierć następuje z porażenia oddechania a następnie serca. Nagłe porażenie serca (syncope) rzadsze niż po chloroformie, (częstsze natomiast następowe pneumonie). — *Leczenie:* Sztuczne oddechanie na wolnem powietrzu ułożwszy chorego skośnie z obniżoną głową, zbryzganie piersi zimną wodą, faradyzowanie nerwów przeponowych a skoro nastaną oddechy amoniak do wachania. Iniekcya strychniny (0,002). — Tracheotomia, wdmuchiwanie kateterem tlenu.

Amanita zob. Grzyby trujące.

Alkalia. Ług potasowy, sodowy i węglany tychże. Mydło potasowe i salmiak. — **Dos. letal.** zgęszcz. roztworu $NaOH$.

i KOH powyżej 5 gr. — a potażu K_2CO_3 = mniej więcej 15 gr. — Działanie żrące szybkie i głębokie, nadto potas osłabia akcję serca. Smak obrzydliwy, ługowaty, okropnie palący skłania odruchowo do wyplucia. Bł. śluz. ust zniszczona. Jeżeli połknięty palenie w przełyku i żołądku, dławienie. Wymioty gwałtowne maziastą szarą treścią lub brunatną, alkaliczną. Wielkie pragnienie, trudność połykania. Przytomność często utrzymuje się. Wzdęcie brzucha, kolka, czasem biegunka i drgawki niestale. Zapad. Mocz alkaliczny zawiera kryształki fosforanu magn. amonowego. Śmierć w pierwszych 3 dniach lub po tygodniach wskutek następstw (strictura cardiae et pylori). — *Leczenie*: Nie sondować lecz neutralizować kwasami! Ocet, kwas cytrynowy rozcieńczony. Dużo płynów, mleko, kleiki. Pigułki lodowe. Opium lub injectio Morphii. Przeciwi zapadowi excitantia, lewatywa z wina. Odżywcze lewatywy. — Gdy obrzęk głośni tracheotomia. — Później leczenie chirurgiczne.

Ammonia pura liquida. — Podobnie jak inne Alkalia (zobacz), nadto dyspnoe, oedema glottidis, salivatio. Gaz NH_3 silnie drażni spojówki i przewód oddechowy, pobudza do kaszlu. Bronchitis acuta lub pseudocrouposa, oedema pulmonum. (Mocznik zwiększony). — Zapad i śmierć szybko, czasem po kilku minutach lub godzinach; w następnym dniu rokowanie dość dobre. — **Dos. letal.** = 4·0—40·0 Śmiertelność = mniej więcej 50%. — *Leczenie* zobacz Alkalia.

Alkohol. — **Dos. letal.** trudna do oznaczenia mniej więcej 150—300 gr. czystego alkoholu. U dzieci = 60—100 gr. Objawy ostrego zatrucia: palenie w ustach i żołądku, krótki okres podniecenia, zaczerwienienie twarzy, błyszczące oczy, nastrzykanie spojówek, źrenice zwężone, tętno przyspieszone, woń wysokoku z ust. — Depressya, utrata przytomności, bezwładność, oddech powolny, ciężki, chareczący. Tętno zwolnione, małe. Znaczna błądź, skóra zimnym lepkiem potem pokryta, źrenice rozszerzone, zniesienie odruchów, oddawanie bezwiedne kału, drgawki toniczne i kloniczne, trismus. Śmierć po 1 lub kilku godzinach albo po długim śnie wyzdrowienie. — *Leczenie*: Przepłukanie żołądka. U krwistych i tęgiech zapobiedz udarowi przez upust krwi, wzniesienie głowy i zimne okłady na głowę a gorące na kończyny, gorczyznik na łydki i kark, lewatywy z octu (1:4). W razie zapadu injectio ol. camphor. a jeżeli połykać może 10 kropel Liq. Ammonii caustic. lub anisati na $\frac{1}{4}$ szklanki herbaty, czarna kawa. W razie potrzeby sztuczne oddechanie, wyciągnięcie języka, faradyzacja n. phrenici. — Alcoholismus chronicus zob. podręcznik terapeut.

Allantiasis zobacz Ptomainy.

Amylium nitrosum — $C_5H_{11}O.NO$. — **Dos. let.** dla człowieka nieznana. — Zmiany we krwi (Methemgl.). — Poraża centra wasomotoryczne. Działa szybciej niż Nitroglyc. Nagłe rozszerzenie naczyń, uczucie tętnienia karotydu i gorąca twarzy, zawroty i ból głowy, lęk, bicie serca, rozszerzenie źre-

nie, omdlenie. Wymiociny mają zapach jabłek. — *Leczenie* patrz nitrobenzol. Nadto polecano iniekcye Ergotini.

Anilinum (amidobenzol) $C_6H_5NH_2$. — **Dos. letal.** dotychczas niestwierdzona mniej więcej **powyżej 10 gr.** — W większej ilości połknięta lub w postaci pary wdychnięta (w fabrykach) powoduje ból głowy i zawroty, osłabienie, chód zataczający nudności, omdlenie. Zmiany we krwi (Methemgl. etc.). Znaczna sinica skóry, dyspnoe. Wydech o zapachu aniliny. Tętno przyspieszone, drobne, potem zwolnione, zapad. Drgawki rzadko. Mocz brunatno czerwony. W cięższych zatruciach śmierć. Niektóre farby anilinowe (fuksyna) bywają zanieczyszczone arsenem są więc niebezpieczniejsze. *Leczenie:* zobacz Nitrobenzol, nadto sól glauberska, wdychania tlenu lub przynajmniej czystego powietrza.

Antymonu połączenia. Tartarus stibiatus. Dos. let. trudno oznaczyć z powodu wymiotów i indywidualizmu. U dzieci już czasem 0.10 działa zabójczo. Działanie podobne jak Arsenu lecz słabsze. *Objawy:* Ból w ustach, przełyku i żołądka, smak metaliczny, nudności, salivatio, nieustające wymioty i wszelkie objawy choleryczne (zob. Acid. arsenicos.). *Leczenie:* Po przepłukaniu żołądka tannina i znów przepłukanie lub purgans. Zresztą symptomatycznie: pigułki lodowe, morfina, excitantia.

Aqua laurocerasi zob. Acid. hydrocyan.

Argent. nitr. — $Ag. NO_3$ — **Dos. letal.** duża, trudno oznaczyć. Śmierć prawie nigdy gdyż zapobiegają temu wymioty. *Objawy:* Nadżarcia bł. śluz. powierzchowne, strup biały. Ból piekący. Gastroenteritis. Wymiociny białe ciemnieją na świetle. Zawroty głowy, zapad. *Leczenie:* Środki wymiotne zwykle zbyteczne więc mleko, przepłukanie obfite żołądka wodą słoną lub białkową. Zresztą symptomatycznie. **Arszenik** zobacz Acid. arsenicos.

Atropinum. Belladonna. Hyoscyamus, Datura Str. **Dos. toxica** = 0.01 gr. — **Dos. letal.** = 0.10 gr. Dla dziecka kilka jagód Belladony, lub kilkanaście nasion Datury. Odwar z kilku gramów liści. Śmiertelność względnie mała = $\pm 10\%$. — *Objawy* występują szybko. Po kilku minutach suchość w ustach i drapanie w gardle, niemożność połykania. (Po jagodach nudności i wymioty). Zaczerwienienie i obrzmienie twarzy, tętno przyspieszone do 140, (porażenie N. vagi), silne tętnienie karotyd. Skóra sucha, szkarlatna, uczucie gorąca. — Rozszerzenie źrenic, zaburzenia wzrokowe. Zawroty i ból głowy, złudzenia i omamy. Szał. Trismus. Później sopor lub coma. Śmierć w ciągu 12 godzin lub rokowanie quoad vitam dobre. — *Objawy* ustępują zwolna po kilku dniach. *Leczenie:* środki wymiotne. Przepłukanie żołądka odwarem garbnikowym. Laxans. Acid. tannic. 2% co 5 minut łyżkę. Zimne okłady na głowę. Gdy szal injectio Morphii. Rp. Pilocarpini 0.05, Aq. dest. 5.00 co kwadrans injectio Pravaza aż się język zwilży.

Barowe sole: — Witeryt $BaCO_3$ jako trucizna na szczury. Azotan Ba w pyrotechnice (zielone ognie). Siarkan jako

Blanc fixe. — Zatrucie wodorotlenkiem $Ba(OH)_2$ nie zdarzyło się. **Dos. let.** = 10 gr. Czasem w ciągu 12 godzin śmierć. Objawy w zatr. podobne jak sól. ołowiowemi, nadto działają na serce jak digitalis. *Leczenie* zobacz: Plumbum.

Belladonna zob. Atropinum.

Botulismus zobacz Ptomainy.

Brom. W postaci pary wywołuje conjunctivitis, rhinitis, salivatio, strasznie męczący kaszel, spasmus glottidis, bronchitis a nawet pneumonia. — Zawroty i ból głowy, odurzenie. Zażyty wewn. silne zapalenie dróg pokarmowych, zapad i rychła śmierć. Sole bromowe obniżają czynność systemu nerwowego, stupor, osutka krostkowa. *Leczenie*: czyste powietrze, sztuczne oddechanie, amoniak do wdychania. Wewnętrznie klej krochmalny, woda białkowa. Ciepłe kąpiele.

Camphora. **Dos. tox.** = 1,00 — 2,00 gr. Rozdrażnienie, popęd do ruchów. gonitwa myśli, drżenie, zaczerwienienie twarzy, utrata świadomości, wymioty, drgawki, czasem szal. *Leczenie*: środki wymiotne, zlewanie zimną wodą.

Cantharidin (bezwodnik kw. kantarydowego). **Dos. let.** ponad 0,01 gr.

Cantharides (Lytta vesicatoria, Mylabris Cichorei) **Dos. letal. pulveris Cant.** około 2 gr. — tincturae C. 30, gr.; Emplastri Canth. 15, gr. — *Objawy*: Palenie języka, przelyku, żołądka, ślinotok, wymioty, pęcherze na bł. śluz. Biegunka niestabilna, parcie. W okolicy nerek ból, parcie na mocz, ilość moczu mała, mętny, zawiera białko, wałeczki przyblonkowe, — palenie w cewce, bolesne erekcje. U ciężarnych abortus. Ból głowy, zwolnienie tętna, obrzęk twarzy, rozszerzenie źrenic. Coma. *Leczenie*: nie podawać tłuszczów ani napojów wysokokowych!! Przepłukanie żołądka lub środek wymiotny, kleiki, mixt. gummosa. lód, bańki w okolicy lędźwiowej, kąpiele ciepłe, opium.

Carbol zob. Acid. carbohc.

Chinin — **Dos. letal.** około 8, gr. — **Dos. tox.** 1 — 1,50 gr. *Objawy*: Wymioty, ból brzucha, szum w uszach, odurzenie, głuchota i ślepotą, halucynacje, ogromne osłabienie, morzysko, śpiączka, tętno zwolnione, ciało chłodne, sinica, czasem abortus. Śmierć z porażenia serca. *Leczenie*: środek wymiotny, przepłukanie żołądka, tannina, excitantia.

Chlor. działa podobnie jak brom (zobacz) lecz silniej, haemoptoe, dyspnoe, sinica. Gaz wdechnięty naraz w dużej ilości spowodza nagłą śmierć. *Leczenie* zobacz Brom. Wziewania pary wodnej, narkotyki.

Chloralum hydratum — **Dos. letal.** = 5,00 — 10,00 gr. Silniejsze rozczyyny drażnią i nadżerają błonę śluzową. Smak drapiący, palenie wzdłuż przelyku i żołądka, czasem wymioty. Upośledzenie czucia, sen, który przechodzi w coma. Oddech ciężki. Oziebienie ciała, osłabienie serca, sinica, czasem nagle śmierć z porażenia serca. *Leczenie*: emetica, przepłukanie żołądka, sztuczne oddechanie. Środki drażniące skórę, excitantia, injectio Atropini 0,0005 gr.

Chloroformium. CHCl_3 — *Wypity* w większej ilości powoduje gwałtowne piekące bóle w przełyku i żołądku krótkie podniecenie, długi sen, wydech zdradza zapach właściwy. Często śmierć. **Dos. letal.** — 40 gramów. *Wdechiwany* spowoduje często kurcze oddechowe, nudności, potem podniecenie, niekiedy szałowe z chwilowem zaczerwienieniem i zasinieniem twarzy, szum w uszach, mrowienie wreszcie znieczulenie, zniesienie odruchów i napięcia mięśniowego. Głęboki sen, źrenice zwężone. Zaczerwienienie twarzy ustąpiło, oddechy regularne, tętno zwolnione, parcie krwi niższe, ciepłota ciała obniża się. Czasem asphyxia wskutek opadnięcia języka. — **Dos. letal.** rozmaita, nawet 100 gr. wdechiwano bez szkody, wyjątkowo już po 2 gramach syncope i nagła śmierć z porażenia serca. — *Objawy groźne:* zasinienie ust i twarzy (asphyxia), — albo woskowa bladość, tętno małe, przepuszczające lub niewyczuwalne, oddechy zbyt powierzchowne, źrenice silnie zwężone następnie ad maximum rozszerzone, akcja serca ustaje. *Leczenie:* Ważniejszem jest zapobieganie, należy więc przed rozpoczęciem narkozy zbadać serce i płuca, dbać o czystość i dobroć chloroformu i przestrzegać przepisów techniki narkotyzowania. Zalecają na 10 minut przed rozpoczęciem narkotyzowania iniekcję morfiny i atropiny. — W razie asphyxii wyciągnąć język, obniżyć głowę i pierś, sztuczne oddechanie połączone z massagem serca i t. d. zob. Aether. W razie zaksztuszenia się wymiocinami wyssać cewnikiem elastycznym.

Cocainum. — **Dos. letal.** 1, gr., wyjątkowo znacznie mniejsza (indywidualizm). *Objawy:* tętno szybsze, kołatanie serca, mrowienie w palcach, bladość, zimny pot, suchość w ustach, miganie przed oczyma, omdlenie, rozdrażnienie umysłu, rozszerzenie źrenic, potem depresja, tętno zwolnione, zapad. *Leczenie:* wdychanie amylinitritu, morphium, gorczycznik na serce, sztuczne oddechanie.

Coffeinum. **Dos. tox.** = 0.30 gr. — 0.50 gr. **Dos. letal.** = ?. — *Objawy:* niepokój i rozdrażnienie, szum w uszach, zawrót głowy, odurzenie, drżaczka, stężenie mięśni. Tętno szybkie nieregularne, kołatanie serca, niekiedy drgawki czasem nawet śmierć z porażenia serca. *Leczenie:* środki wymiotne lub przepłukanie żołądka, wdychanie Amylium nitrosum. Środki drażniące skórę, sztuczne oddychanie, morfium.

Colchicinum. **Dos. letal.** = 0.04—0.06 gr. Wszystkie części rośliny (*Colchicum autumnale*) są trujące szczególnie nasiona Ziemiowita jako odwar. *Objawy* zwykle dopiero po 2—3 godzinach. Palenie w całym przewodzie pokarmowym, pragnienie, wymioty, biegunka. Trwoga, zawroty, majaczenie, duszność. Świadomość czasem zupełna. Znieczulenia z niedowładem wstępującym, czasem szybki zapad. Drgawki. Przebieg zwykle długi, polepszenia naprzemian z pogorszeniem. Śmiertelność = + 50%. — Śmierć z porażenia oddechania. *Leczenie:* Emetica zwykle zbyt skuteczne, raczej lodowe pigułki.

odwary garbnikowe. Rp. Acidi tannici 5,00 + Extr. Opii aquosi 0,20 + Aq. dest. 200,00 DS. Co 5 minut łyżkę. — W zapadzie excitantia. Sztuczne oddechanie.

Conium. — Dos. tox. = 0,05 gr. — Dos. let. = 0,15 gr. Alkaloid płynny, gryzący, w wszystkich częściach Szczwolu (*Conium macul.*), najwięcej w nasionach (0,7%). *Objawy:* Wkrótce po zażyciu palenie w ustach, drapanie w gardle, salivatio, wymioty, rozszerzenie źrenic, senność, zawroty głowy, w łydkach niedowład i porażenie, tętno przyspieszone (poraż N. vagi), porażenie kończyn dolnych, potem górnych, wreszcie mięśni oddechowych, tężec i śmierć z uduszenia (podobnie jak curare). *Leczenie:* Emetica. Acid. tannici 2% co 5 minut łyżkę. Excitantia. Świeże powietrze i sztuczne oddechanie.

Cornutinum, ergotinum — zobacz Secale.

Cuprum. C. aceticum (grynszpan). C. sulf. — Dos. letal. = \pm 10,00 gr. Dla dzieci = \pm 1,50 gr. *Objawy:* W słabym rozczywie smak ściągający, metaliczny, nudności, wymioty zieloną treścią, biegunka krwawa potem czarna. Morzysko. Przypadłości nerwowe, zawrót i ból głowy, znieczulenia, drgawki i zapad, sprowadzający czasem szybko śmierć. *Leczenie:* Przepłukanie żołądka słabym rozczywnem kalii ferrocyanati lub przynajmniej wodą. Mleko, woda białkowa, cukier. — Magn. ustae.

Czad i Gaz świetlny zawierają w swym składzie trujący CO. zobacz Tlenek węgla.

Datura Stramonium zobacz Atropin.

Digitalis purpurea. — Dos. letal. Trae. D. 25 gr. — Infus. e folior. 2,50 gr. — Extr. D. 1,20 gr. — Digitalin 0,01. — *Objawy:* Ból głowy, nudności, wymioty uporeczywe, biegunka. Tętno pełne, zwolnione 40—30 na minutę (podrażn. N. vagi), amblyopia, szum w uszach, rozdrażnienie, nawet delirium, Później tętno przyspiesza się (poraż. N. vagi). małe, nieregularne. Omdlenie, oziębienie ciała, lepki pot. Coma. *Leczenie:* tannina, czarna kawa z rumem lub koniakiem, injectio ol. camph. Przeciw wymiotom lód, morfina. Przeciw oziębieniu ciepłe okłady.

Ergotinum, cornutinum zob. Secale, sporysz.

Eter zobacz Aether sulf.

Gazy kłoczane zawierają czasem ogromną ilość siarkowodoru (2—15%) i dwusiarczku amonu. Atmosfera zawierająca 0,08% H_2S może być zabójczą. Powonieniem wykrywa się już 0,001%. — *Objawy:* ból i ciśnienie w głowie, zawroty, nudności, drapanie w gardle, szczypiący ból w nosie i oczach, osłabienie, omdlenie, drgawki kloniczne i toniczne, źrenice szerokie, tętno i oddechy słabe, sinica, coma, najczęściej śmierć. Po wdechnięciu większej ilości H_2S przebieg szybki. Nagle się upada z krzykiem, utrata świadomości, sinica, w ustach piana, śmierć, *Leczenie:* Zapobiegawczo wsypywać do dołów kłocznych siarkan żelaza. Gaz świetlny zobacz tlenek węgla. Świeże powietrze, sztuczne oddechanie, środki drażniące skórę, infuzya 0,6% Na Cl. Excitantia.

Grynszpan zob. Cuprum.

Grzyby trujące. *Amanita phalloides* (i pokrewne) podobna do *Bedłki pieczarki*, sprowadza teżsame objawy co i *Hellvella* podobna do jadalnego smardza (*Morchella*), który w stanie surowym ma być też czasem trującym. — *Objawy*: Po kilku (do 24) godzinach nudności, wymioty, biegunka śluzowa lub krwawa, gwałtowne bóle brzucha, tętno małe, skóra zimna, miganie przed oczyma, mydriasis, mdłości, uczucie lęku, sopor, zapad, czasem delirium, drgawki i śmierć. Często żółtaczka, haemoglobinuria. — Śmiertelność 75%. — W zatruciu **muchomorem** (*Am. muscaria*) przeważają często objawy nerwowo-mózgowe, odurzenie, rozdrażnienie, szal, drgawki epileptyczne. Zrenice rzadko zwężone (muscariin), zwykle rozszerzone (cholin), sekrecja czasem wzmożona. Przebieg szybszy. *Leczenie*: zapobiegawczo przed smarzeniem grzyby sparzyć wrzącą wodą lub octem i wyciąg ten odlać. Przepłukanie żołądka, purgans, acid. tannic 2% co 5 minut łyżkę. Excitantia, diuretica. Jeżeli przyczyną muchomor nadto atropinę 0,0005. —

Helleborus virid, foetid. i niger. Ciemiernik. Folia et radix. **Dos. letal** = Extracti 2,00, Decocti 30 gr. — Piekący ból i obrzęk języka, salivatio, silne przypadłości żołądkowo-jelitowe, odurzenie, rozdrażnienie, drgawki i sopor. Zrenice często rozszerzone. Tętno z początku zwolnione później bardzo szybkie i drobne. Oddechy zwolnione i słabe. Śmierć wśród zapadu. *Leczenie*: usunąć resztki trucizny z przewodu pokarmowego, zresztą postępować jak przy digitalis (zob.)

Hydrarg. bichlor corros. — **Sublimat.** — **Dos. let.** = 0,50 gr. Przy polykaniu smak ściągający, metaliczny i ból palący w ustach, gardle a szczególnie w żołądku; wymioty treści białawo-śluzowej, często z domieszką krwi, potem okropny ból brzucha, biegunka wodnista, często krwawa z parciem, utrzymująca się długo. W stolcach strzępy nekrotyczne błony śluzowej i krew iak w czerwonce. Zapad, anuria lub oliguria, w moczu białko. Śmierć w ciągu 3 dni lub później a wtedy dołączają się nowe objawy: ptialismus merc. foetor ex ore, obrzęk ślinianek, stomatitis et gingivitis ulcerosa. — *Leczenie*: woda białkowa i mleko! Jeżeli wymioty niedostateczne wstrzyknąć apomorfine lub pobudzać mechanicznie do wymiotów, a nie sondować ani też nie podawać soli. — Lód, narkotyk. Ławatywy z wody, czopki z makowcem. Płukanie gardła kalio chlorico, etc.

Hyoscyamus niger. zobacz Atropin.

Jadowite grzyby zob. grzyby trujące.

Jad kiełbasiany zobacz Ptomainy.

Jad żmij i innych gadów. — *Objawy miejscowe*: po ukąszeniu niektórych gadów w miejscu ukąszenia tylko 2 klute rany, po innych nadto zaczerwienienie, obrzęk otoczenia a czasem i całej kończyny, który później sinieje i żółźnie, czucie miejscowo upośledzone. *Objawy ogólne*: trwoga, drzenie, nudności i mdłości, ból i zawrót głowy, znaczne osłabienie mięśniowe,

oddechanie utrudnione, zapad. Rzadko biegunka. Skłonność do krwotoków. — Śmierć wśród drgawek lub też wyzdrowienie powolne. — *Leczenie*: podwiązać kończynę powyżej ran a te wyciąć z najbliższem otoczeniem lub wypalić żelazem. Wstrzykiwania miąższowe do rany 1% kali hypermang. lub sublimatu. Przepłukiwanie żołądka. Wewnętrznie alkoholica w dużej ilości, kamfora. — Diaphoretica. W Australii wstrzykują strychninę. — Sztuczne oddechanie.

Jod. Zatrucie ostre po solach jodowych rzadkie, częste po jodynie wypitej przypadkowo lub wstrzykniętej do jam ciała. *Objawy*: gastroenteritis czasem bardzo gwałtowna, wymiociny brunatne zawierają niebiesko zabarwione resztki potraw mącznych. Szybko zapad, anuria, coma i śmierć. W przypadkach łagodniejszych nadto obrzmienie ślinianek, salivatio, coryza, zaczerwienienie twarzy, ból głowy, osutki na skórze. Również **Jodoform** wessany z powierzchni ran może wywołać podobne objawy, w przypadkach cięższych często psychozy. *Leczenie*: przepłukanie żołądka kleikami lub wodą białkową, magnezją, zresztą leczenie symptomatyczne, lód, środki podniecające i nasenne. Później roborantia, chinin.

Juniperus Sabina — Cis — zobacz Sabina officinalis.

Kalium chloricum. — $KClO_3$ — Wytwarza we krwi Methemogl. **Dos. letal.** = 10 — 30, gr. — U dzieci = 4, gr. pro dosi. Po dużej dawce (30, gr.) zatrucie bardzo ostre, śmierć po kilku godzinach wskutek rozkładu krwi i wewnętrznego uduszenia. *Objawy*: gwałtowne wymioty, biegunka, zapad, coma, usta i paznokcie bardzo sine, śmierć. Po dawkach mniejszych (10, gr.) zatrucie podostre. *Objawy*: przypadłości żołądkowo-jelitowe, ból głowy, zabarwienie skóry żółtaczkowe z sinawo-ciemnymi plamami, bolesność w podżebrzach, powiększenie śledziony i wątroby, ból w okolicy nerek, duszność. Mocz skąpo, mętny, brunatny, lub czarny, zawiera białko, rozpadłe ciała krwi, wałeczki, methemgl. i haematynę. — Anuria z zaczerwienienia kanalików, śmierć wśród objawów uraemii. — Krew czekoladowa, płynna. — *Leczenie*: wcześniej przepłukać żołądek, nie podawać kwasów natomiast płyny słabo alkaliczne, środki napotne i moczopędne, Venesection z transfuzją krwi odwióknionej lub infuzya 0.6% NaCl. — Excitantia.

Karbol zob. Acid. carbolic.

Kłocazny gaz zob. Gazy kl.

Kreosotum zob. Acid. carbolicum,

Kwas pruski zob. Acid. hydrocyanic.

Morphium. **Dos. letal.** = \pm 0.10 — 0.40 gr. — U osesków może kilka miligr. wystarczyć. — *Objawy* występują po iniekcji morf. w 5—10 minut, po zażyciu w pół godziny, po makowcu później. Smak gorzki, uczucie ciepła w skórze, zaczerwienienie i świąd, czasem pot obfity. Tętno trochę szybsze. Znużenie, ciężkość głowy, senność, sen lekki z utrzymaniem odruchów przechodzi w sopor i coma. Zrenice silnie

zweżone nieoddziałują. Oddechy bardzo zwolnione, tętno miękkie coraz wolniejsze, ledwie wyczuwalne, obrzęk płuc i śmierć z porażenia oddychania w 6—8 godzin. W agonii czasem rozszerzają się źrenice (CO_2). *Leczenie*: Morfina wydziela się do żołądka więc częste przepłukiwanie tegoż wodą lub odwarem garbnikowym. Tannina. Sztuczne oddychanie. Excitantia. Ogrzewanie ciała. Iniekcye Atropiny 0.2 miligr. co pół godziny.

Muchomor — Amanita muscaria — zobacz grzyby trujące.

Nicotinum. zobacz Tytoń.

Nitrobenzol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$), olejek Mirbany. **Dos. letal.** = 20 kropeł — 15, gr. — W niektórych perfumach i likierach. Zmienia skład krwi (Metheingl.). — *Objawy*: w pół godziny po zażyciu lub wdychnięciu par sinawo szare zabarwienie twarzy, pot, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka. Zapad. Wymiociny, mocz i powietrze wydechane mają zapach migdałowy. Sensorium zajęte, coma. Czasem kurcze. Źrenice rozszerzone. W moczu ciało redukujące. Śmierć ($\pm 30\%$, po kilku lub kilkunastu godzinach lub też polepszenie po dłuższym śnie i wyzdrowienie. *Leczenie*: przepłukiwanie żołądka, purgantia nieoleiste! Nie podawać wysoku ani mleka! Zimne zlewania, sztuczne oddychanie. Transfuzye krwi odwł. Infuzye 0.6% Na Cl. — Coffein podskórnio. Czarna kawa.

Nitroglycerinum (trinitroglyc.). — Glonoinum. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3$. **Dos. letal.** = kilka do 20 kropeł. Działa podobnie jak Nitrobenzol. i Amylium nitros. lecz powolniej. *Objawy*: palenie w gardle, okropny ból głowy, zaczerwienienie twarzy, pot, nudności, wymioty, zawroty głowy, utrata przytomności, osłabienie mięśniowe. Oddechy z początku przyspieszone potem zwolnione, ciężkie. Coma, sinica. *Leczenie* patrz Nitrobenzol.

Nux vomica zob. Strychnin.

Opium zawiera 10—15% morfiny, Extr. opii = 17—20% morf. — Tinct. opii simpl. = 1% morf. Intoxitatio zob. Morphiūm.

Petroleum. Oleum petrae. Dobra nafta nie jest trująca, podle gatunki nieczyste sprowadzały śmierć. — *Objawy*: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ból głowy, utrata przytomności, zapad. *Leczenie*: emetica lub przepłukiwanie żołądka. Sztuczne oddychanie, środki podniecające.

Phosphorus. Główki zapalek siarkowych = 6—7% Phosph. Paczka = mniej więcej 0,05 Ph. **Dos. letal.** 0,05—0,15 a dla dziecka mniej więcej 6 główek t. zn. kilka miligr. — W wodzie bardzo trudno się rozpuszcza tylko w tłuszczach lub alkoholu. *Objawy*: Najostrzej u dzieci, już po kilku godzinach śmierć wśród zapadu, u starszych zwykle przebieg podostry i rozmaity. W pierwszym dniu objawy żołądkowe, wymiocin zwykle skapo, świecą w ciemności i wydają woń czosnku; podobnie i kał. W 2 dniu wyjątkowo zapad i śmierć, najczęściej jednak pozorna poprawa. — Później żółtaczka, ból w prawem podżebrzu, powiększenie wątroby, ciepłota podniesiona, mocz mało, ciemny, białko.

W dniach następnych zwolnienie lub nasilenie objawów, znowu wymioty i to krwawe, abortus, krwotoki z nosa, wybroczynki w skórze, bezwładność mięśni, ból głowy, zajęcie sensoryum, senna, coma, zapad. Pod koniec wątroba może znaleźć. Śmierć z porażenia serca przeważnie w 4—7 dnu. Śmiertelność mniej więcej 50%. *Leczenie*: obfite przepłukiwania żołądka wodą lub b. słabym kalihypermang. — Jako emetyk najlepiej Cuprum sulf. 1:50 Aquae. DS Co 5 minut łyżkę aż do skutku. Następnie co kwadrans w mniejszych dawkach jako antidotum. Również dobrą jest stara terpentyna (ozon.) Rp. Ol. terebintinae crudi et vetusti 10,00 DS. Co kwadrans po 10 kropel wypić z kleikiem. W następnych dniach leczyć symptomatycznie. Nie podawać mleka ani tłuszczów!!

Plumbum Najważniejszy octan ołowiu gdyż inne sole działają mniej energicznie. — Ostre zatrucie rzadkie. *Dos. letal.* = 20—50 gr. — *Objawy*: Nadżarcia błony śluz., palenie, wymioty, biegunka czasem krwawa, zapad. Wymiociny zwykle szare. Jeżeli ulegnie resorbeyi: morzysko, bóle w mięśniach, niedowład., zawroty głowy, znaczne, zwolnienie tętna (40), obstipatio, znieczulenie, stupor. — Śmierć zwykle dopiero po dłuższym czasie, częściej wyzdrowienie ale niezupełne. *Leczenie*: środek wymiotny i laxans. Najlepiej Natr. sulf. lub Magnes sulf. — Rp. Magnes. sulf. 10%. DS. Szklanę w ciągu 10 minut — Mleko. Diuretica.

Ptomainy. Jad gnilny w zepsutem mięsie, kiełbasach, (Botulismus, Allantiasis), rybach i serze. — W kilka lub kilkanaście godzin po spożyciu nudności i mdłości, odbijania, wymioty czasem uporczywe, ból brzucha, biegunka naprzemian z zaparciem. morzysko. Porażenie nerwów wydzielniczych, suchość w ustach i gardzieli, trudność w połykaniu, porażenie głosi, głos ochrypły lub aphonia, kaszel, duszność, suchość skóry. Szum w uszach, złudzenia słuchowe, zawroty i ból głowy, chód chwiejny, osłabienie mięśniowe, porażenie nerwów ocznych, ptosis, rozszerzenie źrenic, dwuwidzenie, chromatopsya. Sen niespokojny. Tętno i ciepłota początkowo zwykle podwyższona, potem opada. Zapad. — Śmierć zwykle po 4—8 dniach, wyjątkowo nagle wśród objawów cholerycznych. Wyzdrowienie bardzo powolne. — *Leczenie*: purgantia salina, woda karlsbadzka, kalomel. Narkotyki, odwary garbnikowe, herbata z czerwonym winem. Pilocarpin. — Nie podawać tłuszczów!

Santoninum. — *Dos. tox.* = 0,10—0,30. — Semen recte flores Cinae zawierają 1½% Santonini. — *Objawy*: widzenie fiołkowych konturów, potem xantopsia, miganie płatków przed oczyma, halucynacje słuchu i wzroku, odurzenie, nudności, zgrzyt zębów, kurcz mięśni twarzy i drgawki ogólne, nieprzytomność, rozszerzenie źrenic, zapad, porażenie ośrodków oddechowych. — Mocz żółty po dodaniu alkaliów czerwienieje purpurowo. — *Leczenie*: przepłukiwanie żołądka, emeticum, purgans. Chloral hydrat. Sztuczne oddechanie.

Secale cornutum. Sporysz. — Ostre otrucie rzadko spowodować śmierć, częściej chroniczne. **Dos. let. ponad 7,00 gr.** — **Objawy:** nudności, szum w uszach, wymioty śluzowe, morzysko, biegunka, stolce brunatne. Zimny pot, sopor, delirium, zaburzenia czuciowe, tętno drobne szybkie, coma, czasem abortus a nawet śmierć. Zwykle poprawa lub cierpienie chroniczne w postaci: Ergotismus gangraen. lub spasmodic. — **Leczenie:** przepłukanie żołądka, środek wymiotny, tannina 2⁰/₀, excitans. Amylium nitros.

Siarkowódór zob. Gaz kłocaczny.

Sporysz zob. Secale cornut.

Strychninum et Brucinum. 2–3⁰/₀ w nasionach Strychnos Nux vomica. — **Dos. let. = Str. nitr. 0,03—0,10 gr.** Dla dziecka jeden do kilku miligr. — **Objawy:** gorycz, zwykle brak wymiotów. Po upływie pół godziny bolesne uczucie ciągnięcia w mięśniach z pojedynczymi drgawkami, trwoga, później wybitne napady tęcza ogólnego pochodzenia rdzeniowego i odruchowego, wywoływane podnieceniami na zmysły, z początku krótsze później kilkadziesiąt sekund trwające. Wtedy opistotonus, ustanie oddechania, śnica, wytrzeszczenie gałek ocznych, rozszerzenie źrenic, tętno szybkie 100 do 120. Świadomość zupełnie zachowana. — W przerwach między napadami objawy ustępują, pozostaje okropny ból i zaburzenia zmysłów. — Róbowanie zależy od częstości i nasilenia napadów. W napadzie 3 minuty trwającym może nastąpić śmierć z uduszenia. Mało kto przetrzymuje więcej jak 5 napadów. Śmierć najczęściej po 2 godzinach. — **Leczenie:** Nie używać sondy żołądkowej bo odruchowe napady!! W pierwszych chwilach najlepiej apomorfinę podskórną a wewnątrz tanniny 2⁰/₀ co 5 minut łyżkę. Chlo ralhydratis dosim plenam per rectum, a nim zadziała może się okazać w razie napadu konieczną narkozę chloroformową. Sztuczne oddechanie.

Sublimat zobacz Hydrarg. bichl.

Stibium tartaricum. zob. Antymonu połączenia.

Tlenek węgla. — **Dos. letal. CO obliczają na 0,80 gr.** Śmiertelność znaczna (w Berlinie 77⁰/₀). — **Objawy** występują zwolna: uczucie ciężkości głowy i tętnienie w skroniach, zawroty i nudności poczem silny ból głowy, wymioty jedno lub kilkorazowe, miganie przed oczyma. zaczerwienienie twarzy, szum w uszach, osłabienie, chory z trudnością wychodzi na świeże powietrze i ratuje się albo upada, traci przytomność, sopor, coma. Oddech ciężki charczący. Tętno z początku pełne, silne, później miękkie i szybkie, przepuszczające. Coma może przeciągać się kilka dni, zwykle jednak (w ciężkich przypadkach) śmierć już po kilku godzinach, przeważnie bez drgawek. Ciepłota ciała podnosi się pod koniec i po śmierci o 1–3⁰ Cels. — Uratowani okazują sztywność mięśni i bezwładność kilkudniową, często psychosy i inne cierpienia. **Leczenie:** Świeże powietrze z sztucznym oddechaniem. Podniesienie głowy, zimne zlewania, amoniak do wachania. Podskórną ol. camphor. — Faradyzowanie N.

phrenici. Gdy się coma przedłuża infuzye 0.6% Na Cl po upuszczeniu krwi lub lepiej transfuzye odwiłkniętej krwi. — W razie wymiotów zapobiegać aspiracyi wymiocin do płuc.

Tojad. — (**Aconitum** Napellus, Lycopetionum etc. Odmiany roślin krajowych.) — Zawiera akonitynę (najwięcej w korzeniu), najjadowitszą z wszystkich alkaloidów (zob. Aconitinum). — *Objawy*: pieczenie w ustach, mocno szczypiący smak rzodkwi z następownem znieczuleniem języka, ból piekący wzdłuż przełyku i żołądka. Ślinotok, pragnienie, wymioty. Mrowienie i drętwienie członków, porażenie dolnych kończyn. Uczucie zimna, zimne poty, kolka, rzadko biegunka. Lęk, zawroty i ból głowy, amblyopia i głuchota, źrenice zwykle rozszerzone. Tętno drobne i zwolnione do 40, arytmia. Oddech ciężki powierzchowny. Drgawki. Świadomość często utrzymana. Przebieg czasem bardzo szybki, pół do kilka godzin. Śmierć z porażenia ośrodków oddechowych lub zupełne wyzdrowienie. *Leczenie*: (środki wymiotne?). Przepłukanie żołądka, sztuczne oddechanie. Nado Acid. tannici 2% co 5 minut łyżkę. Pigułki lodowe.

Trucizna kiskowa, kielbas i wędlin zobacz Ptomainy.

Tytoń zawiera (lepszy) 2% do (gorszy) 7% nikotyny a w dymie zasady pyridinowe działające podobnie szkodliwie lecz słabiej. *Dos. letal.* = nikotyny 0,06, a odwaru z 1 — 2 gr. liści. — *Leczenie*: po małej ilości alkaloidu i po paleniu tytoniu: uczucie gorąca w skórze, salivatio, nausea, zawroty głowy, wymioty. Drżenie mięśniowe, wzmożenie peristaltyki, biegunka z silnem parciem. Oddechy powierzchowne, niepokój serca, tętno przyspieszone, później zwolnienie. Omdlenie, drgawki toniczne i kloniczne. Po zbudzeniu się długo osłabienie, brak apetytu. — Po większej dawce uczucie palenia w ustach i przełyku, nagła utrata przytomności, silne drgawki, znaczne zwięźnienie źrenic, rychła śmierć (w kilku minutach). — Częstsze są zatrucia chroniczne. — *Leczenie*: przepłukanie żołądka odwarem garbnikowym. Wewnętrznie tannina, kali jodati, czarna kawa, excitantia, zimne zlewania głowy, sztuczne oddechanie.

Ukaszanie żmij zob. jad żmij.

Veratrinum (w nasionach Sabadillae offic.) działa podobnie jak Veratroidin (w cebuli ciemieżycy). Lokalnie drażni bardzo silnie zakończenia nerwów czuciowych, palenie potem znieczulenie. Po spożyciu palący ból w całym przewodzie pokarmowym, gwałtowne wymioty i biegunka krwawa, zawroty, omdlenie, mrowienie w kończynach później na całym ciele. Ciężkość ciała obniżona, zimny pot. Tętno drobne, słabe, nieregularne. Oddechanie utrudnione. Znieczulenie skóry z utrzymaniem świadomości, drgawki i stężenie niektórych mięśni, głównie twarzowych. Ciężki zapad i śmierć z porażenia serca i oddechania. — *Leczenie* symptomatyczne i sztuczne oddechanie.

Środki używane do podskórnych wstrzyk. i sposób ich zastosowania
(w obliczaniu przyjęto że wstrzykawką = 1 ccm. = 1 gr.)

	Rozczyn	Dawka	Wskazania
Acid. carbolicum	1 : 100 Aquae	0·01—0·04 1—4 wstrzyk.	Uraemia, Erysipelas, Rheum. artic.
Acid. hyperosmicum	1 : 100 Aquae	0·005—0·01 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	Neuralgia
Acid. sclerotinum	0·5 : 10 Aquae	0·01—0·05 $\frac{2}{10}$ —1 wstrz.	osłab. ból. poród., krw. z macicy
Aconitinum	0·10 : 10 Aquae	0·002—0·004 $\frac{2}{10}$ — $\frac{4}{10}$ wstrz.	Nerwobóle, gościec
Aether sulfuricus „ aceticus	czysty	1·0—2·0 1—2 wstrzyk.	Excitans
Antipyrinum	10 : 10 Aquae	1·0—2·0 1—2 wstrzyk.	Nerwobóle, wysoka ciepłota
Apomorphinum hydrochloricum	0·10 : 10 Aquae 2 gtts acid. mur.	0·005—0·01 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	Emeticum
Atropinum sulfuricum	0·02 : 10 Aquae	0·0002; $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{2}$ wstrzyk.	Kurcze, krwotoki, poty
Camphora	1 : 10 Aeth., Spir. lub Ol.	0·025—0·05 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	Excitans
Chininum sulfuricum mur.	1—2·5 : Glyc., Aquae āā 5,0	0·05—0·10 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk. letn. rozc.	Antistypticum, Antipyreticum
Chloralum hydratum	5·0 : 10 Aquae	0·5—2·0 1—5 wstrzyk.	Hypnoticum (nie- skutkuje)
Cocainum hydrochloricum	0·5 : 8 Aquae 2 Spir. v. rect.	0·5 = 1 wstrzykawką	miejscowe znie- czulenie, analge- ticum
Coffeinum purum	0·2 : Aquae, Spi- rit. v. āā 5,0	0·01—0·02 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	w zatr. chloralem i morfina, analept. hemierania

	Rozczyn	Dawka -	Wskazania
Coffeinum natrio-salicyl. lub natrio-benzoicum	5:10 Aquae fer-vidae	0·1—0·3 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	Choroby serca, analepticum
Coninum	0·01:8 Aquae 2 Spir.	0·0001—0·001 $\frac{1}{10}$ —1 wstrz.	Asthma
Curare	0·10:10 Aquae	0·002—0·005 $\frac{2}{10}$ — $\frac{1}{2}$ wstrz.	Tetanus, Epilepsia, Lyssa
Digitalinum	0·05: Aquae Glycerini $\bar{a}\bar{a}$ 5·0	0·001—0·003 $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$ wstrz.	wady serca
Emetinum purum	0·10:10 Aquae	0·002— $\frac{2}{10}$ wstrzykawki	Emeticum
Ergotinum (dialys. ad injectionem.)	2·5:10 Aquae	0·25—0·5 1—2 wstrzyk.	oslab. ból. porod. krw. z macicy
Hydrarg. bichl. corrosiv.	0·10:10 Aquae	0·005—0·01 $\frac{1}{2}$ —1 wstrz.	Syphilis
Hydrarg. formid. solut.	t. j. rozczyzn 1:100	0·01 = 1 wstrz.	Syphilis
Hydrarg. peptonat.	t. j. rozczyzn. Hdgr. bichl. 1·0 Sol. aqu. 50,0 Natr. chlor. pept. 3·0	1 wstrzyk.	Syphilis
Hyoscinum hydrojod.	0·02:10 Aquae	0·0004—0·001 $\frac{2}{10}$ — $\frac{1}{2}$ wstrz.	Tremor, paralysis agitans, hypnoticum dla umysł. chorych
Kali jodatum	3:10 Aquae	0·15—0·30 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	Syphilis, periostitis syphilitica
Liquor ammonii anisati	czysty	0·5—1·0; $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	Excitans
Liquor kali arsenicosi	2·5:5 Aquae	2—4 krople $\frac{3}{10}$ — $\frac{6}{10}$ wstrz.	cachexia malarica, chorea
Morphin hydrochloricum	0·10:10 Aquae	0·005—0·01 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzy.	Narcoticum

	Rocezyn	Dawka	Wskazania
Natrium chloratum	6·0+1·0 Natr. carb.: 1 Lit. Aqu.	hypodermo- klysa	cholera
Ol. camphoratum	czyste	$\frac{1}{2}$ —1 wstrzykawka	excitans
Pilocarpinum hydrochloric.	0·20 : 10 Aquae	0·01—0·02 $\frac{1}{2}$ —1 wstrzyk.	Diaphoreticum Sialagogum
Physostigminum salicylicum	0·02 : 10 Aquae	0·0004—0·001 $\frac{2}{10}$ — $\frac{5}{10}$ wstrzyk.	Tenatus, epilepsia, chorea
Solut arsen. Fo- wleri zob. Li- quor kal. arsen.	—	—	—
Sparteinum sul- furicum	0·20 : 10 Aquae	0·01—0·02 $\frac{1}{2}$ —1 wstrz.	w osłabionej akcyi serca, arytmia
Strychninum nitric.	0·20 : 10 Aquae	0·002—0·006 $\frac{2}{10}$ — $\frac{6}{10}$ wstrz.	Porażenia, amau- rosa
Veratrinum	0·05 : Spir. Aq. āā 5,0	0·001—0·003 $\frac{2}{10}$ — $\frac{6}{10}$ wstrz.	Antipyreticum, rheu- matism, neural, po- rażenia



Tablica brzemienności.

Ostatnia regularność		Dzień porodu		Ostatnia regularność		Dzień porodu	
Styczeń	1	Październ.	8	Lipiec	5	Kwiecień	12
"	5	"	12	"	10	"	16
"	10	"	17	"	15	"	21
"	15	"	22	"	20	"	26
"	20	"	27	"	25	Maj	1
"	25	Listopad	1	"	28	"	4
Luty	1	"	4	Sierpień	1	"	8
"	5	"	8	"	5	"	12
"	10	"	12	"	10	"	17
"	15	"	22	"	15	"	22
"	20	"	27	"	20	"	27
"	25	Grudzień	1	"	25	Czerwiec	1
Marzec	1	"	6	"	28	"	4
"	5	"	10	Wrzesień	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Styczeń	2	"	25	Lipiec	2
Kwiecień	1	"	6	"	28	"	5
"	5	"	10	Październ.	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Luty	2	"	25	Sierpień	1
Maj	1	"	5	"	28	"	4
"	5	"	9	Listopad	1	"	8
"	10	"	14	"	5	"	12
"	15	"	19	"	10	"	17
"	20	"	24	"	15	"	22
"	25	Marzec	1	"	20	"	27
"	28	"	4	"	25	Wrzesień	1
Czerwiec	1	"	8	"	28	"	4
"	5	"	12	Grudzień	1	"	7
"	10	"	17	"	5	"	11
"	15	"	22	"	10	"	16
"	20	"	27	"	15	"	21
"	25	Kwiecień	1	"	20	"	26
"	28	"	4	"	25	Październ.	1
Lipiec	1	"	8	"	28	"	4



SKOROWIDZ

ważniejszych zdrojowisk, kąpielisk i uzdrowisk.

Ułożył

Dr Stanisław Eljasz-Radzikowski.

Skrócenia: C. = Celsius, c. = ciepłota, km. = kilometry
Zkł. = zakład, m. = metrów (wzniesienie nad poziom morza)
p. = pobyt, p. kąp. = pora kąpielowa, p. zdroj. = pora zdrojowa, st. k. = stacya kolejna.

I. Cieplice obojętne.

Landek 32° (Szląsk), Warmbrun 36—38° (Szląsk), Schlangenbad 28—32° (Nassau), Wildbad 33—37° (Wirtembg), Johannisbad 29° (Czechy), Cieplice czeskie 28—48° (Czechy), Römerbad 30—38° (Styrya), Gastein 25—49° (Rakusy), Jaszczurówka 21° (Polskie Tatry), Pfäfers 38° (Szwajcarya), Ragatz 38° (Szwajcarya), Plombières 20—70° (Francya). — NB. Przyrodzona kąpiel parowa w jaskini Monsummano (pod Pistoją) we Włoszech.

II. Wody słone.

1. **Zimne i letnie.** Kissingen, Homburg, Truskawiec.
2. **Gorące.** Baden-Baden, Wiesbaden, Nauheim, Oeynhausens-Rheme.
3. **Solanki.** Ischl, Aussee (w Styryi), Reichenhall, Hall (w Tyrolu), Kołobrzeg, Gmunden.
4. **Wody słone jodo-bromowe.** Adelhaidquelle, Bex, Hall (w Rakusach górnych), Iwoniec, Inowrocław, Jastrzębie, Kreuznach, Lipik, Rabka, Rymanów. — NB. Częściowo też należą tu kąpiele morskie.

III. Wody litowe.

Bilin, Obersalzbrunn, Salvatorquelle (Peszt), Salzschlirf.

IV. Wody alkaliczne.

1. **Szczawy alkaliczne.** Bilin, Giesshübl, Neuenahr, Obersalzbrunn, Vals, Vichy.

2. Szczawy alkaliczno-solne. Chudowa, Ems, Gleichenberg, Luchaczowice, Szczawnica, Wysowa.

3. Szczawy alkaliczno-glauberskie. Karlsbad, Francensbad, Marienbad, Rohicz, Błotne jezioro, Tarasp-Schuls.

V. Wody gorzkie.

Morszyn, Węgierskie wody gorzkie (Budzińskie): Adelajdy, Elżbiety, Franciszka Józefa, Hunyady, Püllna, — Friedrichshall, Montmirail, Saidschütz, Szaratica (Morawy, Dra Vesely'ego).

VI. Wody żeleziste.

Bardyjów, Francensbad, Krynica, Levico, Nałęczów, Pyrmont, Roncigno, Srebrenica (Guberquelle), St. Moritz, Żegiestów.

VII. Wody alkaliczno-ziemne.

Borszek, Contrexéville, Lenk, Lippspringe, Weissenburg, Wildungen.

VIII. Wody siarczane.

Akwizgran, Aix-les-Bains, Baden pod Wiedniem, Barège, Busko, Cieplice tenczyńskie, Cieplice warażyńskie, Eaux Chaudes, Eaux Bonnes, Herkulesbad, Krzeszowice, Lubień, Piszczany, Swoszowice.

IX. Kąpiele morskie.

Nad morzem Bałtyckiem: Copoty, Koło, Kołobrzeg, Heringsdorf, Misdroy, Sassnitz.

Nad morzem Północnem: Blankenberghe, Helgoland, Norderney, Ostenda, Scheveningen, Sylt.

Kąpieliska francuskie (nad oceanem Atlantyckim): Biarritz, Dieppe, Havre de Grâce, Trouville.

Kąpieliska angielskie: Brighton, Isle of Wight, Ramsgate.

Nad morzem Śródziemnem: Abbazia, Ischia, Lussinpiccolo, Monaco, Nizza, Palermo, Tryest, Wenecya.

X. Uzdrowiska czyli stacye klimatyczne.

1. Równiny, doliny i wzniesienia aż do 400 m. n. p. m. Hohenhonnef, Rożnów, Saleburg i t. d.

2. Wzniesienia nad 400—900 m. n. p. m. = klimat górski. St. Blasien, Falkenstein, Friedrichsroda, Goerbersdorf, Reiboldgrün.


3. Wzniesienia takie same (400—900 m.), lecz pod wpływem klimatu alpejskiego = klimat podalpejski. Aussee, Axenstein, Gmunden, Innsbruck, Interlaken, Konstancya (nad jeziorem Bodeńskim), Reichenhall, Berchtesgaden.

4. Wzniesienia ponad 900 m. = klimat wysoko-górski czyli alpejski. Arosa, Churwalden, Davos, Klosters, Langwies, Leysin, Nowy Smokowiec, Pontresina, Rigi-Klösterli, Rigi-Scheidegg, St. Moritz, Samaden, Seewis, Semmering, Zakopane.

5. Klimat morski. Wyspy i wybrzeża. — Tutaj należą kąpieliska morskie.

6. Uzdrowiska zimowe. Należą tu uzdrowiska letnie, nadające się też do pobytu zimowego (Baden-Baden, Homburg, Wiesbaden).

- a) *Lecznice klimatyczne dla chorych piersiowych.* Arosa, Davos, Falkenstein, Goerbersdorf, Hohenhonnef, Reiboldsgrün, Zakopane.
- b) *Zimowe uzdrowiska nad morzem Północnem.* Kąpieliska morskie
- c) *Zimowe uzdrowiska na południu, z suchym klimatem.* Arco, Gries, Meran, Tyrol południowy, Riviera di Levante, R. di Ponente, wybrzeża południowe Hiszpanii, Egiptu (Kair).
- d) *Te same z klimatem wilgotnym.* Abbazia, Jezioro Genewskie (Montreux), Vevey, Włochy górne i południowe, jeziora we Włoszech górnych, wyspy na morzu Śródziemnym, na oceanie Atlantyckim Madeira, Teneriffa i t. d., Algier, Aleksandrya.



Abbazia nad morzem Adryatyckiem w Istrii, własność kolei połud. — St. k. Mattuglie-Abbazia o 30' drogi — otwarta cały rok, kąpielisko morskie i st. klim. zimowa od 15. IX — 15. — V, łagodny, wilgotny klimat, kąpiele morskie od V — IX urządzenia wytworne — droga Dr. H. Ebers.

Abas-Tuman, Kaukaz, 1270 m., cieplice obojętne.

Aequi, Piemont, Górne Włochy, 140 m., liczne słono-siarczane cieplice, 36—75° C.

Adelhaidquelle, Bawarya 800 m., wody słone jodo-bromowe.

Aix-les-Bains, (Aix en Savoie) Sabaudya, 267 m., cieplice siarczane, 45° C. znakomite urządzenia kąpielne przez cały rok do użycia.

Ajaccio, Korsyka. st. klim. zimowa, p. 15. X 30. IV.

Akwizgran = Aachen = Aix-la-Chapelle = Aquisgranum, Prusy nadreńskie, 176 m., silne cieplice alkaliczno-słono-siarczane, 45—56° C., urządzenia kąpielne i na porę zimową.

Algier, półn.-Afryka, fr. Alger. stolica Algieryi, st. klim. zimowa, p. XI — 15 IV. Podróż na Marsylię, zkad parowcem.

Ałupka, na południowym wybrzeżu półwyspu krymskiego, kąpielisko morskie i uzdrowisko, winogrona.

Amélie-les-Bains, Francya, depart. wsch.-pyrenejski, 276 m., słynne z balneotechnicznych swych urządzeń i z łagodnego klimatu cieplice siarczane, od 31° do 63° C. Właściwa pora kap. 1. V — 30. X, jednak i przez cały rok do użycia.

Apollinarisbrunnen, szczawa alkaliczna słaba, wydobywana w Heppingen (Prusy nadreńskie) rozsyłana w milionach flaszek rocznie.

- Arco**, Tyrol południowy, 93 m., st. klim. zimowa, p. 1. IX 16. V. Winogrona.
- Arnstadt**, Turyngia, 300 m., silna jodo-bromowa solanka, 24% soli kuchen. zawierająca.
- Arosa**, Szwajcarya, wysoko górskie uzdrowisko, letnie i zimowe, 1800 m. o 200 m. wyżej niż Davos, od st. k. w Chur poczta $3\frac{1}{2}$ godz. Lecznica dla piersiowych.
- Aussee** Styrya (Salzkammergut), 650 m., silna solanka, 24.5% soli kuchennej zawierająca.
- Ax**, Francya, depart. Ariège, cieplice obojętne i siarczane.
- Axenstein**, nad jeziorem czterech kantonów, 750 m., piękne uzdrowisko letnie.
- Baden pod Wiedniem**, czyli Baden rakuski, 218 m., cieplice ziemno-słono-siarczane, 26—33. 7° C., P. 1. V—15. X, Dr Kümmerling (Polak).
- Baden w Szwajcaryi**, czyli Baden helwecki, 382 m., cieplice ziemno-słono-siarczane, 48° C., urządzenia lazienkowe i na porę zimową. P. kap. 15. V 30. IX.
- Baden-Baden**, czyli cieplice szwabskie w W. Ks. Badeńskim, 200 m., cieplice solankowe, 65—68° C. najwytworniejsze i najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, klimat bardzo łagodny, licznie odwiedzane jako st. klim. przejściowa, P. 1. V—30. X, też w zimie.
- Badenweiler**, w W. ks. Badeńskim, 423 m., cieplice obojętne 26.4° C. klimat łagodny, P. kap. od 1. V — 1. X.
- Bagnères de Luchon**, Francya, depart. gór. Garonny, 628 m., pyrenejskie cieplice siarczane, 17—66° C., znakomite balneotechniczne urządzenia. P. kap. od 15. VI — 15. X.
- Balaton Füred**, = Błotne jezioro.
- Bardyjów** = Bartfeld, półn. Węgry, na pograniczu Galicyi, 310 m., szczywy wapniowo-żelaziste, urządzenia balneotechniczne przestarzałe, w ostatnim czasie nieco ulepszone. Pobyt tani.
- Barèges**, Francya, (Pyreneje), 1232 m. cieplice siarczane, 31—45° C.
- Bath**, w Anglii, z Londynu w 3 godz. do dojeżdżenia, 3 źródła ciepłocy wapniowej, od 42° do 47° C., bardzo licznie odwiedzanej (rocznie około 30.000 osób), Pobyt drogi.
- Berchtesgaden**, Bawarya, 580 m., st. klim. letnia i solanka.
- Berka**, w W. Ks. Sasko-Weimarskiem, nieznaczne źródła siarczane i żelaziste, przeważnie klimatyczne uzdrowisko 268 m.
- Bex**, Szwajcarya, 435 m., silna solanka 17% tudzież st. klim. przejściowa.
- Biarritz**, Francya, w zatoce Biskajskiej, kąpielisko morskie. Pobyt bardzo drogi. Pora kap. od 1. V — 15. X.
- Bilin**, w Czechach, 200 m., 2 mile od Ciepłic czeskich, silne szczywy alkaliczne, do dwóch m-lionów flaszek corocznie rozsyłane.
- Birsztany**, Litwa (gub. wileńska), solanka od 0 do 30% urządzenia zdrojowe i kąpielne w ostatnim czasie znakomicie ulepszone przez Dra Rodeckiego L. zakład. Ceny wszystkiego bardzo umiarkowane. P. kap. 15. V—30. IX. Dr Zachorski.

- St. Blasien**, Badeńskie, 772 m., letnia st. klim. i lecznica dla piersiowych.
- Błotne jezioro**, na Węgrzech, kąpiele jeziorne w miejscowości zwanej Siófok.
- Bocklet**, Bawarya, 1 godz. od Kissingen, 195 m., silne żelaziste źródło, bardzo zamożne w kwas węglowy. P. zdr. 15. V, — 30. IX.
- Bojarka**, wieś, o pół godz. od Kijowa, zakład kumysowy, własność i kierownictwo Dra Sadowskiego, otwarty 1. V — 1. IX.
- Bordighera**, półn. Włochy, nad zatoką genueńską pomiędzy Mentoną a San Remo, st. klim. zimowa. P. 15. X—15. V.
- Bormio**, (Worms) górne Włochy, 1375 m., cieplice obojętne, 35—40° C, p. kąp. tylko VII i VIII.
- Bozen**, połud. Tyrol, 260 m., st. klim. przejściowa, leczenie winogronami.
- Borszék**, w Siedmiogrodzie, 381 m., szczawy alkaliczno żelaziste, w kwas węglowy wolny bardzo zamożne, P. zdr. kąp. tylko 1. VII — 31 VIII. Rozsyłka wód bardzo wielka.
- Borżum**, Kaukaz, 798 m., źródła alkaliczno-solne ciepłe, 20—30° C. składem chemicznie zbliżone do Vichy.
- Brighton**, Anglia, sławne kąpiele morskie, źródła siarczane i żelaziste.
- Budapeszt**, stolica Węgier, cieplice słabo siarczane, 45—63° C. wspaniałe urządzenie t. zw. Kaiserbad, Raitzenbad i Lucasbad. W pobliżu Budy są bardzo liczne źródła wód gorzkich, z nich najważniejsze: Hunyady, Attila, Deak, Rakoczy i Wiktorya.
- Bourbonne les Bains**, Francya (Wogezy), silne słone cieplice, 58—66° C., nazywane francuzkim Wiesbadenem. P. zdr. 15. V — 15. X.
- Bournemouth**, w Anglii uzdrowisko nadmorskie, wielkim obszarem lasów otoczone, ciepłota powietrza zimą przeciętnie +7,2° C., mnóstwo wspaniałych will, lecznica dla piersiowych.
- Busko**, Król. polskie, gub. Kielecka, pow. Stopnicki, zakład zdrojowo - kąpielowy wód solno - alkaliczno - siarczanych, LL. Dr Dymnicki, Grabowski, Majkowski, L. zakł. i Szpitala, Dr Radziszewski tudzież Dr Sulimirski, P. 15. V—30. IX.
- Burtscheid**, Prusy nadreńskie, niedaleko Akwizgranu, cieplice solankowe, 59—74° C. P. zdr. 1. V, 30. IX., jednak łaźienki i wśród zimy otwarte.
- Buziás**, Węgry, 132 m., bardzo silne szczawy alkaliczno-żelaziste. Rozsyłka wód do Anglii i do Ameryki bardzo wielka, pobyt tani, p. zdr. 15. V, 30. IX.
- Cairo**, p. Kair.
- Cannes**, Francya, tuż nad morzem Śródziemnem, st. klim. zimowa znakomita, p. pob. w celu klim. 1. X, 1. V, dla kąpiel morskich 1. V, 30. X.
- Cannstatt**, Król. wirtemberskie, 218 m., solanka 0—2‰, 8—20 C. niemiecka st. klim. przejściowa, p. zdr. 1. V, 15. X.
- Capri**, st. klim. zim. na wyspie tej nazwy, parowcem z Neapolu 3—4 godz.

- Catania**, Sycylia, klim. zim. P. 15. XI, 30. III, średnia ciepłota zimowa $11\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$., (na Rivierze $9-10^{\circ}$).
- Charlottenbrunn**, Śląsk pruski, 440 m., szczawa ziemno-żelazista, p. zdr. 15. V, 1. X.
- Churwalden**, Szwajcarya, 1270 m., st. klim. letnia górska bardzo licznie uczęszczana, p. pob. 1. V, 30. IX.
- Cautemrets**, Francya, (depart. wysokich Pyrenejów), 930 m. słynne cieplice siarczane, $15-55^{\circ}\text{C}$., p. kap. 15. VI, — 15. IX.
- Chudowa**, (mylnie Kudowa), Śląsk pruski. 400 m., szczawy alkaliczno-żelaziste.
- Ciechocinek**, Król. polskie, st. k. żel. warszawsko-hydgoskiej, solanka $0\frac{1}{2}-4\frac{0}{10}$, Dr Dr. Arnstein, Asterblum, Certowicz, Ciagliński, Górski, Lewenstein, Lubowski, L. zakł. Pajewski, Ruppert, Stockmann, Tannenbaum i Wolberg.
- Cieplice czeskie** = Teplitz-Schönau Czechy, 220 m. słynne cieplice obojętne, $32-48^{\circ}\text{C}$.
- Cieplice trenczyńskie** = Trenczyn = Trencsin - Teplitz, Węgry, 250 m., cieplice siarczane, $38-40^{\circ}\text{C}$., Dr Filipkiewicz.
- Cieplice warażyńskie** = Töplitz Warasdin = Warażyń, Kroacya 274 m. cieplice ziemno-siarczane, 57°C .
- Cirkwienica**, Chorwacya, uzdrowisko zimowe, oraz kąpielisko morskie, (30. IV, 1. X).
- Colberg**, p. Kołobrzeg.
- Contrexeville**, Francya (Wogezy), 350 m., wybitnie zimne źródła.
- Copoty**, (niem. Zoppot), pod Gdańskiem, st. k., kąpielisko morskie, licznie uczęszczane przez Polaków. Szpital dla dzieci zotzowych na 65 łóżek. Wiadomości udziela Dr Semon w Gdańsku, 15. VI — 30. IX.
- Cranz**, p. Kolo.
- Cudowa**, p. Chudowa.
- Davos**, Davos-Dorf, 1574 m., Davos-Platz, 1560 m., Szwajcarya. Dwa łączące się z sobą uzdrowiska, najznakomitsza st. klim. zimowa na cały świat znana, posiada mnóstwo pensyonatów i hoteli, lecznica dla piersiowych Dra Turbana, lecznica dla uczniów i uczennic, st. k., Pobyt latem, a głównie zimą wskazany.
- Dieppe**, Francya (Normandya), wyborne morskie kąpielisko, p. 1. VI. 30. IX.
- Driburg**, Westfalia, 200 m., szczawy alkaliczno-ziemno-żelaziste, p. 15. V 30. IX.
- Dorna-Watra**, Bukowina w Karpatach, szczawa alkaliczno-żelazista.
- Druskieniki**, Litwa, (gub. grodzieńska), 17 km. od st. k. ż. warszawsko-petersburskiej, 200 m., solanka $1\frac{0}{10}$, L. L. Bujakowski i Szepietowski, zakład zdrojowo-kąpielowy znakomity, p. 15. V, 30. IX.
- Droźbaki**, niem. Rauschenbach, dwie wsie: Droźbaki niżnie i wyżnie, Węgry (Spiż), cieplica wapniowa, $21. 2^{\circ}\text{C}$. już w r. 1541 opisane po łacinie przez Wernhnera, a po polsku w r. 1640 przez Petrycego, w XVII wieku przez ma-

gnatów polskich liczenie odwiedzana obecnie bardzo mało przez chorych uczeszczana, pobyt nader tani.

Eaux-Bonnes, Francya (depart. doln. Pyrenejów), 748 m., cieplice siarczane, 32° C., p. kap. 15. V, 15. IX.

Eaux-Chaudes, Francya, (departament doln. Pyrenejów), 675 m., cieplice siarczane, 11–36° C. o 6 klm. od poprzednich odległe, p. kap. 15. VI, 15. IX.

Eilsen, w Ks. Lippe-Schaumberg, 88 m., najsilniejsze z niemieckich wód siarczanych zimnych, urządzenia balneotechniczne wyborne, p. zdr. kap. 1. VI, 1. IX.

Elmen, w Prusach, 48 m., bardzo silna solanka w kwas węglowy zamożna. Jest tu zakład leczniczy dla dzieci (Augusta Heilanstalt) za opłatą miesięcznie 60 do 75 mrk.

Elster, Saksonia, 457 m., alkaliczno-słono-żelaziste wody, podobne do Franzensbadzkich, wyborne balneotechniczne urządzenia, L. Polak Dr Błociszewski.

Ems, Ks. Nassauskie, 91 m., słynne cieplice słono-alkaliczne, 28–46° C., p. 1. V, 1. X.

Ernsdorf, zob. Jaworze.

Essentuki, Kaukaz, 24 źródeł szczawy alkaliczno-słone z domieszkami bromu, jodu, siarki.

Euganejskie źródle, Włochy, w zachodniej stronie Padwy, dawniejsze podmorskie wulkaniczne wzgórza ujawniły tu liczne i silne cieplice ziemno słone, 80–70 C. w miejscowościach: Abano, Bataglii i St. Pietro Montagnone.

Eupatorya, Krym, kąpielisko morskie.

Fachingen, Prusy, (okrąg rządowy Wiesbaden), 112 m. wyborna czysta alkaliczna szczawa, zamożna w kwas węglowy, mnogo rozsyłana do dyetetycz. i leczniczego użycia. Nie ma tu urzędzonego zakładu zdrojowego.

Falkenstein, Prusy, (prow. Hessen-Nassau), pod Frankfurtem n. M., od st. k. ż. Cronberg $\frac{1}{2}$ godz. powozem, 400 m., sanatorium dla piersiowych wzorowo urządzone, kierownik Dr Dettweiler, pensjonat od osoby 8 marek dziennie.

Feydey s. Leysin, Szwajcarya, kanton Waadt, uzdrowisko wysoko-górskie, 1450 m., lecznica dla piersiowych też zimowa. Od st. k. Aigle powozem 3 godz.

Flinsberg, Śląsk pruski, 528 m., szczawy alkalicz.-żelaziste, tudzież st. klim. górską leśną, p. 15. V, 30. IX.

Frankenhausen, Turynia, 115 m., solanka 20‰, sanatorium dla dzieci zolzowych od 2 do 4 lat, za czterotygodniowy pobyt 60 mrk. od chorego.

Francensbad, Czechy, Franciszkowe Łaźnie, 423 m., alkaliczno-solno-żelaziste szczawy, zamożne w kwas węglowy, wzorowe balneotechniczne urządzenia kąpielne. Z tutejszej borowiny H. Mattoniego sól i ług borowinowy, oba przetwory licznie rozsyłane, zastosowywane na kąpiele, LL. polacy: Dębicki Karol i Rosner Jan.

Friedrichshall, w Ks. Sasko-Meiningen, dawniejsza salina i zdroj słono-gorzki, powszechnie znana woda gorzka p. i. „Friedrichshallerbitterwasser“ ze skutków rozwalniających.

Friedrichsroda, m. w Ks. Sasko-Coburg-Gotha, ulubiona

w Niemczech letnia klimatyczna miejscowość w lesie turyngskim, 430 m., corocznie przez 5.000 osób odwiedzana, p. 15. V, 15. IX.

Fürstenhof, Styrya, prywatny folwark przy m. Kapfenbergu, 533 m., Zakł. hydropatyczny, dawniej własność Dra Czerwińskiego, przeważnie przez Polaków uczęszczany, pensjonat 30 do 40 zlr. tygodniowo od osoby.

Gainfarn, przy m. Vöslau pod Wiedniem. 200 m., zakład hydropatyczny Dra Friedmanna, pensjonat 50 zlr. tygodniowo od osoby.

Gais, Szwajcarya, (kant. Appenzell), 935 m., najdawniejszy zakład galaktoterapeutyczny, letnia st. kl., pensjonat 4—6½ fr. dziennie od osoby, p. 15. V, 15. IX.

Gastein = Wildbad-Gastein i Hof-Gastein (niżej położony, mniej wykwintny) po pols. Gastuń, Austrya, (Ks. Salzburgskie), 960 m., cieplice obojętne, 24—48° C., klimat czysto alpejski. Najodpowiedniejszą p. pob. VII i VIII.

Giesshübl-Sauerbrunn, pod Karlsbadem, wł. stac. kol., Czechy, 340 m., znakomita prosta szczawa alkaliczna. Jest tu zakład hydropat.

Gleichenberg, Styrya, 248 m., szczawy alkaliczno-solne, klimat łagodny, urządzenia balneotechniczne wzorowe, LL. Polacy: Brühl i Bulikowski, p. pob. 1. V, 30. IX.

Gmunden, Austrya górna, 422 m., nad jeziorem Traunsee, st. k., uzdrowisko letnie, kąpiele solankowe, wzięwalnia, p. 1 VI, 1. X.

Goczałkowice, Szlask pruski, ¼ godz. od st. k. ż. Pszczyny (Pless), 266 m., solanka jodobromowa, 3‰ soli kuchennej, wywóz zageszczonej solanki i soli zdrojowej.

Goriatszewodzk, Ces. rosyjskie, Kaukaz, w górach kabardyńskich, cieplice siarczane 87.9° C. gorące.

Görbersdorf, Szlask pruski, 550 m., Lecznica dla piersiowych ś. p. Dra Brehmera, wynalazcy klimatycznego leczenia suchot, drugi zakład podobny młodszy Dra Römpera, oraz zakład dla niezamożnych chorych Dra Weickera. Od st. k. Friedland 20' powozem. Lecznice znakomite.

Gräfenberg, Szlask austriacki, 580 m., przez swego założyciela Priessnitza najdawniejszy i powszechnie znany zakł. hydropatyczny, cały rok otwarty.

Gries, połudn. Tyrol, 270 m., ¼ godz. od Bozen, uzdrowisko zimowe, leczenie winogronowe, p. 15. IX — 30. IV.

Griesbach, W. ks. Badeńskie, 396 m., szczawy alkaliczno-żelaziste, p. 15. V, 15. IX.

Grodzisko, Król. pols., St. k. ż. warszaw. wiedeńskiej, zakł. kąpielowo leczniczy, założony przez ś. p. Dra Bojańskiego dom zdrowia z wygodami, żywienie dyetetyczne z kuchni zakładu. L. Dr Tokarski.

Źródło **Gubera** p. Srebrenica.

Hall rakuski, Górna Austrya, 376 m., wody słone jodobromowe.

Hall tyrolski, Tyrol, 537 m., solanka 26‰, urządz. kąpiel. liche.

Hall = Schwäbisch-Hall, król. Wirtembergs., 290 m., solanka 2¼‰.

- Hallstadt**, Austrya, Salzkammergut przy Ischlu), solanka 27‰.
- Harkány**, połud. Węgry, 90 m., cieplice siarczane, 62° C.
Szczególną własnością tutejszej cieplicy jest wydobywający się z niej tleno-siarczek węgla, który zapalony pali się niebieskawą barwą.
- Havre de Grâce**, Francya, kąpielisko morskie.
- Helgoland**, wyspa na m. północnem, kąpielisko morskie, p. 1. IV, 1. X.
- Hélouan**, nad Nilem w Egipcie. 35 km., od Kairu, st. klim. zimowa i cieplice siarczane, 32° C., urządzenie balneotechniczne i pomieszkania należyte. P. pob. do leczenia klimatycznych, 15. IX — 15. IV; zaś dla kąpeli 1. V do 1. VI. Koszt pięcioletniego pobytu około 3.000 franków.
- Heringsdorf**, na wyspie Usedom, Pomoze, str. k., kąpielisko morskie nad m. bałtyckiem, od lądu wysokopiennym lasem otoczone, licznie uczęszczane 15. V, 30. IX.
- Herkulesbad**. zob. Mehadia.
- Hohenhonnet**, nad Renem, lecznica dla piersiowych chorych wybornie urządzona, otwarta niedawno (1892), 236 m., pod miasteczkiem Honnet. gdzie st. k. o 20' powozem odległa, otwarta cały rok, też w zimie.
- Homburg**, Ks. Nassauskie (okrąg rządowy Wiesbaden), 189 m., źródła żelazisto-glaubers. i żelazisto-słone, uzdrowisko letnie i zimowe, zakł. ortopedyczny, wodoleczniczy i żentyczny.
- Hyères**, Francya, 1 godz. od Tulonu, 100 m., st. klim., p. 1. X, 1. V.
- Ingol**, w Ces. rosyjskiem (gub. jénissejska), wielkie jezioro słone o 350 km. od Tomska oddalone, zbadane r. 1890/91 przez prof. Dra Zaleskiego, ciepłota 20—22° C., którego jeziora woda i muł używane są od miejscowej ludności na kąpiele. Niema dotychczas urządzeń kąpielowych ani pomieszczeń.
- Inowrocław**, (niem. Inowrazław) Ks. Poznańskie, m. powiatowe, od r. 1876 urządzony zakł. silnych kąpiel solankowych 26‰, własność Towarzystwa akcyjnego, zawiązanego staraniem Drów Wilkońskiego, Grabowskiego, i Rakowskiego. LL. Krzyżmiński i Przybyszewski.
- Interlaken**, Szwajcarya, Berner Oberland, wierzchowina berneńska, 568 m., st. klim. podalpejska, leczenia mleczne, żentyczne, winogronowe. poziomkowe, licznie uczęszczane kąpiele, 15. IV—1. X. Koszt dzienny w pensyonacie od osoby 8—12 zlr.
- Ischia**, w zatoce Neapolitańskiej, kąpielisko morskie, cieplice parówki przyrodzone.
- Ischl**, Austrya (Salzkammergut), 484 m., solanka 24‰, klimat łagodny wilgotno ciepły, p. zdr. VI—30. IX. Pobyt drogi.
- Iwonicz**, Galicya, st. k. ż. o 12 km., oddalonej od zakładu zdrojowego, 410 m., szczawiy jodo-bromowo-słone, opisywane od r. 1630, źródła Karola i Amelii, około 600 pokojów gościnnych, 3 gmachy łaźnie z 114 wannami do kąpeli, nowe łaźienki borowinowe i hydropatyczne. Dr Dębicki

Klemens, Rościszewski, Supiński i Staniszewski, p. zdr. 15. V—1. X.

Jastrzębie, (niem. Königsdorf-Jastrzemb) Szlask pruski, 250 m., wody słone, brom zawierające. L. zakł. Dr Witczak Polak.

Jaszczurówka, w Tatrach, pod Zakopanem, 908 m., jedyna polska cieplica obojętna 21° C., kąpiele w zbiorniku, hotel wygodnie urządzony, wille osobne. Połączenie omnibusem z Zakopanem.

Jaworze, (niem. Ernsdorf) Szlask austriacki u stóp Beskidów, 1 mila od Bielska, 360 m., zkl. żetyczny, a głównie wodolecznicy, obecnie co do swych urządzeń ulepszony, którego dzierżawcą i kierownikiem Dr Czop i Jেকেles.

Johannisbad, Czechy, 651 m., cieplice obojętne 29° C., st. klim. letnia, p. zdr. 16 V, 30. IX.

Juliuszhal, Brunświk, 317 m., solanka 6‰, st. klim., letnia, p. zdr. 25. V, 1. X.

Kair, Kairo, Egipt, uzdrowisko zimowe, klimat suchy, gorący, p. 15. X, 15. IV.

Kaltenleutgeben, Austria, 2 godz. od Wiednia, pierwszorzędny w Austrii zkl. hydropatyczny, własność prof. Dra Winternitza, mogący współcześnie pomieścić około 900 chorych, wzorowo prowadzony, pensjonat od osoby 50 zlr. tygodniowo.

Kapri, Capri, wyspa w zatoce Neapolitańskiej, zimowe uzdrowisko, 138 m., obok Anacapri 300 m.

Karlsbad, Karolowe wary, Czechy, słynne cieplice alkaliczno-glauberskie, 12 źródeł o c. 30—73° C., (Sprudel, Mühlbrunn, Schlossbrunn, Markbrunn,) LL. polscy: Hassewicz, Hochberger, Kauffinan syn, Kretowicz, Stiche, Tugendhat, Ziembicki.

Kamionka, Podole rosyjs. miasteczko nad Dniestrem, jedyne polskie uzdrowisko winogronowe. Drowie Bociański, Kotsowski.

Kisłowodzk, ces. rosyjskie, Kaukaz, gub. Stawropolska, 861 m., liczne i rozmaite źródła, z tych najważniejszy źródło Narsan (w narzeczu krajowem ma znaczyć olbrzymie źródło), szczawa alkaliczno-słono-żelazista z ogromną ilością kwasu węglowego, w 1000 częściach wody 1:81410; 83 hektolitrow na jedną minutę wody dostarczająca, mieszkania i gmachy zdrojowe są odpowiednie, a nawet wspaniałe, p. zdr. 15. VI,—1 X.

Kissingen, Bawarya, 190 m., pierwszorzędne zdrojowisko pod względem balneotechn. urządzeń, znakomite szczawy żelazisto słone, 10—20° C.. L. Dr Chlapowski Fr. Posiada zakłady: hydropatyczny, dyetetyczny i pneumatyczny, p. zdr. 1. V, 30. IX.

Koło, (niem. Cranz = Kranzkuhren) pod Królewcem, Prusy wschodnie, st. k., kąpielisko morskie, bywa wielu Polaków, p. 15. IV — 30. IX.

Kołobrzeg, (niem. Colberg), Pomorze, st. k., kąpielisko morskie, solanka 5‰, bywa wielu Polaków, w kościele św. Mar-

cina kazania polskie, p. 15. IV—30. IX, Dr Weissenberg, Polak.

Königswart, Czechy, 1 godz. od Maryenbadu, 632 m., szczawy alkalicz. żelaziste w kw. węglowy zamożne.

Kösen, Prusy (prow. saska), 110 m., solanka 5‰, zamożna w siarkany alkaliczne i wapniowe. Jest tu lecznica dla dzieci imienia Ces. Augusty Wiktorji o 36 łózkach dla chorych, a o 40 łózkach dla kolonii wakacyjnej.

Köstritz, Saksonia, 170 m., 22‰ solankowe kąpiele, tudzież gorące piaskowe, tak urządzone, iż chory leżąc, na świeżem powietrzu może przebywać p. zdr. 15. V — 1. X.

Korytnica, Węgry, Liptów, 847 m., źródle ziemno-żelaziste, klimat górski.

Kraljevica, miasto portowe w Chorwacyi włos. Porte-re, nad morzem Adryat., godz. drogi od Rjeki (Fiume), kąpielisko morskie i uzdrowisko letnie, założone przez Polaka Dra Grodeckiego.

Krankenheil, przy Tölz (górna Bawarya), 650 m., jodo-sodowo alkaliczne źródle, p. zdr. 15. V—1. X.

Krapina, Cieplice Krapieńskie, Chorwacya, 160 m., cieplice obojętne 41—43°.

Krasnobród, w Król. pol., gub. lubelska, pow. zamojski, St. k. ż. nadwiślańskiej Rejowiec, od r. 1888 zakł. kumysowy i uzdrowisko z pensjonatem dla chorych piersiowych, utrzymanie miesięczne z kumysowem leczeniem 75 do 100 r. s. L. zakł. Dr Skłodowski.

Kranz, zobacz Koło.

Kreuth, Bawarya, 812 m., pierwszorzędný zakład galakto-terapeutyczny niemiecki, pyszne lasy, p. zdr. 15. V—30. IX.

Kreuznach, Bawarya, 106 m., słaba solanka, odrobinę jodku i bromku sodu zawierająca, o cieplocie 8—30° C., zasilana 6 źródłami słonemi. pochodzącemi z miejscowości Münster am Stein, o 25' od Kreuznach odległej, ogromny wywóz wyrabianego lugu i soli zdrojowej, p. zdr. 1. V—1. X.

Krondorf, Czechy, 1 mila od Karlsbadu, prosta szczawa alkaliczne, corocznie około 1 miliona flaszek do dyetetycznego użycia rozsyłana, napelnianie wzorowe.

Krynica, Galicya, st. k. ż. Muszyna-Krynica 589 m., z źródłem w Slotwinach, nadto zakład hydropatyczny pod kierunkiem Dra Ebersa z pensjonatem od osoby dziennie 5—8 zlr. tudzież zakład dyetetyczny własność Dra Skórczewskiego, za opłatą tygodniową od osoby 24—42 zlr., wreszcie pensjonat dla pań p. Burzyńskiej. 18 źródeł szczawy alkaliczno-ziemno-żelazistej, bardzo zamożnej w kw. węglowy, wzorowe urządzenia balneotechniczne kąpiel mineralnych, borowinowych i suchych gazowych, L. zakł. Dr Kopff, nadto Drowie Aronsohn, Askenazy, Blatteis, Cercha, Ebers, Glücksmann, Kmietowicz, Lorentski, Skórczewski, Tyszecki, 1500 pokoiów gościnnych, 2 gmachy łaźiebne o 100 wannach, klimat podałpejski, na miejscu wyrób pastylek krynickich i wyciągu z igliwia świerkowego na kąpiele balsam. przez H. Nitribitta miejscowego aptekarza, p. zdr. 5. IV—30. IX.

Krzeszowice, st. k. ż. 24 kiln. od Krakowa, zakład kąpielny wód siarczanych, L. zakł. Dr Dura.

Kudowa, zob. Chudowa.

Kumagorsk, ces. ros., Kaukaz, źródł. siarczany, 30–50° C. ciepły. Niema tu urządzeń zdrojowo-kąpielowych.

Landek, Szląsk pruski, 452 m., cieplice obojętne 22–29° C., nieco siarkowodu i siarczku sodu zawierające, L. zakł. Dr Ostrowicz. Dr Pomorski Chłap wski A., p. zdr. 15. V–15. IX.

Langenbrücken, W. Ks. Badeńskie, 138 m., zimne wody siarczane, p. zdr. 1. V–30. IX.

Lenk, Szwajcarya, kanton Wallis, 1414 m., cieplice wapniowe 45–51° C., używane na kąpiele wspólne w zbiornikach, p. 30. V — 1. IX.

Levico, Tyrol południowy, 533 m., zdroje zawierające siarkan żelaza i kwas arsenowy, mnogo rozsyłane, p. zdr. 1. V–30. IX.

Leysin, p. Feydey.

Libawa, kąpielisko morskie w Bałtyku, p. 15. V–1. IX.

Lipik, Sławonia, 158 m., alkal. solno-jodowa cieplica. 46–63° C., p. zdr. 1. V–30. IX.

Lippspringe, Prusy, (Westfalia), 136 m., wody ziemno-żelaziste, tutejsze gazy źródłane: z tlenu, azotu i kw. węglowego złożone, używane są do wzięwań, p. zdr. 15. V–15. IX.

Lubień, Galicya, 3 mile od Lwowa, 275 m., bardzo obfite zimne źródła siarczane, przyrząd do leczenia chorób górnych dróg oddechowych rozpylaniem wody siarczanej. L. zakład. Dr Radecki.

Lubownia nowa, Węgry, (Spiż), 556 m., zakład zdrojowy w pięknym i rozległym parku, szczawy alkalicz. ziemno-żelaziste. Pobyt bardzo tani.

Luhaczowice, Morawy, 508 m., szczawa słono-jodo-bromowa, na miejscu zwykle z żółcią lub z mlekiem wewnętrznie używana, p. zdr. 18. V–30. IX.

Lugano, Szwajcarya, kanton Tessyński, 275 m., st. klim. przejściowa.

Madeira, północ. Afryka miasto Funchal, słynna st. kl., południowa wilgotno-goraca, pensjonat najtańszy tygodniowo 12–15 funt. szterl. od osoby.

Maryenbad, Czechy, 640 m., alkaliczno-glauberskie zimne zdroje w gaz węglowy zamożne, c. 10–15° C., (Kreutzbr. Ferdinanandsbr., Carolinenbr.), wzorowe urządzenia balneotechniczne, L. zakł. prof. Kisch, znany balneolog. Lekarze Polacy: Harajewicz jun. i Kaufman (ojciec), p. zdr. 1. V–30. IX.

Maryówka, zakład hydropatyczny 6 km. od Lwowa, własność E. Brajera, Dr Wąsowicz.

Mehadia = Herkulesbad, Węgry (Banat). 147 m., słynne cieplice siarczane 39–40° C.

Meinberg, w Ks. Lippe-Detmold, 210 m., ziemno i słono siarczane zdroje, kąpiele: siarczano-mulowe i gazowe, p. zdr. 20. V–10. IX.

Mentona = Mentone, połudn. Francya, 1 godz. k. ż. od Nizy, w zatoce genueńskiej, uzdrowisko zimowe na francu-

skiej Riviera di Ponente, nader korzystnie położone, umiarkowano wilgotne, względnie ciepłe, pensyonat dziennie od osoby 10 franków, p. pob. 1. X—30. IV.

Meran, wraz ze sąsiednimi gminami: Ober-Untermals i Gratsch, połudn. Tyrol, 319—520 m., st. klim. zimowa, p. 15. IX—15. V, w pensyonatach wybórna kuchnia, 4—5 zlr. dziennie od osoby, wiosną leczenie galaktoterapeutyczne, jesienią winogronowe, leczenie wzniesienne, Lekarze Polacy Dr Binder i Brühl.

Michaiłowodskie źródła, Ces. ros., Kaukaz 254 m., cieplice siarczane i słono-siarczane, c. 55—68° C., najchłodniejszy zdrój ma 28° C.

Misdroy, dobre kąpielisko morskie, na wyspie Wolin, koło Szczecina, Pomorze, p. 20. VI—20. IX.

Mishor, połudn. brzeg półwyspu Krymskiego, wieś tatarska, kąpielisko morskie.

Mondorf, W. ks. Luxemburskie, 198 m., 1—15‰, cieplica bromowo-solankowa, 24° C., przeważnie na kąpiele używana.

Montecarlo = Monaco, uzdrowisko zimowe, klimat miernie suchy.

Monsummano, Włochy, (prowincya Lucca), oprócz cieplic siarczanych 40—50° C., przyrodzona parówka w jaskini, p. V—X.

Mont-Dore, Francya, (depart. Puyde Dome), 1046 m., cieplice solankowe 42—45° C., ze śladem arsenu. Pobyt drogi, w pensyonacie 15 fr. dziennie od osoby

Montreux, Szwajcarya, (nad jeziorem Genewskim kant. Waadt), wspólna miejscowość z 20 sąsiednich gmin złożona, 380 m., st. klim. zimowa, o wiele chłodniejsza jak Meran, zetyczne, tudzież winogronowe leczenie, ma szczawę alkaliczną, p. 1. IX—15. V.

Morszyn, Galicya, pow. stryjski, st. k., 316 m., oprócz słonych źródeł, znakomite słono-gorzkie źródło, wyrób soli zdrojowej do picia i na kąpiele, zakład zdrojowy jest własnością „Towarzystwa lekarzy galicyjsk.” stanowiąc fundusz wdów i sierót pozostałych po lekarzach, Dr Zopoth.

Münster am Stein, Prusy (prowincya nadreńska) 100 m., niedaleko Kreuznachu, zakład kąpiei słonych bardzo dobrze urządzonych, solanka jodo-bromowa, własność rządowa.

Nałęczów, Król. polskie, o 10 klm. od Lublina, źródle ziemno-żelaziste, skape w kwas węglowy, zakłady: kąpielny, hydropatyczny i kumysowy, pensyonat dziennie 3½ do 5 rs. od osoby, Dr Chmielowski Dyrektor zakł., tudzież Drowie Chelchowski, Puławski, Saczewicz.

Nauheim, Ks. Hessen - Darmstadt, 140 m., najsilniejsza niemiecka cieplica solankowa, nader zamożna w kw. węglowy, 35° C. położenie rozkoszne, urządzenia balneotechniczne wyborne Dr Jankowski.

Neundorf, Prusy, (prowincya Hessen-Nassau), 71 m., zimne wody siarczane z niemieckich najsilniejsze, tudzież solanka 6‰ wzorowo urządzenia balneotechniczne, p. zdr. 1. V—30. IX.

- Nervi**, Włochy, niedaleko Genui na Riviera di Levante, uzdrowisko zimowe, klimat miernie wilgotny, p. 1. X—1. V.
- Neuenahr**, Prusy nadreńskie, 87 m., cieplice alkaliczne, 20—40° C., podobne do Ems i Vichy. klimat łagodny. p. 1. V—15 IX.
- Nieklan**, Król. pol., st. k. ż. Iwangrodzko-dąbrowskiej tegoż nazwiska, świeżo otwarty zakł. hydropatyczny w willach hr. Platara, okolica leśna, kierownik Dr Misiewicz.
- Niemirów**, Galicya (powiat żółkiewski), zimne Siarczane źródło, zakład kąpielny opuszczony.
- Niederselters**, zob. Selters.
- Nizza = Nice**, Francya (depart. Alp morskich), nad morzem Śródziemnem, ulubiona st. klim. południowa, umiarkowano wilgotno-ciepła, kąpielisko morskie, pensjonat od 10 do 20 frank. dziennie, L. polak Dr Tymowski, p. 1. X—1. V.
- Norderney**, Hanower, wyspa m. północnego, najznakomitsze niemieckie kąpielisko morskie, lecznica dla żółzowych chorych, pensjonat w hotelach 50 marek tygodniowo od osoby p. 1. V—15. IX, Dr Paniński.
- Nowe Miasto nad Pilicą**, Król. pols.. gub. Piotrkowska, zakład wodolecznicy Dra Bilińskiego, pensjonat od 2 rs. 20 kop. do 3 rs. 15 kop. dziennie od osoby, Lekarze: Drowie Biliński, Niedzielski i Skowroński.
- Nowy Smokowiec**, (węgiesk. Uj-Tatrafüred, niem. Neu-Schmecks), Węgry, w Tatrach, 1005 m., zakład wodo-lecznicy i lecznica dla piesiowych Dra Szontagha, uzdrowisko letnie.
- Obersalzbrunn**, patrz Salzbrunn.
- Odessa**, w ces. ros., miasto portowe na północnym wybrzeżu morza Czarnego, kąpielisko morskie. Ciepłota wody w morzu waha się latem od 15° do 26° C., średnia jej temperatura 15° do 18° C., W Odeskiej zatoce są trzy naturalne słone jeziora („limany“): „Kujalnicki“ „Chadżybejski“ i „Klein-liebnalski“) służące na kąpiele słono-mulowe. Najlepsza pora do namienionych kąpiel jest od 20. VI do 15. VIII. Ocenienie działania skutków (fizyologicznych, i terapeutycznych) kąpeli limanów zawdzięczamy ś. p. Drowi Moczutkowskiemu. Lekarze: Kozłowski, Jachimowicz.
- Oeynhausen = O-Rehme**, Prusy, (Westfalia), 134 m., cieplice słone w kw. węglowy zamożne, 26—31° C., od 3 do 9% soli kuchennej zawierające, p. 15. V—30. IX.
- Ostenda = Ostende**, Belgia, najczęściej uczęszczane kąpielisko morskie, wspaniałe i zbytkowne urządzenia, pobyt drogi, zakład zbyt ruchliwy i bez spokoju.
- Palermo**, stolica Sycylii, krajobraz pyszny, bogata roślinność, klimat wilgotno ciepły, st. klimat. południowa, pensjonat w hotelu 15 lir. dziennie, p. 15. X—30. IV.
- Pau**, Francya (depart. niższych Pyrenejów), 207 m., st. klim. zimowa, ciepłsza o 2° C. od Meranu, pensjonat 10 fr. od osoby dziennie, p. 1. X—15. IV.
- Piatigorsk**, ces. rosyjsk. Kaukaz, gub. Stawropolska, 993 m., 20 źródeł siarczanej cieplicy od 29.3° do 51.25° C., tudzież

źródła alkaliczno-żelaziste 11° R. urządzenia kąpielne należyte nawet zbyt kowne; p. 1. V—1. X.

Petersthal. W. ks. Badeńskie, 421 m., jedna z t. zw. Kniebisbäder, najznakomitsze szczawy alkaliczno-ziemno-żelaziste, p. 14. V—36. IX.

Pfäfers, zobacz Ragatz-Pfäfers.

Piszczyany = Pystjan, Węgry (stolica Nitrzańska), 135 m., cieplice siarczane 57—75° C., tutejszy muł zdrojowy używany na kąpiele, p. 1. V—30. IX. Dr Peterseim (Polak).

Plombière, Francya (Wogezy), 421 m., liczne źródła ciepłe obojętne od 19 do 96° C., kąpiele wybornie urządzone, p. 30. V—15. X.

Półhora, Węgry, Orawa, pod Babią Górą, wody słone jodobromowe.

Pontresina, Szwajcarya (kant. Graubinden), uzdrowisko letnie w górnym Engadynie, 1800 m., liczne hotele i pensjonaty, od 6 do 10 frank. dziennie od osoby, p. 1. V—30. IX.

Psekups, ces. ros., 50 km. od m. Jekaterinodar, cieplice alkaliczno-siarczane, 30.5° — 52.2° C.

Pustomyty, Galicya, 1 mila ode Lwowa, wody siarczane zimne, od r. 1879 skromny zakładzik zdrojowo kąpielny.

Püllna, wieś w Czechach, źródła wody gorzkiej

Pyrmont, ks. Waldeck, 130 m., liczne źródła trzech rodzajów: proste szczawy, wody słone 4‰, a najważniejsze silne żelaziste zdroje, bardzo zamożne w kwas węglowy, pobyt drogi, p. zdr. 15. V—30. X.

Rabka, Galicya, st. k. ż. transversalnej, 500 m., najsilniejsze z europejskich zdroje słono-jodo-bromowe; w tutejszym zakładzie jest od r. 1887 „lecznica dla dzieci skrofulicznych“ założona przez Tow. Opieki Szpitalnej w Krakowie; na miejscu wyrób soli zdrojowej i lugu; klimat podgórski, powietrze czyste, Lek. zakł.: Głuchowski, Kaden, Lang, p. 15. V—1. X.

Ragatz-Pfäfers, Szwajcarya (kant. St. Gallen), dwa zdrojowiska: Pfäfers 685 m., a Ragatz 521 m., których cieplice obojętne 38° C., służą wspólnie do użycia, pensjonat od 7 do 10 fr. dziennie. Ragatz zajmują osoby zamożne, zaś Pfäfers stanu średniego, spokoju szukające.

Rehme, zob. Oeynhausien.

Reiboldsgrün, Saksonia, lecznica dla piersiowych Dra Driwera też urządzona na zimę.

Reichenhall, Bawarya, 474 m., uzdrowisko podalpejskie, solanka, leczenie wzniesienne (terenowe) zakład aeropneumatyczny i inhalacyjny do wzięcia solankowych i balsamicznych (własność Macka) pod kierunkiem znakomitego pneumoterapeuty Dra G. Liebiga będący, a drugi zakład inhalacyjny (własność Lehmann) urządzony według systemu Jahra. Ogółem urządzenia balneotechniczne wzorowe, między lekarzami zdrojowemi Polak Dr Zygm. Goldschmidt, p. zdr. 1. V—30. IX.

Reinerz, Szląsk pruski, 558 m., zdroje ziemno-alkaliczno-żelaziste, wyborna żentya, klimat górski, kąpiele mineralne

wodne i borowinowe znakomicie urządzone, p. zdr. 1. V—30. IX, Dr Stan.

Riviera, wybrzeże zatoki Genueskiej, pomiędzy Nizza a Spezia, rozdzielone przez Genuę na część zach. Riv. di Ponente i wsch. R. di Levante. Na R. di Ponente: Nizza, Mentone, San-Remo, Bordighara. Hyeres, Cannes, Monaco, Cordi-gliano, Genua. Na R. di Levante: Pegli, Nervi, Rapall, Piareggio, Spezia.

Rohicz, Styrya, (Rohitsch - Sauerbrunn) 228 m., Wody słono-alkaliczne, zamożne w kw. węgl.

Roncegno, połudn. Tyrol, 535 m., źródło arsenowo-żelaziste do picia i do kąpieli na miejscu używany.

Römerbad, połudn. Styrya, 207 m., obojętne cieplice 36—38° C., klimat łagodny.

Royat, Francya, (depart. Puy de Dome), 415 m., cieplice alkaliczno-solne 20—35° C., pobyt bardzo drogi, zdrojowisko od arystokracji licznie uczęszczane, urządzenia balneotechniczne znakomite, p. zdr. 15. VI—15. IX.

Rożnów = (Roznau) Morawy, 380 m., zakład żentyczny i wodolecznicy.

Ryga, w ces. ros., (gub. inflancka), m. portowe i forteczne pierwszorzędne kąpielisko morskie, zakład kumysowy i fabryka sztucznych wód mineralnych, wspaniałe zakłady hydropatyczny z pensjonatem, p. kap. 15. V—15. VIII.

Rymanów, Galicya, (powiat sanocki), st. k. o milę od zakładu oddalona, 3 źródła szczawy alkaliczno-słono-jodo-bromowej, Celestyny, Klaudy i Tytusa od r. 1881 zakład kąpielny, wyrób soli zdrojowej, podczas lata kolonija wakacyjna dla ubogich dzieci ze Lwowa, L. zakł. Dr Dukiet, nadto Drowie Jodłowski i Regiec, p. zdr. 20. V—20. IX.

Saidschitz, Czechy, źródło wody gorzkiej mnogo rozsyłanej.

Sandefjord, kąpielisko morskie w Norwegii, cechujące się wielką ilością soli morskiej, nadto źródło słono-siarczane, użycie: mułu morskiego na kąpiele i na okłady, tudzież nacierania członków chorobą dotkniętych meduzami. Pobyt czterogodniowy jednej osoby około 200 koron, p. zdr. 1. VI—1. IX.

Saki, w ces. ros. (gub. taurycka), 150 m., słone jezioro (liman), używane na kąpiele słono-mulowe i wodne, p. kap. 1. VI—15. VIII.

St. Honoré, Francya, 272 m., cieplice siarczane, 26—31° C., wspaniałe balneotechniczne urządzenia.

St. Sauveur, Francya, 770 m., cieplice siarczane, 20—34° C., najliczniej uczęszczane francuskie zdrojowisko.

St. Moritz, Szwajcarya, (kant. Graubünden), 1856 m., st. klim. alpejska i zakład silnych źródeł żelazistych, bardzo zamożnych w kw. węglowy, p. zdr. 1. VI—15. IX.

Salvatorquelle, woda litowa, czerpana w Preszowie, rozsyłana z Pesztu.

Salzbrunn = **Obersalzbrunn**, Śląsk pruski, 407 m., szczawy solno-alkalicz. i żelaziste, nadto środki galaktoterapii.

tyczne, znaczna rozsyłka tutejszych wód, urządzenia znakomite, tani pobyt.

Salzschlirf, Prusy, (prow. Hessen-Nassau), 240 m., jodobromowa solanka 1⁰/₆, w kw. węglowy zamożna, tudzież zdroj gorzki sodowo-siarczany.

Salzungen, ks. Sasko-Meiningen, 250 m., silne solanki 26⁰/₆, korzystne klimatyczne położenie uczyniło to zdrojowisko niezmiernie ulubionem letniem schroniskiem dla osób zolzowych i nieżytom podlegających, p. zdr. 15. V—1. X.

San-Remo, Włochy, (Riviera di Ponente) w zatoce genueskiej, uzdrowisko zimowe, które co do ochrony od wiatrów i jednostajności ciepłoty powietrznej przewyższa: Nizzę, Cannes i Hyeres, pensjonat w hotelach 10—12 frk. dziennie od osoby, p. 1. X—30. IV. L. Dr Ostrowicz.

Saratica, (Morawy), własność Dra Vesely'ego, znakomita woda gorzka.

Sasów, st. klim., zakł. wodoleczniczy Dr Ignacy Mazanek.

Sassnitz, na wyspie Rugii, kąpielisko morskie, parowcem od Szczecina, p. 15. VI—15. IX.

Saxon = Saxon les Bains, Szwajcarya (kant. Wallis), 620 m., klimat niezdrowy, cieplice jodowe 25⁰ C., pensjonat 8 do 12 franków dziennie od osoby, p. 1. V—30. IX.

Scheweningen, kąpielisko morza północnego w Holandyi, słynne z korzystnego położenia i wspaniałych swych urządzeń. Koszt czterotygodniowego pobytu jednej osoby 450 m., p. kap. 15 VI—15. X.

Schinzach, Szwajcarya, (kant. Aargau), 342 m., klimat łagodny, cieplice ziemno-siarczane 28—34⁰ C., nadto zdroj jodowy z Wildegg, ulubiony zakład od zamożnych, wyborne urządzenie balneotechniczne, L. zakł. Dr Tymowski, p. 15. V—15. IX.

Schlangenbad, Prusy, prow. Hessen-Nassau), 313 m., cieplice obojętne 32⁰ C., p. 15. V—30. IX.

Schwalbach = Langenschwalbach, 315 m., silne szczawy alkal. żelaziste, wyborne urządzenia balneotechniczne, mnoga rozsyłka wód tutejszych, p. 1. V—15. IX.

Seewis, Szwajcarya, kanton Graubünden, st. k., 1000 m. wyborne uzdrowisko wysokogórskie letnie przejściowe dla Davosu.

Selters = Niederselters, Prusy (prow. Hessen-Nassau), wieś, szczawa alkaliczna, wysyłka około 4 milionów flaszek rocznie, zakł. zdrojowego tutaj niema.

Semmering, Rakusy dolne, st. k., 1000 m., uzdrowisko wysokogórskie, letnie i zimowe.

Siofok, p. Błotne jezioro.

Simaiz, w ces. rossyjsk. na południowym brzegu półwyspu krymskiego 5 wiorst od Alupki, wyborne kąpielisko morskie i stacya klimatyczno-lecznicza ciepła, klimat i roślinność jak w Alupce, podostatek mieszkań dla gości kąpielnych.

Sławijansk, ces. rossyjskie (gubernia Charkowska) zdroje i jeziora słone 6 do 10⁰/₆ soli zawierające, latem szpital wojskowy, klimat niekorzystny, pobyt nie tani a zbyt nudny, p. 15. V—15. VIII.

Sławinek, Król. polsk., pod Lublinem, wody alkaliczno-ziemno-żelaziste słabe, pozbawione gazu kwasu węglowego, skromny zakładzik zdrojowo-kąpielowy, L. zakł. Dr Olechnowicz.

Sławuta, Wołyń, st. ż. r. brzesko-kijowskiej, st. klimat. leśna i zakł. kumysowy, lecznica dla chorób piersiowych pod światłym kierunkiem Dra Dobrzyckiego, Dr Przesmycki właściciel zakładu i konsultant, nadto Dr Dzierzbicki, zakład otwarty corocznie od 22. V do 22. IX Pensjonat sześćcio-tygodniowy 150 rs. od osoby.

Słotwiny, zobacz Krynica.

Soden, Prusy, (prow. Hessen-Nassau), 142 m., klimat łagodny, liczne źródła wód słonych w kw. węglowy zamożnych, 15—30° C., wyborne balneotechniczne urządzenia, pensjonat 36 do 45 mrk. tygodniowo od osoby, p. 15. V—15. IX.

Solec, Król. pol. (powiat Stopnicki), wieś, źródło zimny alk. solno siarczany, z krajowych najsilniejszy co do siarkowodu i połączeń siarki, niesłusznie opuszczony, Lekarze Drowie Daniewski i Siarczyński.

Spaa = Spa, Belgia, 250 m., wytworny zakład kąpielny silnych wód alkalicz. żelazistych, w kwas węglowy zamożnych, dawniej od arystokracji licznie odwiedzany, obecnie po zniesieniu banku gry mało uczęszczany, opłata zdrojowa na sezon 50—100 fr., w miarę ilości osób, p. zdr. 1. V—30. IX.

Srebrzenica, m. pow. w Bo nii, źródła siarkanowo-żelaziste arsen zawierające, 2—4 łyżek stołowych dziennie używane, wprowadzone w handel przez firmę H. Mattoniego, zwane też źródłem Gubera.

Staraja - Russa, w ces. rosyjsk. (gub. Nowogrodzka), m. powiat., 37 m., źródło słone 1^o/₁₀ soli kuchennej zawierające, urządzenia odpowiednie, p. zdr. 26. V—20. VIII.

Steben = Untersteben, Bawaria (okrąg rządowy Oberfranken), 750 m., najwyżej położone niemieckie zdrojowisko wód żelazistych w kwas węglowy zamożnych, pobyt tani, p. 15. V—30. IX.

Stołopińskie wody, ces. rosyjsk., (gub. Samarska) 210 km. od Samary, źródło słono-siarczane, a drugie żelaziste, tudzież słone jezioro, którego mulu używają do kąpiel. Wyrób kumysu wielki i mnogie jego zastosowanie na miejscu.

Swoszowice, Galicya 10 km. od Krakowa, st. k. ż. dawniej słynne kopalnie siarki, zimne wapniowo siarczane źródło z wielką ilością bezwodnika węglowego i siarkowodoru ze zakładem kąpielnym, L. zakł. Dr Zeitner.

Sylt, na wyspie Sylt na m. półn., kąpielisko morskie składa się z dwu miejscowości: Westerland (zbytkowne) i Wennigstedt (skromniejsze, odległe o godzinę), z Hamburga parowcem.

Szczawnica, Galicya, w Pieninach nad Dunajcem, 500 m., szczawy słono-alkaliczne, 7 źródeł, Józefiny, Magdaleny, i t. d., składa się ze zakładu górnego i zakładu dolnego na Miedziusiu, zakład inhalacyjny do wzięcia solankowych i igliwiowych spadkobierców Dra Janochy, zakład wodolecznicy Dra Kołaczkowskiego cały rok otwarty, zakł. mleczno-żelazowy, kąpiele rzeczne w Dunajcu, od st. k. w Starym-Sączu

(41 km.) 5 godzin powozem, L. zakł. Dr Ściborowski, nadto Drowie Górski Ks., Hammerschlag, Kołaczkowski, Korezyński Lud., Kruszyński, Singer.

Szkleno, Węgry, 1 godz. od Sztiawnie (Schemnitz) ziemne cieplice 30—56° C.

Sliacz = Szliacs, Węgry, 300 m., proste ciepłe wody żelaziste., 11—31° C w kwas węgl. zamożne, p. 15. V—30. IX.

Szkoło, Galicya, 35 km. ode Lwowa, zimne wody siarczane, ma 2 zakł. kąpielne: wojskowy i cywilny, urządzenia nędzne. Najpierwsza jego monografia Dra Erazma Syxta: „O cieplicach we Szkle wydana w r. 1527“.

Taraps-Schuls Szwajcarya (kanton Graubünden), 1180 klimat alpejski, bogaty zasób źródeł mineralnych: glauberskich, i szczaw żelazistych.

Teodozja, ces. ros., kąpielisko morskie na południowo wschodnim brzegu m. Czarnego półwyspu krymskiego, klimat zdrowy, sposobność do używania kumysu i winogronowego leczenia.

Töplitz-Schönau, zobacz Cieplice czeskie.

Trenczyn, zobacz Cieplice Trenczyńskie.

Trouville, Francya, Normandya, kąpielisko morskie.

Truskawiec, w Galicyi wsch., u stóp Karpat stryjskich, wieś oddalona od Drohobycza 8 km., st. k., zakład leży w dolinie 420 m., własność spółki obywatelskiej (ks. Sapieha i hr. Zółtowscy) obecnie dzierżawiony przez grono (Barącz, Mizerski, Dr Pelczar i inż. Wyczyński), 4 źródła do picia, z nich trzy słono-gorzkie (Maryi, Zofii i Bronisławy), jedno szczawu alkalicznej (Nafta), zakład inhalacyjny systemu Warsmutha, Lekarze zakł.: Dr Plech i Dr Pelczar, Dr Steinhaus, p. 15. V—30. X.

Tryest, (u Słowian Terst) kąpielisko morskie, często wiatry Sirocco, Bora.

Tyflis, ces. ros. m. guseńialne, 440 m., liczne cieplice obojętne zaopatrujące łaźienki całego miasta.

Urawel, ces. ros. (gub. Tyfliska) 1583 m., zdroje alkaliczno żelaziste.

Vals, Francya (depart. Ardeche), 10 źródeł alkalicznych, do wód Vichy składem chemicznym bardzo zbliżonych, lubo zimniejszych, 13—16° C. mających, wywóz tych wód wielki, pobyt tańszy jak w Vichy.

Vevey, Szwajcarya, nad jeziorem genewskim, 380 m., st. klim. podalpejska, dobra na wiosnę i jesień, z wyjątkiem Lipca i Sierpnia, nieodpowiednia na zimę dla chorych płucowych, leczenia winogronowe pensjonat 7—15 franków dziennie od osoby.

Vichy, Francya, (depart. Allier), 236 m., najznakomitsze zdrojowisko francuskie, cieplice alkaliczne, zdroje: Grande Grille, Célestines, l'Hopital 12—44° C., wspaniałe balneotechniczne urządzenia, ogromny wyrób soli zdrojowej i pastylek, pobyt drogi, rozsyłka wód corocznie do 3 milionów flaszek. Właściwa pora zdrojowa 1. V—1. X, jednak zakład kąpielowy jest cały rok otwarty. Dr Biernawski.

Vöslau pod Wiedniem, cieplice obojętne 24° C., wielce

uczeszczane przez zamożnych mieszkańców Wiednia, przede-
wszystkiem płeć żeńska, tudzież leczenie winogronowe.

Warmbrunn, Szlask pruski, 325 m., cieplice obojętne 35—38°
C., urządzenia balneotechniczne dobre, p. zdr. 1. V—1. X.

Warnemünde, w ks. Meklemburg-Schwerin, kąpielisko mor-
skie, dobrze urządzone, ceny nader umiarkowane, p. zdr.
1b. VI—18. IX.

Warażdyn, zobacz Cieplice warażyńskie.

Wenecya, nad Adryatykiem, st. klim. zimowa, średnio ciepła,
wilgotna, wolna od kurzu i wichrów, słoneczna. Średnia zi-
mowa ciepłota o 1½ do 2° C., wyższa jak w Meranie lub
Montreux. Styczeń i luty są na pobyt najodpowiedniejsze.
Ujemną stronę stanowi niedobra woda do picia; jesienią są
tu dobre morskie kąpiele na Lido, pensjonat 7 do 10 fran-
ków dziennie od osoby.

Westerland, patrz Sylt.

Wiesbaden, Prusy, stolica ks. Nassauskiego, 117 m., cieplice
solankowe 50—65° C., nie tylko na kąpiele ale i do picia za-
stosowane, 900 gabinetów łaziennych, najlichniej uczęszczane
niemieckie uzdrowisko letnie i zimowe, urządzenia kąpielne
i na zimę, pensjonat od osoby miesięcznie od 100 mrk. i wy-
żej, leczenie winogronowe.

Wildbad, król. Wirtembergskie, 400 m., obojętne cieplice, 33
—37° C., używane na kąpiele i do picia, urządzenia balneo-
techniczne wyborne, pensjonat 10 do 15 marek dziennie od
osoby, p. k. 1 V—1. X.

Wildungen, ks. Waldeck, 228 m., szczawy ziemno-alkaliczne
i źródł. znakomity żelazisty, p. 1. V—1. X.

Wysowa, Galicya (powiat gorlicki) 525 m., od r. 1882 zakład
zdrojowy kąpielowy i żelazny, szczawy słono alkal. żelazi-
ste, 6 głównych źródeł. L. zakł. Dr Jarosz, p. 1. VI—1. X.

Zakopane, w Tatrach polskich, 838—1000 m., uzdrowisko le-
tnie i zimowe. od st. k. w Chabówce 5 godz., klimat alpejski,
pobyt zimowy dla piersiowych. Lecznica dla piersiowych w zi-
mie Dra Kruszyńskiego. Zakłady wodolecznicze Dra Chramca
i Dra Piaseckiego (cały rok otw.). Dom zdrowia Dra Chwistka.
Lekarze: Dr Buzdygan, Eljasz-Radzikowski, Hawranek, Jani-
szewski, Tyszkiewicz. Zakład kąpielowy Krzeptowskich, ką-
piele borow., kosodrzewinowe, wspólne kąpiele w zbiornikach,
wyrób tatrzańsk. wyciągu kosodrzewinowego, p. zimowy X—V.

Zaizon, Siedmiogród, 2 mile od Kronstadtu, 548 m., zdroje
alkal.-solno-jodowe.

Zoppot, patrz Copoty.

Zuckmantel, Szlask austr., zakład wodoleczniczy.

Zegiestów, Galicya, (pow. Sadecki), st. k., szczawy alkaliczno-
ziemno-żelaziste, tudzież rzeczne kąpiele w Popradzie. L.
zakł. Dr Hojnacki, p. 15. V—30. IX.

Żelenowodzk, w ces. ros. na Kaukazie, 12 wiorst od Pia-
tygorska a 18 wiorst od st. k. żel. Roztowowladykaukaskiej
„Mineralnaja woda”, 610 m., źródł. około 20 alkaliczno-że-
lezistych o ciepłocie 15° do 48° C., p. 25. V—15. IX.

Praktyczne wskazówki karmienia niemowląt.

I. Karmienie piersią

(mlekiem kobiecym t. j. matki lub mamki)
czyli t. zw. żywienie naturalne.

Mleko jest zawiesiną tłuszczu w cieczy zawierającej białko, cukier, sole. W mleku kobiecym znajdują się te składniki w następującym stosunku: 87.41 wody; 2.29 białka; 3.78 tłuszczu; 6.21 cukru; 0.31 soli. *Białko* (postaci mętu pyłkowego) zawarte w mleku jest w znacznej części sernikiem (kaseiną) obok tego są albuminy i hemialbumozy. Odsetek białka jest największy w pierwszych miesiącach karmienia, zmniejsza się w późniejszych miesiącach. Mleko brunetek zawiera więcej białka niż blondynek; dyeta mięsna podnosi odsetek białka. *Tłuszcz* mleka kobiecego znajdujący się w postaci mniejszych lub większych kuleczek (posiadających osłonkę) jest czystą mieszaniną tryglicerydów kwasu tłuszczowego. Ilość jego odsetkowa waha w rozległych granicach, średnio przyjmujemy 3.6. Ilość tłuszczu wzrasta się w późniejszych miesiącach karmienia — mleko kobiet młodszych jest bogatsze w tłuszcz niż starszych; więcej jest go wieczorem niż rano; nawet podczas samego aktu ssania zmienia się mleko: jest z początku chudsze i obfitsze w białko, później tłuszciesze a w białko uboższe. *Sole* mleka są potas, sól, wapń, magn, żelazo, fosfor. *Drobnoustrojów* mleko kobiety zdrowej nie zawiera.

Ponieważ jedynie żywienie mlekiem kobiecym a w pierwszym rzędzie mlekiem matki daje pewność odpowiedniego rozwoju dziecka dlatego z reguły *do tego dążyć należy aby wszystkie matki swoje dzieci karmiły*. Wyjątek stanowią ostre ogólne choroby matki (febr. puerp. typhus abdomin., pneumonia i t. d.) chociaż i w tych przypadkach przy łagodnym przebiegu tych chorób dziecko może być zatrzymane przy piersi. Powinna karmić swoje dziecko matka kłowa jeśli także dziecko jest wrodzoną kłwą dotknięte, natomiast nie powinna karmić dziecka matka dotknięta gruźlicą, o nienormalnym stanie psychicznym (histeria, morphinismus i t. d.) Mogą też stanowić przeciwwskazanie do karmienia pewne choroby sutek lub brodawek, jakoteż wady wrodzone rozwojowe dziecka.

Pierwiastki należy jeszcze w czasie ciąży do karmienia przygotowywać a to przez obmywanie piersi coraz zimniejszą wodą, nacieranie tychże. Płaskie brodawki należy wyciągać palcami lub przyrządami gumowymi, zakazać noszenia obcisłych sznurówek i t. d.

Kobieta karmiąca powinna przestrzegać higienicznego trybu życia unikać wzruszeń, nadmiernych ruchów (tańcu,

jazdy konnej) i t. d. dyeta nie powinna wiele odbiegać od dotychczasowego sposobu życia; wskazane są potrawy mleczne, dużo płynów; lekkie piwo; lekkie wino; unikać należy ostrych przypraw, kwaśnych sosów, alkoholów. Karmiącym nie podawać niekt. leków jak: kali jodat., acid salicyl., narkotyków i t. d. Brodawki należy po każdym ssaniu obmywać, w razie pękania brodawek używać kapturek, osłaniaaczy.

Wbrew panującym przesadom należy w prawidłowych stosunkach przystawić dziecko do piersi w 4—6 godzin po porodzie. Unika się w ten sposób zbytniego napełnienia sutków, noworodek nie odzwyczaja się od ruchów ssania i nie traci tyle na wadze, ileby tracił głodząc się w pierwszych dniach życia; pierwsze te karmienia mogą być krótkie, ilość wysanego pokarmu zwykle nie przekracza 20—30 gramów. Jakkolwiek w pierwszych dniach po porodzie mleko w gruczołach sutkowych zawarte (siara) znacznie różni się od późniejszego mleka to mimoto niesłusznem jest zapatrywanie o szkodliwości tego mleka, zbytecznem zatem a nawet szkodliwem podawanie środków przeczyszczających (zwykle olejku ryc.) w pierwszych dniach życia.

Już od samego początku należy baczyć na to, ażeby dziecko karmione było co 3 godziny a to dlatego, ażeby umożliwić antyseptyczne działanie kwasu solnego, który zjawia się jako wolny HCl., dopiero w końcu 2-giej godziny po przyjęciu pokarmu. Wprowadzona przed 3-ma godzinami świeża ilość pokarmu wiąże natychmiast wywiązujący się HCl. a uniemożliwiając przez to jego działanie antyseptyczne, doprowadza do rozkładu sernika, (następnie wzdęć, kolki i t. d.) Wyjątek z tego ogólnego prawidła uczynić można dla dzieci słabych niedonoszonych, które b. małe ilości mleka przyjmują i dlatego w pierwszych tygodniach mogą być karmione co 2 godziny.

10—15 minut wystarcza zupełnie dziecku zdrowemu aby wyssało odpowiednią ilość mleka, nigdy nie należy pozwalać na usypianie dziecka przy piersi.

Zwykle pozostawiamy niemowlę do 5—7 miesiąca (aż do wyklucia się pierwszych zębów) wyłącznie przy piersi, później podajemy obok piersi odpowiednio przyrządzone mleko krowie (patrz żywienie sztuczne) wreszcie kaszki, maczki, tak aby odstawienie nie zaskoczyło dziecka nieprzygotowanem. *Pełne odłączenie dziecka od piersi* następuje zwykle między 10—12 miesiącem, chociaż pod tym względem należy indywidualizować. Pamiętać jednak należy aby nie odstawiać dziecka odrazu t. j. nie przyuczywszy go poprzednio do mleka krowiego i innych pokarmów, aby nie odstawiać dziecka w letnich miesiącach (od maja do września), pod żadnym warunkiem nie odstawiać niemowle chore, zwłaszcza w razie choroby przewodu pokarmowego.

Natomiast należy dziecko *wcześniej odłączyć*, jeśli zauważymy u karmiącej szybki ubytek pokarmu a stratę na ciężarze ciała u dziecka; bezwarunkowo jeśli karmiąca zajdzie w ciążę, poroni. Pojawiająca się regularność nie jest bezwzględnem wskazaniem do odłączenia dziecka.

W razie gdy matka nie może karmić staramy się zastąpić ją kobietą (mamką), datą porodu do matki zbliżoną. Różnica 3-ch miesięczna jest w danym razie dopuszczalną; chętniej bierzemy mamkę z pokarmem trochę starszym niż odwrotnie. Dokładnem badaniem poczynawszy od skóry, włosów a skończywszy na częściach rodnych, pamiętając o możliwej obecności kily i gruźlicy, staramy się nabrać przekonania o zdrowiu mamki, wreszcie badamy sutki, brodawki i mleko. Piersi kobiety posiadającej obficie mleko nie wiotczeje nawet po ssaniu; przy ucisku strzyka mleko kilkoma promieniami — brodawki powinny na 1-2 cm. wystawać i łatwo dać się uchwycić. Ilość mleka oznaczyć można mierząc za pomocą pompki odciągnięty pokarm w ciągu doby; lub też ważąc dziecko przed i po ssaniu. Jakość mleka zbadać można osobnymi przyrządami; badania mleka na paznociu, lub przez wpuszczanie kropli do szklanki z wodą dać mogą tylko bardzo słabe pojęcie o jakości mleka. Pośrednio dać nam może pojęcie o tem stan dziecka kobiety badanej. — Badania dziecka nigdy też pomijać nie należy. Pod drobnowidem w mleku prawidłowem znajdujemy drobne kuleczki tłuszczowe; nie powinno w nim być dużych kul tłuszczu, ciał siarowych, ciałek krwi lub ropy. Sztucznie flaszka karmione dzieci nie chwytają piersi odrazu — kilkakrotnie jednak powtarzane próby przecież czasami doprowadzają do celu.

Jeśli matka karmić dziecka nie może a mamki dostarczyć nie jest w stanie uciekamy się do

II. karmienia sztucznego.

Celem naszym w tym razie jest naśladować naturę i podać dziecku pokarm zbliżony składem swoim i własnościami do mleka kobiety. Nadaje się do tego najlepiej mleko zwierząt, z praktycznych względów *mleko krowie*. Odmienny skład jednak tych dwu milk i możliwość zanieczyszczenia bakteriami mleka krowiego, które od chwili udoju aż do chwili spożycia uleść może zakażeniu, wskazują same na trudności w przeprowadzeniu sztucznego żywienia dzieci.

Cheąc uniknąć podania dziecku mleka zakażonego należy zachować pewne ostrożności przy dojeniu (odpowiednio urządzona obora, naczynia wyparzone i wysuszone i t. d.) mleko zaraz po udojeniu przegotować i trzymać w chłodzie. Jednorazowe przegotowanie (wrzenie przez 5—10 min.) niewyjaławia wprawdzie mleka poprzednio zakażonego powstrzymuje jednak rozwój drobnoustrojów i wystarcza w zupełności do celów sztucznego żywienia, jeśli tylko mleko po przegotowaniu trzymane będzie w chłodzie i pozostanie w tem samym naczyniu w którym się gotowało. Dłuższe gotowanie, czyni mleko mniej strawnem. Flaszka dla dziecka powinna być jak najprostsza, bez korka i węża gumowego, często wyparzana, ssawkami wprost na flaszkę nasadzanemi.

Doskonałe usługi oddaje przyrząd Soxhleta (Kraków apteka Wiszniewskiego), którego zasadą jest, że każda porcja mleka

przegotowaną jest w tej samej flasce, w której dziecko dostaje ją później do wypicia.

Trudniejszą do wyrównania jest różnica jaka zachodzi między mlekiem kobiecym a krowiem co do stosunku i jakości poszczególnych składników. Jeśli porównamy skład mleka krowiego z mlekiem kobiecym, przekonamy się że mleko krowie zawiera znacznie więcej białka (3·6) prawie tą samą ilość tłuszczu (3·78) i mniej cukru (4·8). Tych ilości białka (sernika) dziecko strawić nie może, rozcieńczamy więc niezbierane mleko wodą (w razie rozwolnień klejkiem) w stosunku 1:3, 1:2, 1:1, zależnie od wieku a niedostateczną ilość cukru uzupełniamy dodaniem cukru trzcinowego lub lepiej mlecznego. Jeśli w postępowaniu tem przestrzegać będziemy czystości, świeżości mleka i t. d. a zwłaszcza 3-godźinnego żywienia które tutaj tem ściślej powinno być wykonane, to uda nam się pewną część dzieci wychować. Znajdą się jednak i takie, które przy tym sposobie żywienia będą traciły na ciężarze, wystąpią objawy niestrawności i t. d. Pochodzi to ztąd że mleko rozcieńczone wodą jest chude, sprowadza więc zatwardzenia a ponieważ mniejsza jego wartość odżywcza wynagrodzona być musi ilością przyjmowanego pokarmu, wytwarza się więc u tych dzieci rozstrzeń żołądka, wzdęcia i t. d. W tych przypadkach należy do rozcieńczonego mleka niezbieranego dodawać śmietanki lub wprost mieszać śmietankę z wodą w stosunku 1:6 — 1:3.

Podane w ostatnich czasach t. zw. *mleko tłuste* prof. Gaertnera (wyrabiane w Krakowie i Lwowie przez mleczarnią E. Dobrzyńskiej) odpowiada stosunkiem poszczególnych składników mleku kobiecemu i oddaje dobre usługi w żywieniu niemowląt. W całym przeprowadzeniu sztucznego żywienia uwzględnioną być winna zasada indywidualizowania; miarą powodzenia dziecka przy stosowaniu tego lub owego sposobu jest kontrola ciężaru ciała za pomocą wagi.

Przestrzegana też musi być ilość podawanego pożywienia. I tak podaje się dziecku:

W wieku	w przerwach	Jednorazowo	
		gramów	łyżek stoł.
1 tygodnia	2½ — 3 godz.	30—50	czyli 2—3½
1 miesiąca	3 godzin	50—100	3½—7
2 miesięcy	3 "	100—150	7—10
3 "	3½ "	100—150	7—10
4 "	3½ "	150—200	10—13
5 "	3½ "	150—200	10—13
6 "	4 "	150—200	10—13
7—9 "	4 "	250	17

Jak już na początku zaznaczono do sztucznego żywienia jak do dokarmiania dzieci żywionych piersią użytym być powinno

tylko mleko, wszystkie sztuczne przetwory nie nadają się do tego celu tak ze względu na swój skład chemiczny, jak i wartość kaloryi. Z pod ogólnego tego pravidła wyjąćby można „sztuczną mieszankę śmietankową Biederta“ (künstliches Rahmgemenge nach Biedert), którą stosujemy w pewnych stanach chorobowych przewodu pokarmowego w przejściu od diety herbacianej do pożywienia mlekiem.

Mączkę Nestl'a, Kuffkego i t. d. podawać można obok mleka dzieciom powyżej 5 miesięcy mającym. Kleiki owsiane (przyrządzane z mąki owsianej,) polecamy w biegunkach.



Tabela wzrostu i przybierania na ciężarze zdrowego dziecka.

1. **Przeciętna długość** noworodka wynosi: chłopca 50 ctm. — dziewczynki 49 ctm. Dalszy wzrost ciała odbywa się według następującej tabeli:


Wiek dziecka	Przybytek	Przeciętna długość
	Ctm.	Ctm.
W 1 miesiącu	4	54
„ 2 „	3	57
„ 3 „	2	59
„ 4 „	1	60
Od 5 miesiąca aż do 1 roku	9	69
W 2 roku	9	78
„ 3 „	7	85
„ 4 „	6	91
„ 5 „	6	97
„ 6 „	6	103
„ 7 „	6	109
„ 8 „	6	115
„ 9 „	6	121
„ 10 „	6	127
„ 11 „	6	133
„ 12 „	6	139
„ 13 „	6	145
„ 14 „	6	151
„ 15 „	6	157

2. **Przeciętny ciężar** noworodka wynosi od 3200—3500 gr.

W pierwszych 4 dniach noworodek traci na ciężarze około $\frac{1}{14}$ — $\frac{1}{15}$ swego ciężaru (około 200 gr.). — Od 5 dnia przybiera tak, że w 8 dniu waży tyle, co w dniu pierwszym.


Od 9 dnia w odpowiednich warunkach przybiera według następującej tabeli:

Wiek dziecka		Dzienny przybytek wagi ciała	Miesięczny przybytek wagi ciała	CieŜar ciała
		Gramów	Gramów	Gramów
W	1 miesiącu	25—35	750	4000
"	2 "	23—32	700	4700
"	3 "	22—28	650	5350
"	4 "	20—22	600	5950
"	5 "	18	550	6500
"	6 "	17	500	7000
"	7 "	15	450	7450
"	8 "	13	400	7850
"	9 "	12	350	8200
"	10 "	10	300	8500
"	11 "	8	250	8750
"	1 roku . .	6	200	8950—9000
"	2 " . .	—	—	1100



Prawidłowe zębowanie.

Porządek, w jakim zęby wychodzą	Czas, w którym wychodzą
1 i 2 dolny ząb sieczny	6—9 miesiąc
1 i 2 górny ząb sieczny 3 i 4 górny ząb sieczny	9—12 miesiąc
1 i 2 ząb górny trzonowy 3 i 4 ząb dolny sieczny 1 i 2 ząb dolny trzonowy	12—15 miesiąc
1 i 2 górny kieł 1 i 2 dolny kieł	18—24 miesiąc
3 i 4 górny ząb trzonowy 3 i 4 dolny ząb trzonowy	30—36 miesiąc



UWAGI SĄDOWO-LEKARSKIE

przez

Prof. Dra Leona Wachholza.

I. O świadectwach lekarskich i sądowo-lekarskich.

Świadectwa lekarskie wydawane przez lekarza na żądanie osób prywatnych a nie władz muszą być opatrzone marką stemplową na 50 kr. Świadectwa stwierdzające przebytą ospę lub dokonane szczepienie ochronne tejże, również i świadectwa mające na celu usprawiedliwienie ucznia z jego nieobecności w szkole i t. d. lub z jego opóźnienia się w złożeniu egzaminu w należytym czasie, są wolne od stempla (rozp. z d. 29 Czerwca 1834, L. gub. 30736 i obwieszczenie gub. z d. 4 Grudnia 1894 L. 75852). Opinie lekarskie co do istnienia choroby umysłowej w celu umieszczenia umysłowo chorego w jednym z krajowych zakładów dla obłąkanych mogą wydawać c. k. lekarze powiatowi i fizycy miast Lwowa i Krakowa (wolne od stempla).

Świadectwa sądowo-lekarskie czyli tak zwane visa et reperta, podlegają jako wydawane osobom prywatnym odstępowaniu marką na 50 kr. Forma ich odpowiada w zupełności formie protokołu oględzin sądowo-lekarskich.

Świadectwo sądowo-lekarskie składa się pod względem formy z trzech części: pierwsza powinna zawierać imię, nazwisko, wiek, stan, miejsce zamieszkania osoby badanej, wreszcie i miejsce, w którym lekarz ją bada. Po tym wstępie następują krótkie a możliwie dokładne wywiady co do istoty zajścia objawów podmiotowych i co do osób, które w niem czynny udział brały. Jeżeli osoba poddana badaniu jest nieletnią, nieprzytomną lub dotkniętą chorobą umysłową, zasięga się wywiadów od osób ją otaczających.

Drugą część stanowi wynik przedmiotowego badania i część tę dzieli się wedle potrzeby na oznaczone liczbami porządkowymi ustępy a to w tym celu, aby się można na nie w orzeczeniu powołać. W części tej zwraca się uwagę na wszelkie szczegóły, podobnie jak w zwykłym badaniu klinicznym, zaczynając od uwag co do ogólnego odżywienia i budowy ciała osoby badanej, co do stanu ciepłoty ciała, tętna, wrodzonych lub nabytych zboczeń, wreszcie co do chwilowych stanów z resztą fizyologicznych, jak np. ciąży. Po tych uwagach następuje opis ściśle przedmiotowy, zrozumiały nawet dla nielekarza, tyczący się znalezionych śladów uszkodzeń cielesnych lub innych za-

burzeń. W opisie tym należy unikać zwrotów, stanowiących raczej rozpoznanie jak wierny opis stanu, w jakim badany się znajdował w chwili badania. Jeżeli badanie przedmiotowe nie stwierdza zmian anatomicznych dla objawów podmiotowo uczuwanych przez badanego, należy w miejscu odpowiednim podnieść ujemny wynik badania przedmiotowego.

Trzecią i ostatnią częścią świadectwa jest orzeczenie, które stanowi właściwe rozpoznanie zaburzeń w protokole opisanych, jakoteż i ocenę ich sądowo-lekarską. Ocenę sądowo-lekarską uszkodzeń ciała podaje się na podstawie znajomości odnośnych paragrafów obecnego kod. karn., stosując się nadto do wymagań §. 132 ust. o postępowaniu karnem z dnia 23 Maja 1873: „znawcy mają wyrzec w szczególności, które ze znalezionych obrażeń ciała lub nadwyrężeń zdrowia same przez się lub w związku z innemi bezwzględnie albo ze względu na szczególne okoliczności przypadku, należy uważać za lekkie, ciężkie lub dla życia niebezpieczne; jakie skutki uszkodzenia takie zwykle za sobą pociągają i jakie w obecnym przypadku szczególnym ztąd nastąpiły, tudzież jakimi środkami albo narządami i w jaki sposób takowe zadane były“.

Świadectwo sądowo-lekarskie.

Stempel
50 et.

Mar yanna R. lat 23, żona rolnika z Mogiły podaje, iż ją dnia 4 lutego b. r. pobili Jan B. i Magdalena jego żona z Mogiły kołkiem z płotu i ręką.

Badanie z dnia dzisiejszego wykazuje:

1) Kobieta wzrostu średniego, prawidłowej budowy, dość dobrze odżywiona, nieokazująca ogólnych objawów chorobowych.

2) Na twarzy, a mianowicie na grzbiecie nosa dwa otarcia przyskórka, wielkości ziarna grochu, podobne zdrapanie na górnej wardze po stronie prawej i tuż koło kąta ust prawego. wreszcie smugowate zdrapanie w środku brody, wszystkie strupkiem zaschłej krwi pokryte.

3) na grzbiecie, wzdłuż całej prawej prawej łopatki, smugowate zasinienie.

4) Kończyna górna prawa przedstawia się o kilka-ctm. krótszą w porównaniu z kończyną górną lewą; badana, kończyną tą nie może poruszać, a przy usiłowaniu ruchów biernych ramieniem, doznaje mocnego bólu. Ramię prawe okazuje się prawie w połowie swej długości obrzmiałe, zasiniałe i kątowato zgięte. Kąt zgięcia tego zwrócony jest rozwartością swą ku wewnątrz. Przy badaniu dotykkiem czuje się w miejscu tego zgięcia trzeszczenie i wyraźną nieprawidłową ruchomość kości badanie to sprawia dotkliwy ból.

5) Zresztą na ciele nie ma innych śladów obrażeń

O R Z E C Z E N I E.

1) Obrażenie opisane pod l. 4 przedstawia się jako złamanie kości ramieniowej prawej prawie w połowie trzonu tejże i stanowi, uszkodzenie ciała ciężkie połączone z upośledzeniem zdrowia i niezdolnością do pracy, która trwa zwykle w tych przypadkach przez więcej, jak dni 30. Okoliczności tej czy upośledzenia zdrowia potrwa w danym przypadku przez więcej jak 30 dni, na razie stanowczo rozstrzygnąć nie można. Rozstrzygnięcie to będzie możliwem dopiero po zdjeciu opatrunku ustalającego.

2) Obrażenia opisane pod l. 2 i 3 stanowią uszkodzenia ciała lekkie tak razem wzięte, jak i każde z osobna, połączone z upośledzeniem zdrowia około 7 dni trwajacem.

3) Złamanie kości ramieniowej mogło być następstwem uderzenia ciałem twardem, tępem, ciężkiem, z siłą użytą np. kołem z płotu, otarcia przyskórke na twarzy były zadane najpodobniej do prawdy paznokciami palców.

Co niniejszem, jako zgodne z zasadami nauki lekarskiej, do wiadomości c. k. Sądu podaję.

Dr X. X.

Kraków, d. . . 1894.

U W A G I

o oględzinach i seceyi sądowej zwłok.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1855 r. Nr. 26 dz. u. p. zamieszcza dokładne przepisy, odnoszące się do sposobu wykonania oględzin i seceyi sądowej zwłok (*vide* Zbiór ustaw Dra Olpińskiego lub Podręcznik ustawy o postępowaniu karnem w przekładzie prof. Dra Bojarskiego). Oględzin i seceyi zwłok dokonują dwaj lekarze zazwyczaj w ten sposób, iż jeden (młodszy) wykonywa seceyę, drugi starszy dyktuje protokół seceyi.

Gdy jednak jasno jest zrozumiałem, iż obducent lepiej ze stanu znalezionego w zwłokach zdaje sobie sprawę, przeto właściwszem i więcej wskazanem jest, aby obducent sam protokół w miarę postępu seceyi dyktował. Protokół seceyi winien być wiernym odbiciem znalezionego stanu rzeczy i winien zawierać opis wszelkich czynności obducenta skierowanych ku możliwie ściśłemu wywiązaniu się z zadania swego. Protokół powinien być podany w formie zwięzłej, łatwo nawet dla nielekarza zrozumiałej; stanowić ma on wierny opis stanu narządów zwłok, nigdy zaś gotowego rozpoznania. Protokół składa się z 3 części: 1) z nagłówka; 2) z opisu oględzin zewnętrznych; 3) z opisu oględzin wewnętrznych.

W przypadkach, w których zależy na stwierdzeniu tożsamości osoby, należy oględziny zewnętrzne ciała poprzedzić dokładnym a systematycznym opisem odzieży, w jaką zwłoki są przybrane.

W przybliżeniu można podać następujący szemat dla sekcji:

A. Ogłędziny zewnętrzne.

1) Zwłoki — płeć (mężczyzny... kobiety... dziecka płci...), wiek, długość ciała, odżywienie, budowa (zboczenia w budowie).

2) Zmiany pośmiertne tj. stężenie pośmiertne utrzymuje się (lub nie) w kończynach górnych... dolnych; plamy pośmiertne... ich umiejscowienie... rozległość... barwa nacięciem stwierdzona.

3) Zabarwienie powłok (zielone ze zgnilizny i t. d.)

4) W razie stwierdzenia tożsamości zwłok; włosy głowy, ich długość, zabarwienie, inne właściwości, włosy zarostu twarzy... kolor tęczyówek, opis twarzy i reszty ciała, szczególnych znaków i t. d. np. na rękach jako dowód zatrudnienia.

5) Zachowanie się żreń (rozszerzone, zwężone, równomiernie lub nie), spojówki (obecność wynaczynioneń), naturalne otwory jam ciała jak otwory uszne, nosowe, ust, pochwy i odbytu zawierają ciała obce... treść... lub nie. Z otworów... czuć woń podobną do... W jamie ust... język... zęby. Części płciowe zewnętrzne...

6) Opis uszkodzeń, blizn znalezionych (każde uszkodzenie z osobna oznaczać literami porządkowymi a, b, c, i t. d.)

7) Oprócz wyżej opisanych śladów uszkodzenia, innych się nie spotyka.

B. Ogłędziny wewnętrzne.

(Sekcję należy wykonać w zwykłym anatomicznym porządku nawet w przypadkach otruc bez względu na odmienny dla tych ostatnich istniejący regulamin pruski z dnia 6 stycznia 1875 r.)

8) Powłoki czaszkowe po stronie wewnętrznej okazują... sklepienie czaszki budowa jego... grubość kości... okazuje... Opona twarda... zatoki żyłne zawierają krew płynną... skrzepę... Opony miękkie okazują... pod niemi... zwoje mózgowe powierzchowne... Mózg zbitości... na rozkroju... zawartość krwi... komórki... ich rozmiary... zawartość... wyściółka ich... spłoty naczyńiowe... zwoje mózgu podstawowe... mózdzek... most Varola... rdzeń przedłużony... naczynia na podstawie mózgu... ich grubość... zawartość... Podstawa czaszki po oddzieleniu opony twardej okazuje... Jamy bębenkowe (w razie potrzeby) zawierają...

9) Krtani i tchawica z przodu in situ rozcięta zawiera... Mięśnie szyi... naczynia wielkie szyi... gruczoł tarczowy... język i gardło... nagłośnia... wewnątrz krtani... przełyk... gardziel w górnej części...

10) Mięśnie klatki piersiowej i brzucha... rozwinięte... stan przepony do brzegu żebra... po stronie prawej... po lewej...

11) Ułożenie trzew w klatce piersiowej... worki opłucnowe zawierają... płuca wolne lub przyrośnięte... opłucne płuc... pod niemi... miąższ płuc powietrzny lub nie (w których częściach)... na rozkroju płuco prawe... wejście rozkroju... zbi-

tość... dobywa się treść... za uciskiem... z przeciętych oskrzeli... płuco lewe... opłucne ścienne... gruczoły przyoskrzelowe...

12) Worek osierdziowy wolny... zrośnięty z... zawiera... serce wielkości... pod osierdziem... przebieg naczyń wieńcowych (prosty lub kręty)... komórka lewa zawiera... zastawka dwudzielna... przedsionek lewy... komórka i przedsionek prawy... zastawka trójdzielna... mięsień sercowy... jego grubość... zabarwienie... zbitość... nitki ścięgniste... mięśnie brodawkowe na rozkroju... tętnica płucna zawiera... zastawki jej... aorta wstępująca zawiera... błona wewnętrzna jej ściany... zastawki jej... ujścia tętnic wieńcowych i ich drożność... Tchawica i oskrzela z tyłu rozcięta w całej długości okazują... dolna część gardziela.

13) Ułożenie trzew w jamie brzusznej... zawartość worka otrzewnowego... otrzewna jelit... ścięgna... krezka... gruczoły krezkowe...

14) Wątroba wielkości... brzegi jej... powierzchnia... jej torebka... na rozkroju... powierzchnia... zbitość... zawartość krwi... zabarwienie... woreczek żółciowy... żółć... przewód żółciowy...

15) Śledziona, wielkość... torebka... na rozkroju... zbitość... ilość krwi...

16) Nerka prawa i lewa wielkość... torebki... powierzchnia nerek po złuszczeniu torebek... na rozkroju rysunek... istota korowa... piramidy... miedniczki... moczowody...

17) Pęcherz moczowy zawiera... barwa moczu... (w przypadkach otruc wypuścić czystym cewnikiem mocz do czystego naczynia i przechować)... błona śluzowa pęcherza...

18) Pęcherzyki nasienne... jajniki... macica... jej wielkość... część pochwową... ujście zewnętrzne... jama macicy... zawiera... pochwa...

19) Żołądek (w przypadkach otrucia podwiązać u wpustu odźwiernika i otworzyć nad naczyniem) ściana zewnętrzna żołądka... zawartość żołądka... jakość treści... oddziaływanie błona śluzowa...

20) Dwunastnica zawiera... jej błona śluzowa...

21) Trzustka... na rozkroju...

22) Jelita cienkie... treść... błona śluzowa...

23) Jelita grube...

24) Gruczoły zaotrzewnowe...

25) Aorta zstępująca piersiowa... brzuszna...

26) Po wyjęciu trzew okazują żebra... kręgosłup... kości miednicy... kości kończyn...

27) (W razie potrzeby). Po otwarciu jamy kręgowej okazuje rdzeń... jego opony...

W przypadkach sekcyi zwłok noworodków należy w oględzinach zewnętrznych podać cechy odnoszące się do okoliczności, czy dziecko jest donoszonym lub nie, a więc: 1) długość zwłok (długość podana w ctm. podzielona przez 5 wyraża miesiąc życia płodowego w drugiej połowie ciąży). 2) Obwód główki, wymiary: prosty, skośny, wielki, dwuciemieniowy, dwuskroniowy, szerokość barków, miednicy, rozmiary ciemienia.

3) stan włosów główki, obecność meszku, stan chrząstek nosa i małżowin usznych, stan paznogi, jąder w mosznach (u płodów męskich) rozwój podściółki tłuszczowej, stan jąder kostnych w dolnej nasadzie kości udowej i ich rozmiar.

Nadto podaje się cechy, po których poznaje się noworodka: a więc: 1) obecność krwi i mazidła skórniego na powłokach ciała; 2) stan pępownicy, oba jej końce; 3) stan przedgłowia; 4) obecność smółki. Celem wyjaśnienia pytania z § 130 p. k. czy dziecko urodziło się żywym należy wykonać tak zwane próby życia tj. próbę hydrodrastyczną Schreiera i żołądkowo-jelitową Breslaua.

Po ukończeniu sekcji mają obducenci wydać swe zdanie, czyli orzeczenie w sposób ogólny bez motywów tj. bez powoływania się na odnośne ustępy protokołu. O ile protokół przedstawiał tylko opis przedmiotowego stanu sekcya stwierdzonego, o tyle orzeczenie stanowi podmiotowy sąd obducentów. Orzeczenie powinno być odpowiedzią na pytania objęte § 129 ustawy o postępowaniu karnem, a więc powinno mieścić objaśnienie co w danym przypadku było bezpośrednią (najbliższą) przyczyną śmierci i co tę wywołało. Jeśli przyczyny śmierci sekcya nie dostarczyła, należy to wyraźnie w orzeczeniu zaznaczyć. W przypadkach powikłanych, w których nadto zachodzi potrzeba dokonania dalszych badań np. spektralnych, mikroskopowych itd. lub w których ważnem dla orzeczenia stają się pewne wskazówki przez śledztwo uzyskać się mające, ograniczyć się należy tylko do tymczasowego orzeczenia, zastrzegając sobie na później orzeczenie dokładne i motywowane.

W każdym orzeczeniu należy po wyjaśnieniu przyczyny śmierci podać, czy ona była wynikiem własnej winy denata, przypadku czy też czynnego udziału drugiej osoby. Jeśli na zwłokach stwierdza się obrażenia, wówczas należy podać w orzeczeniu, czy one powstały za życia, czy też po śmierci, następnie czy je zadała druga osoba; w tym ostatnim razie, należy odpowiedzieć na pytania (§ 129 p. k.): „1) czy czyn ten drugiej osoby spowodował śmierć a) już ze swej natury w ogólności, b) lub z powodu właściwego osobistego usposobienia lub z powodu szczególnego stanu obrażonego; c) z powodu okoliczności przypadkowych, wśród których czyn spełniono; albo d) z powodu przyczyn, które przypadkiem nastąpiły, lub czynem samym były wywołane lub z niego wynikły i czy e) śmierci można było zapobiedz wczesną i stosowną pomocą lekarską.“

UWAGA. Na mocy § 359 u. k. jest obowiązany każdy lekarz uczynić doniesienie w przypadkach zbrodni, a doniesienie to podobnie jak i załączone doń świadectwa lekarskie, mające stanowić dowód i poparcie doniesienia, są wolne od stempla.



Warunki przyjmowania chorych obłąkanych do zakładów publicznych lub prywatnych.

Według §. 273 ust. cyw. za obłąkanego lub głupkowatego ten tylko uznany być może, który za takiego sądownie, po dokładnem zbadaniu zachowania się jego przez wyznaczonych do tego przez sąd lekarzy, uznanym zostanie. W przypadku takim postanowienie sądu do publicznej wiadomości podane być powinno. Sąd w tym razie ustanawia kuratora (§. 269).

Zakłady dla obłąkanych są prywatne albo publiczne. Do prywatnych, zakładanych jedynie za pozwoleniem politycznej władzy krajowej, przyjmowani być mogą chorzy, tylko na podstawie świadectwa lekarskiego, potwierdzającego istniejącą chorobę umysłową. Świadectwo to musi być wystawione przez lekarza powiatowego lub gminnego miejsca pobytu chorego, lub gdyby przez innego lekarza było wystawione, musi być potwierdzone przez lekarza powiatowego lub gminnego i wygotowane najpóźniej w 14 dniu przed wniesieniem prośby o przyjęcie. Jeżeli chory był poprzednio w kuracji lekarskiej, dodaną być musi historia choroby, skreślona przez lekarza ordynującego, Chorzy, których władza bezpieczeństwa z powodu zagrażającego ogółowi bezpieczeństwa do zakładu prywatnego oddać jest zniewolona, mają być przyjęci na podstawie świadectwa wystawionego przez lekarza, którym ta władza rozporządza. Lekarz kierujący zakładem ma o przyjęciu chorego w przeciągu 24 godzin donieść trybunałowi pierwszej instancji, w którego okręgu zakład się znajduje, z prośbą o potwierdzenie odbioru doniesienia. Doniesienie to wtedy tylko ma być zaniechane, jeżeli nie ma wątpliwości, że chory jeszcze pozostaje pod władzą ojcowską. Jeżeli taki chory podczas pobytu w zakładzie dojdzie do 24 roku życia, należy o tem, wyszczególniając stosunki jego osobiste, donieść trybunałowi pierwszej instancji. Tożsamo ma nastąpić, jeżeli zajdą okoliczności, które pociągają za sobą zmianę osoby prawnego zastępcy, a sąd opiekuńczy lub kuratelarny zwołując o tych okolicznościach nie wie. Osoby umieszczone w prywatnych zakładach dla obłąkanych, które uważać należy za wyleczone, mają być z zakładu wypuszczone, po porozumieniu z temi osobami, które prosiły o przyjęcie chorego do zakładu, albo w miejsce tychże pieczę nad chorym przyjęty. Także chorzy nieuleczalni nie mogą być w zakładzie dłużej zatrzymywani, jeżeli ich wypuszczenia żądają krewni, lub ich prawni zastępcy. Chorzy niewyleczalni mogą być oddani tylko swym prawnym zastępcom, lub osobom przez tychże wskazanym. Jeżeli z zakładu będą wypuszczone osoby, które władza bezpieczeństwa oddała z powodu grożącego ogółowi niebezpieczeństwa, poprzednio o wypuszczeniu tę władzę należy zawiadomić. Taksamo należy postąpić w razie uwolnie-

nia osób takich na próbę. O wypuszczeniu chorych wyleczonych zostających pod kuratelą należy odnośny sąd zawiadomić.

Zakłady publiczne dla obłąkanych rządzą się własnymi statutami, które muszą być potwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych. Zakłady publiczne dla obłąkanych mają czynić doniesienia wyżej wymienione do tychże władz sądowych. Gminy a w szczególności ich organa lekarskie są obowiązane utrzymywać w naocznosci tych obłąkanych, którzy nie są umieszczeni w domach obłąkanych i czuwać nad pielegnowaniem tychże. Chorych na umyśle, którzy nie pozostają pod władzą ojcowską lub opiekunczą, mają gminy w celu dalszego zarządzenia wskazać temu trybunałowi, do którego okręgu są wcielone. Władze sądowe są obowiązane o ustanowieniu opiekuna i kuratorów dla umysłowo chorych, znajdujących się w zakładach dla obłąkanych zawiadomić te zakłady. (Dz. d. p. z. r. 1874. L. 71).

Przyjmowanie do Kulparkowa i wydalenie. (Tożsamo stosuje się i do Szpitala św. Łazarza w Krakowie), Chorych przyjmuje do zakładu dyrektor na żądanie stron lub władz bezpieczeństwa. Aby chory mógł być przyjęty, należy dyrektorowi przedłożyć: Świadectwo władzy miejscowej z wymienieniem stosunków rodzinnych i majątkowych chorego a także historią choroby, sporządzoną przez lekarza i poświadczoną przez fizyka powiatowego. Jeżeli oddaje władza bezpieczeństwa, to powinna wymienić fakty. Jeżeli chory ma leczyć się własnym kosztem, to należy jeszcze dołączyć pisemne zobowiązanie tej osoby, która ma spłatę uiszczać. Chorzy winni być oddani do zakładu należyście odziani.

Dyrektor zakładu do 24 godzin powinien donieść o przyjęciu chorego trybunałowi pierwszej instancji.

O zamierzonym wydaleniu chorych wyleczonych, lub nieuleczalnych nie zagrażających publicznemu bezpieczeństwu lub obyczajności i o terminie wydalenia, powinien dyrektor zakładu zawiadomić rodzinę lub prawnego zastępcę, urząd gminny, do której chory jest przynależny, władzę opiekunczą, jeżeli pod tą władzą zostaje i władzę bezpieczeństwa, jeżeli ona oddała chorego do zakładu ze względów policyjnych.

Przy odbieraniu chorego niewyleczonego, odbierający powinien złożyć dyrektorowi: przyzwolenie władzy opiekunczej, przyzwolenie gminy, w której chory ma mieszkać i pisemne zobowiązanie się do dalszego pielegnowania chorego. (Dz. u. k. 1876. 15 Lutego. Nr 6).



Ustawa z dnia 22 grudnia 1891 roku o zaprowadzeniu Izb lekarskich.

Za zgodą obu Izb Rady państwa postanawiam co następuje:

§. 1. W królestwach i krajach w Radzie państwa reprezentowanych zaprowadzają się „Izby lekarskie“ do reprezentowania stanu lekarskiego.

Ilość okręgów Izb lekarskich i siedziba każdej z nich ustanowiona będzie drogą rozporządzenia.

§. 2. Każdy lekarz do wykonywania praktyki lekarskiej uprawniony, z wyjątkiem osób w §. 15 wzwiankowanych, o ile wyraźnie nie zrzecze się wykonywania praktyki, podlega postanowieniom ustawy niniejszej, winien zgłosić się do Izby lekarskiej, w której okręgu ma stałą siedzibę, uwiadamiać ją o zmianie mieszkania w przeciągu dni 14 i czynić zadość wymaganiom z uprawnień Izby wynikającym.

Lekarze, którzy w celach praktyki lekarskiej przenoszą się na czas dłuższy poza okrąg swojej Izby (lekarze zdrojowi itp.) winni uwiadomić o tem tak swoją Izbę, jak i tę, do której okręgu się udają.

§. 3. Izby lekarskie powołane są do naradzania się nad wszystkimi sprawami dotyczącymi się wspólnych interesów stanu lekarskiego, zadań i celów, jakoteż godności i powagi powołania lekarskiego, rozwoju pieczy o zdrowie i urządzeń zdrowotnych, o ile w tym względzie lekarze są do współdziałania powołani, i do wydawania uchwał w tych sprawach; nadto do znoszenia się w swoich sprawach z lekarzami w okręgu Izby, jakoteż z innemi Izbami lekarskimi i do przedstawienia podań Władzom swego okręgu reprezentacyjnego, a wniosków i życzeń za pośrednictwem przełożonej Władzy administracyjnej krajowej, c. k. Rządowi.

§. 4. Izby lekarskie obowiązane są w sprawach dotyczących się ich zakresu działania dawać na wezwanie władz wyjaśnienia i opinie, Wspierać Władze w urządzaniu stosunków zdrowotnych a w szczególności co się tyczy powszechnej dostępności i pomocy lekarskiej i odpowiedniego rozmieszczenia lekarzy.

Nawzajem Władze winny w stosownych okolicznościach nastroczać im sposobność do dawania opinii i wyjaśnień w sprawach pertraktowanych a należących do zakresu działania Izb lekarskich.

Do rozpraw toczących się w krajowej radzie zdrowia nad kwestyami zasadniczemi, wchodzącemi w zakres działania Izb lekarskich, przyzywani być mają delegaci przez te Izby wybrani w przymiocie członków nadzwyczajnych.

Do tego celu Izby lekarskie wybrać mają i Władzy administracyjnej krajowej z dołączeniem protokołu wyborczego wyznaczyć, w tych obszarach administracyjnych, w których istnieje jedna Izba lekarska, dwóch delegatów i dwóch zastępców; w tych zaś, w których jest więcej Izb lekarskich, każda jednego delegata i jednego zastępcę.

§. 5. Każda Izba lekarska składa się najmniej z 9-ciu członków, których wybierają lekarze przez nich reprezentowani.

Dla każdego członka Izby wybrać należy także zastępcę. Celem dokonania wyborów dzieli się obszar reprezentacyjny Izby lekarskiej na odpowiednią ilość grup wyborczych, z których każda obejmować ma lekarzy jednego lub kilku okręgów administracyjnych, a według okoliczności powiatów sądowych lub dzielnic miejskich, w taki sposób, żeby z uwzględnieniem jednakowych stosunków każda grupa zawierała mniej więcej taką samą ilość wyborców.

Lekarze każdej grupy wyborczej wybierają po jednym członku Izby lekarskiej i po jednym zastępcy, a to przez nadsyłanie głosów na kartkach podpisem wyborcy opatrzonych, do właściwej władzy administracyjnej powiatowej, która w dokonaniu wyborów pośredniczy i zebrane kartki z głosami przedstawi Władzy administracyjnej krajowej.

Za pierwszym razem też Władza ogłosi wynik wyborów i zarządzi co potrzeba, żeby się Izba lekarska ukonstytuowała, w przyszłości czynić to będzie prezes Izby.

Prawo wyboru i wybieralności służy każdemu lekarzowi, w myli §. 2 postanowieniom ustawy podlegającemu, który ma stałą siedzibę w odnośnym okręgu lub obszarze grupy, a nie jest od prawa wyboru wyłączony.

§. 6. Od prawa wyboru i wybieralności wyłączeni są:

1. Wszyscy członkowie, którzy według istniejących ustaw wyłączeni są od wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego w gminie;
2. Ci, których Izba lekarska uzna za pozbawionych prawa wyborczego czynnego i biernego, lub którym jej Sąd honorowy wytoczył śledztwo.

§. 7. Wybory rozpisuje w gazecie urzędowej c. k. Władza krajowa, ustanawiając zarazem dzień wyborów.

Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali najwięcej głosów ważnie oddanych.

W razie równości głosów rozstrzyga los.

§. 8. Wyborów nie wolno nie przyjąć bez ważnych powodów i takowe służą na trzy lata, wybrani jednak obowiązani są także po upływie tego czasu sprawować czynności aż do objęcia tychże przez nowo wybranych, na ich miejsca wstępujących.

Funkcyonaryusze ustępujący mogą być wybrani ponownie, ale nie są obowiązani przyjąć wybór na bieżący peryod wyborczy. Także lekarze więcej jak 60 lat liczący, mogą odmówić przyjęcia wyboru.

Co do dopuszczalności innych przyczyn do odmówienia przyjęcia wyboru orzeka prezydium Izby, które osobę, odmawiającą uporeczywie bez słusznych przyczyn przyjęcia wyboru, może skazać na utratę prawa wyborczego.

§. 9. Naczelnik Władzy administracyjnej krajowej wyznacza dzień i godzinę ukonstytuowania się Izby nowo wybranej i mianuje komisarza rządowego, za pośrednictwem którego ukonstytuowanie się Izby ma nastąpić.

Izba wybiera ze swego grona na trzyletni okres wyborczy prezydium Izby, składające się z prezesa Izby, jego zastępcy i najmniej trzech a najwięcej siedmiu członków prezydium. Izba lekarska ma prawo wybierania i uchwalania, gdy członków obecnych jest więcej niż połowa. W razie niemożności uczestniczenia w zgromadzeniu, członek Izby obowiązany jest usprawiedliwić nieobecność swoją przed prezesem Izby, który następnie powołać ma jego zastępcę.

§. 10. Prezes a w jego nieobecności jego zastępca reprezentują Izbę na zewnątrz, pośredniczy w znoszeniu się prezydium Izby z Izbą lekarską, wyznacza członkom prezydium zakres działania i czuwa nad tem, żeby sprawowali czynności prawidłowo: zwołuje posiedzenia prezydium Izby, zgromadzenia Izby lekarskiej i lekarzy, prezyduje na nich i wykonywa ich uchwały.

§. 11. Prezydium załatwia pod kierunkiem prezesa sprawy bieżące, ma staranie o utrzymanie w ewidencji lekarzy w jego okręgu zamieszkających i tych, którzy tam dla praktykowania przebywają, pośredniczy w znoszeniu się z Władzami, z innemi Izbami lekarskimi, jakoteż z członkami Izby i zawiaduje środkami i instytucjami, służącemi do reprezentowania stanu lekarskiego. Obowiązane jest przedstawiać Izbie lekarskiej regularnie co rok na walnem zgromadzeniu sprawozdanie rachunkowe, zwoływać takowe w razie potrzeby, jakoteż na żądanie połowy członków Izby i wykonywać potrzebne prace przygotowawcze.

Urząd członków prezydium Izby lekarskiej jest honorowy.

Okres ich urzędowania trwa dopóty, dopóki się następna Izba lekarska, a względnie następne prezydium Izby nie ukonstytuuje.

Zgromadzenie prezydium Izby ma prawo wydawania uchwał co do interesów Izby, gdy więcej niż połowa członków prezydium jest obecna.

Z członków prezydium Izby najmniej połowa powinna mieszkać stale w siedzibie Izby lub w pobliżu.

§. 12. Prezydium Izby urzęduje zarazem jako Rada honorowa w przypadkach osobistych sporów, zażaleń i skarg lekarzy w Izbie reprezentowanych między sobą lub przeciw sobie we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji przynależnych Władz.

Obowiązkiem jego jako Rady honorowej jest także pośredniczenie w razie pomyłek i sporów pomiędzy lekarzami okręgu, tyczących się sprawowania zawodu.

Lekarze obowiązani są przed udaniem się na drogę zażalenia, prosić Izbę o pośrednictwo.

Prezydium Izby może wydawać uchwały, jako Rada honorowa, przy obecności najmniej trzech czwartych części członków i większością dwóch trzecich części członków obecnych.

Przeciw lekarzom w Izbie reprezentowanym, którzyby swoim zachowaniem się wykroczyli przeciw godności stanu lekarskiego lub uchybili obowiązkom swoim jako członkowie Izby

lekarskiej, Rada honorowa ma prawo po stwierdzeniu istoty czynu przez prawidłowe zbadanie rzeczy, uchylać upomnienia, ostrzeżenia, w ponownych przypadkach nagany, a w razie znacznych uchybień naznaczyć według przepisów regulaminu kary porządkowe, to jest grzywny aż do 200 złr., nakoniec odbierać na pewien czas lub trwale prawo wyboru i wybieralności do Izby.

Przed wydaniem wyroku dać należy obwinionym sposobność do usprawiedliwienia się i nadto służy im prawo odwołania się przeciw udzieleniu nagany, skazania na karę pieniężną lub odebrania prawa wyborczego do Władzy administracyjnej krajowej, która orzeka ostatecznie.

Zapłacone grzywny wpływają do kasy Izby lekarskiej.

§. 13. Izbie lekarskiej zastrzeżone jest uchwalenie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu Ministra spraw wewnętrznych, jakoteż wydawanie na podstawie tegoż regulaminu uchwał co do interesów zasadniczych, co do środków, które użyte być mają dla osiągnięcia celów i wykonania zadań Izby mianowicie co się tyczy pielęgnowania wzajemności w niesieniu pomocy współtowarzyszom zawodowym i ich rodzinom, tudzież co się tyczy pokrywania potrzeb Izby lekarskiej i wymierzania opłat od lekarzy reprezentowanych w Izbach lekarskich.

Do Izby lekarskiej należy sprawdzanie aktów dotyczących się wyboru jej członków, sprawdzanie rocznego sprawozdania rachunkowego prezydium Izby, kontrola nad jego administracją, tudzież wybór delegatów i ich zastępców do krajowej Rady zdrowia, jakoteż uchwalanie zwołania walnego zgromadzenia lekarzy, których Izba reprezentuje.

§. 14. Nadzór zwierzchniczy nad Izbą lekarską i jej działaniem sprawuje Władza administracyjna krajowa. Gdyby Izba przekroczyła zakres swego działania lub postąpiła sobie w sposób niezgodny z ustawami i przepisami, Władza ta ma prawo nalegać, żeby nieprawidłowości zostały uchylone, a w razie potrzeby zarządzić rozwiązanie Izby i rozpisanie nowych wyborów.

Izbie lekarskiej służy prawo odwołania się przeciw rozwiązaniu do Ministerstwa spraw wewnętrznych, atoli bez skutku odwołczego.

§. 15. Ustawa niniejsza nie stosuje się do lekarzy wojskowych w czynnej służbie zostających, ani też do lekarzy na posadach przy Władzach administracyjnych rządowych.


§. 16. Upoważnia się Ministra spraw wewnętrznych do wydania w obrębie powyższemi zasadniczemi postanowieniami określonym dalszych potrzebnych rozporządzeń.

§. 17. Wykonanie ustawy niniejszej poruczam Mojemu Ministrowi spraw wewnętrznych.

Wiedeń, dnia 22 grudnia 1891.


Franciszek Józef r. w.

Taaſſe r. w.



SZEMATYZM LEKARSKI.

*) Po raz pierwszy w tym roku wprowadzony szematyzm, będzie w przyszłych rocznikach uzupełniony.



IZBA LEKARSKA w KRAKOWIE

ukonstytuowana w dniu 17 Lipca 1896 r.

Prezes:

Dr Józef Łazarski z Krakowa.

Wiceprezes:

Dr Stanisław Ponikło z Krakowa.

Członkowie Wydziału:

Dr Alfred Obaliński z Krakowa.

Dr Wincenty Świątek z Podgórze.

Dr Józef Walczyński z Tarnowa.

Delegat do krajowej Rady zdrowia:

Dr Adolf Dietzius z Jarosławia.

Zastępca:

Dr Stanisław Jabłoński z Rzeszowa.

Członkowie Izby:

Dr Jan Gawlik ze Suchy.

Dr Tadeusz Kijas z N. Sącza.

Dr Rudolf Trzebiński z Krakowa.

Dr Jan Wain z Krosna.

Zastępcy:

Dr Aleks. Bossowski z Krakowa.

Dr Maks. Kohn z Krakowa.

Dr Jan Raczyński z Krakowa.

Dr Al. Zarewicz z Krakowa.

Dr Władysław Gedl z Wadowic.

Dr Kasper Malinowski z Dobczyc.

Dr Tadeusz Płochocki z N. Sącza.

Dr Lud. Cwiklicer z Dobromila

Dr Szymon Bernadzikowski
z Brzeska.

Dr Edward Segel z Rzeszowa.

Dr Fleszar Jan z Łańcuta.

Do Izby lekarskiej krakowskiej należą następujące powiaty :
Biały (1), Bocheński (3), Brzeski (7), Brzozowski (8), Chrzanowski (11), Dąbrowski (14), Dobromilski (15), Gorlicki (18), Grybowski (20), Jarosławski (23), Jasielski (24), Kolbuszowski (28), Krakowski (31), Krośnieński (32), Łańcucki (33), Limanowski (34), Liski (35), Mielecki (37), Myślenicki (39), Niski (41), Nowosądecki (42), Nowotarski (43), Pilzneński (44), Podgórski (45), Ropczycki (51), Rzeszowski (53), Sanocki (55), Strzyżowski (62), Tarnobrzeski (63), Tarnowski (65), Wadowicki (69), Wielicki (70), Żywiecki (76).

IZBA LEKARSKA we LWOWIE

ukonstytuowana w dniu 30 Lipca 1896 r.

Prezes:

Dr Edward Festenburg ze Lwowa.

Wiceprezes:

Dr Władysław Bylicki ze Lwowa.

Członkowie Wydziału:

Dr Edward Mukowicz ze Lwowa.

Dr Wilhelm Pisek ze Lwowa.

Dr Hilary Schramm ze Lwowa.

Delegat do krajowej Rady zdrowia:

Dr Edward Festenburg ze Lwowa.

Zastępca:

Dr Władysław Bylicki ze Lwowa.

Członkowie Izby:

Dr Leon Ziemiański z Przemyśla.	Dr Aleks. Żukowski ze Stanisławowa.
Dr Karol Muszkiet z Żółkwi.	Dr Józef Eckhardt z Tarnopola.
Dr Aleks. Wysocki ze Złoczowa.	Dr Adolf Stoeckl z Czortkowa.
Dr Wiktor Lechowski z Drohobycza.	Dr Gabryel Sysak z Kołomyi.

Zastępcy:

Dr Grzeg. Zjembicki ze Lwowa	Dr Feliks Kretschmer z Drohobycza.
Dr Michał Świątkiewicz "	Dr Alfred Biegelmajer ze Sambora.
Dr Kazim. Trzciniecki "	Dr Mik. Podłuski z Bolechowa.
Dr Czesław Uhma "	Dr Józef Eckhard z Tarnopola.
Dr Bazyli Kiebuziński z Przemyśla.	Dr Edw. Körner z Monasterzysk.
Dr Miron Jajus ze Sokala.	Dr Wład. Piaskiewicz z Kołomyi.
Dr Stanisław Sołtysik z Brodów.	

Do Izby lekarskiej lwowskiej należą następujące powiaty:

Bobrecki (2), Bohorodczański (4), Borszczowski (5), Brodzki (6), Brzeżański (8), Buczacki (10), Cieszanowski (12), Czortkowski (13), Doliniański (16), Drohobycki (17), Grodecki (19), Horodeński (21), Husiatyński (22), Jaworowski (25), Kałuski (26), Kamionecki (27), Kołomyjski (29), Kosowski (30), Lwowski (36), Mościcki (38), Nadworniański (40), Podhajecki (46), Przemyński (47), Przemyślański (48), Rawski (49), Rohatyński (50), Rudecki (52), Samborski (54), Skałacki (56), Sniatyński (57), Sokalski (58), Stanisławowski (59), Staromiejski (60), Stryjski (61), Tarnopolski (64), Tłumacki (66), Trembowelski (67), Turczański (68), Zaleszczycki (71), Zbarazki (72), Złoczowski (73), Żółkiewski (74), Żydaczowski (75).

WYDZIAŁ LEKARSKI W KRAKOWIE

i zakłady tegoż.

Zakład anatomii opisowej.

(Ulica Kopernika, 12).

Dyrektor: Prof. Kazimierz Kostanecki. *Asystent I*: Dr Stanisław Kaczyński. *Asystent II*: Grzegorz Grzybowski. *Demonstrator*: Stanisław Boczar.

Zakład fizyologiczny.

(Collegium medicum, Ulica Grzegorzewska).

Dyrektor: Prof. Napoleon Cybulski. *Asystent I*: Dr Stanisław Maziarski. *Asystent II*: Dr Jan Gans. *Demonstrator*: Vacat.

Zakład chemii lekarskiej.

(Ulica Kopernika, 12).

Dyrektor: Prof. Aleksander Stopeczański. *Asystent*: Dr Michał Słonkowski.

Zakład patologii ogólnej i doświadczalnej.

(Collegium medicum, Ulica Grzegorzewska).

Zastępca Dyrektora: Doc. pryw. Dr Karol Klecki. *Asystent*: Mag farm. Ignacy Lemberger. *Demonstrator*: Dr Kazimierz Flis.

Zakład anatomii patologicznej.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Tadeusz Browicz. *Asystent I*: Doc. Dr Julian Ignacy Nowak. *Asystent II*: Dr Stanisław Ciechanowski.

Zakład farmakologiczny.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Józef Łazarski. *Asystent*: Dr Henryk Unsin. *Demonstrator*: Wilhelm Zathay.

Zakład higieny.

(Ulica Strzelecka, 7).

Dyrektor: Prof. Odon Bujwid. *Asystent*: Dr Leonard Bier.

Zakład Weterynaryi.

(Ulica Kopernika, 8).

Dyrektor: Prof. Andrzej Walentowicz. *Asystent*: Dr Fryderyk Simon.

Zakład Medycyny ogólnej.

(Collegium medicum, Ulica Grzegorzewska).

Dyrektor: Prof. Dr Leon Wachholz. *Asystent*: Dr Włodzimir Sieradzki.

Klinika lekarska.

(Ulica Kopernika, 5).

Dyrektor: Prof. Edward Sas Korczyński. *Asystent I*: Dr Marjan Piątkowski. *Asystent II*: Dr Wawrzyniec Kędzior. *Asystent III*: Dr Kazimierz Wernicki. *Elew*: Dr Stanisław Kwiatkowski.

Klinika chirurgiczna.

(Ulica Kopernika, 40).

Dyrektor: Prof. Alfred Obaliński. *Asystent I*: Dr Maksymilian Rutkowski. *Asystent II*: Dr Zygmunt Górnisiewicz. *Asystent III*: Dr Bolesław Riedmüller. *Elewi*: Dr Dobrowolski Stanisław. Dr Jan Gawlik.

Klinika okulistyczna.

(Ulica Kopernika, 5).

Dyrektor: Prof. Bolesław Wicherkievicz. *Asystent I*: Dr Karol Brudzewski. *Asystent II*: Dr Adam Bednarski. *Elew*: Dr Kazimierz Majewski.

Klinika położniczo-ginekologiczna.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Henryk Jordan. *Asystent I*: Dr Ludwik Świtalski. *Asystent II*: Dr Władysław Mikucki. *Asystent III*: Dr Marjan Doliński.

Klinika chorób dziecięcych.

(Ulica Strzelecka, 2.)

Dyrektor: Prof. Maciej Leń Jakubowski. *Asystent*: Dr Ksawery Lewkowicz. *Elew*: Dr Stanisław Pożniak.

Pracownia położniczo-ginekologiczna.

(Ulica Gołębia, 11).

Dyrektor: Prof. Antoni Mars. *Asystent*: Dr Julian Piotrowski.

Szkoła położnych.

(w Szpitalu św. Łazarza).

Dyrektor: Prof. Antoni Mars. *Asystent*: Dr Franciszek Kościński.

Klinika chorób skórnych i wenerycznych.

(tamże).

Zastępca Dyrektora: Doc. pryw. Dr Władysław Reiss. Prof. Dr Aleksander Zarewicz. *Asystent*: Dr Władysław Żydłowicz.

Oddział laryngologiczny jako klinika laryngologiczna. (tamże).

Dyrektor: Prof. Przemysław Pieniążek. *Asystent:* Doc. Dr Aleksander Baurowicz.

Oprócz powyżej wymienionych prof. dyrektorów zakładów należą do wydziału lekarskiego:

Profesorowie nadzwyczajni:

Stanisław Domański, p. n. *Patologii i Terapii chorób układu nerwowego*. Walery Jaworski, p. n. *Patologii i Terapii szczegółowej chorób wewnętrznych*. Stanisław Pareński, p. n. *Patologii i Terapii szczegółowej chorób wewnętrznych*. Rudolf Trzebicki, n. p. *Chirurgii*. Aleksander Zarewicz, n. p. *Dyagnostyki chorób syfilitycznych*.

Docenci prywatni.

Karol Zuławski, D. p. *Psychiatrii*. Aleksander Bossowski, D. p. *Chirurgii*. Stanisław Braun, D. p. *Położnictwa i Ginekologii*. Franciszek Sroczyński, D. p. *Okulistyki*. Aleksander Rosner, D. p. *Położnictwa i Ginekologii*. Aleksander Baurowicz, D. p. *Laryngologii*. Jan Raczynski, d. p. *chorób dzieci*. Leon Kryński, D. p. *Chirurgii*. Ludomił Korczyński, D. p. *chorób wewnętrznych*. Wincenty Łepkowski, D. p. *Dentystyki*. Julian Ignacy Nowak, D. p. *Anatomii patologicznej*.

WYDZIAŁ LEKARSKI WE LWOWIE i zakłady tegoż.

Zakład anatomii opisowej.

(Ulica Piekarska, 24).

Dyrektor: Prof. Henryk Kadyi. *Asystent:* Dr Leon Swierzawski. *Demonstrator:* Alfred Burzyński. Józef Markowski.

Zakład histologiczno-embryol.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Władysław Szymonowicz. *Asystent:* Dr Tadeusz Präschil.

Zakład fizyologiczny.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Adolf Beck. *Asystent I*: Dr Adam Jasiński.
Asystent II: Dr Stanisław Kłoczek.

Zakład chemii lekarskiej.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Władysław Niemiłowicz. *Asystent*: Dr Julian Hückel. *Demonstrator*: Józef Chania.

Zakład patologii ogólnej i doświadczalnej.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Jan Prus. *Asystent*: Dr Roman Serkowski.
Demonstrator: Janusz Niementowski.

Zakład anatomii patologicznej.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Andrzej Obrzut. *Asystent I*: Krzyszowski J. *Asystent II*: Paweł Kuczera.

Zakład farmakologiczny.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Wacław Sobierański. *Asystent*: Dr Józef Krysakowski. *Demonstrator*: Bolesław Błażek.

Klinika lekarska.

(Ulica Pijarów).

Dyrektor: Prof. Antoni Gluziński. *Asystent I*: Dr Julian Marischler. *Asystent II*: Dr Roman Rencki. *Elew*: Dr Stanisław Eljasz-Radzikowski.

Klinika chirurgiczna.

(tamże).

Dyrektor: Prof. Ludwik Rydygier. *Asystent I*: Dr Stanisław Krasowski. *Asystent II*: Dr Bronisław Kozłowski. *Elewi*: Dr Maksymilian Władysław Hermann. Dr S. Ruff. Dr Bruno Wojciechowski.

Szkoła położnych.

Dyrektor: Prof. Adam Czyżewicz. *Asystent*: Dr Józef Starzewski.

Oprócz powyżej wymienionych prof. dyrektorów zakładów należą do wydziału lekarskiego:

Prof. Dr Ziembicki Grzegorz, chirurgii. **Docenci**: Hilary Schram (*chir.*) Wiktor Wehr (*chir.*) Piotrowski Gustaw (*fizjol.*) Widman Oskar (*med. wewnętrzna*).

Szpital krajowy Św. Łazarza w Krakowie.

(ilość łóżek 766).

Dyrektor: prof. Dr Ponikło Stanisław.

Prymaryusze: prof. Dr Jordan Henryk (oddział położn. ginekol.) Dr Krokiewicz Antoni (oddz. wewn. B.) Prof. dr Pareński Stanisław, (oddz. wewn. A.) Prof. dr Pieniążek Przemysław (oddz. laryng.). Doc. dr Reiss Władysław, (oddz. klin. kiłowoskórny). Prof. dr Wicherkiewicz Bolesław, (oddz. okul.) Prof. dr Zarewicz Aleksander, (oddz. kiłowoskórny). Doc. dr Żuławski Karol (oddz. dla umysł. chorych). Prof. dr Trzebiecky R., zastępcą prym. oddz. chir.

Sekundaryusze: Dr Aekermann Adam. Dr Górski Franciszek Xawery. Dr Krzyształowicz Franciszek. Dr Nowak Zygmunt. Dr Siedlecki Jan. Dr Torezyński Teofil. Dr Haim Leopold. Dr Hirsch Dawid. Dr Jarosz Władysław. Dr Münz Emil. Dr Kepler Paweł. Dr Wachtel Zygmunt.

Praktykanci: Dr Berger Ludwik. Dr Batko Józef. Dr Bier Leonard. Dr Czerny Schwarzenberg. Dr Dika Hubert. Dr Doboszyński Ludwik. Dr Dobrzyński Kazimierz. Dr Droba Stanisław. Dr Dziewoński Władysław. Dr Eliasiewicz Zygmunt. Dr Flis Kazimierz. Dr Gans Jan. Dr Josse Eugeniusz. Dr Kaczyński Stanisław. Dr Królikowski Jan. Dr Krzyszkowski Józef. Dr Latkowski Józef. Dr Łopaciński Michał. Dr Małaczyński Roman. Dr Maziarski Stanisław. Dr Nowotny Franciszek. Dr Raczyński Adam. Dr Safian Łukasz. Dr Sędzimir Czesław. Dr Senkowski Michał. Dr Służewski Kazimierz. Dr Smolarski Władysław. Dr Sołtysik Mieczysław. Dr Simon Fryderyk. Dr Sochacki Leon. Dr Supiński Edmund. Dr Stahr Elias. Dr Sternbach Dawid. Dr Stankiewicz Wiktor. Dr Trzeciński Maurycy. Dr Unsinn Henryk. Dr Walkowski Jan. Dr Ziarko Jan. Dr Zychon Józef.

Szpital powszechny we Lwowie.

(ilość łóżek 975)

Dyrektor: Dr Bolesław Głowacki.

Prymaryusze: Prof. Dr Adam Czyżewicz (oddz. położniczy). Dr Emanuel Machek (od. oczny). Dr Wiktor Opolski (od. wewn. II). Dr Józef Różański (od. kiłow-skórny m.) Dr Edward Sawicki (od. wewn. III). Dr Michał Świątkiewicz (od kiłow-skórny ż.). Dr Oskar Widman (od. wewn. I). Prof. Dr. Grzegorz Ziembicki (od. chirurg).

Sekundaryusze: Dr Wincenty Arnold. Dr Edmund Ciszka. Dr Izidor Fajersztejn. Dr Stanisław Fibich. Dr Waleryan Frankowski. Dr Zenon Leńko. Dr Tadeusz Niemczynowski. Dr Włodzimierz Pajaczkowski. Dr Jan Papée. Dr Edward Pivel. Dr Maksymilian Schmelkes. Dr Józef Selzer. Dr Waleryan Serbeński. Dr Ferdynand Stankiewicz. Dr Adam Szulislawski. Dr Bogumił Zavadil. Dr Oswald Zion.

Praktykanci szpitalni: Dr Baraniecki Roman. Dr Bardach Józef. Dr Czaczkowski Józef. Dr Długosz Zygmunt. Dr Dujanowicz Zygmunt. Dr Fechter Tadeusz. Dr Haisig Karol. Dr Hlebowicki Cypryan. Dr Kłasy Henryk. Dr Kolmer Juliusz. Dr Kruszyński Władysław. Dr Kunzek Henryk. Dr Mach Andrzej. Dr Margulies Maks. Dr Markiewicz Dyonizy. Dr Matkowski Józef. Dr Meschel Józef. Dr Penzias Samuel. Dr Pilecki Zygmunt. Dr Polański Stanisław. Dr Reizes Dawid. Dr Świątkowski Jan. Dr Świątkowski Stefan. Dr Szamet Izidor. Dr Walsleben Teofil. Dr Węclewski Tadeusz. Dr Zajaczkowski Juliusz. Dr Żuławski Józef Leon.

Chemik patologiczny: Dr Józef Wiczowski.

Krajowy Zakład dla obłąkanych na Kulparkowie.

(ilość łóżek 560).

Dyrektor: Dr Neusser Gustaw.

Prymaryusze: Dr Kohlberger Wład. (oddz. męzcz.) Dr Maliszewski Hier. (oddz. kobiet).

Sekundaryusze: Dr Kazimierz Kruszyński. Dr Julian Woźniński.

Szpital Św. Ludwika dla dzieci.

(łóżek 120 — Telefon Nr. 170.)

Dyrektor: Prof. Jakubowski M. L.


Prymaryusz: Dr. F. Murdzieński.

Honorowy operator: Doc. Bossowski Aleks.

Sekundaryusze: Grażyński Edw., Stapa Wilhelm.

Szpital dla dzieci Św. Zofii.

Dyrektor: Dr Emil Merczyński. **Operator szpitala:** Docent Dr Hilary Schramm. **Sekundaryusz:** Dr Stanisław Czarnik.



NACZELNE WŁADZE SANITARNE.

Przy ministerstwie spraw wewn.

Dr Kusy Emanuel, c. k. Radca ministeryalny.

NAJWYŻSZA RADA ZDROWIA

(K. k. oberster Sanitätsrath).

Przewodniczący:

Vacat.

Zastępca przewodniczącego:

Vogl August, r. d. Prof.

Członkowie zwyczajni:

Prof. Dr Albert Edw. r. d.	Prof. Dr Ludwig Ernest r. d.
Prof. Dr Böhm Karol r. d.	Prof. Dr Polansky Stan.
Prof. Dr Braun Gustaw r. d.	Prof. Dr Weichselbaum Antoni.
Prof. Dr Drasche Antoni r. d.	Prof. Dr Widerhofer Herman
Prof. Dr Gruber Maksymilian.	r. d.
Prof. Dr Kratschmer Floryan,	Dr Widersperg Gustaw.
l. szt.	Prof. Exner Zygmunt.
Prof. Dr Chrobak Rudolf r. d.	Dr Mucha Wiktor,

Członkowie nadzwyczajni:

Prof. Dr Gruber Franciszek.	Dr Daimer Józef.
Dr Hellmann Alojzy (Aptekarz).	Grüner Robert (Aptekarz).
Prof. Dr Inama-Sternegg Karol,	Kremsl Alojzy (Aptekarz).
sz. s.	Sperk Bernhard (Weteryn.).

C. K. KRAJOWA RADA ZDROWIA.

Skład i zakres takowej, jako ciała obradującego i doradczego, oznaczony jest ustawą z dnia 30 Kwietnia 1870 r. dz. ust. p. Nr. 68 o organizacyi publicznej służby zdrowia.

Przewodniczący:

Czyżewicz Adam, Dr med. i mag. pol., c. k. prof. pol.
i prym. szp. p. we Lwowie.

Zastępca przewodniczącego:

Opolski Wiktor, Dr med., prym. szp. p. we Lwowie.

Członkowie:

a) ze strony Rządu:

Dr Festenburg Edward.	Dr Merunowicz Józef j. w.
Doc. Dr Schramm Hilary.	Dr Widman Oskar, Dr med.
Prof. Dr Kadyi Henryk.	i chir., prym. szp. p
Prof. Dr Czyżewicz Adam j. w.	Dr Opolski Wiktor j.w.

b) ze strony Wydziału krajowego:

Dr Merczyński Emil, Dr med.

Prof. Dr Ziembicki Grzegorz, Dr med., oper. szp. p.

c) Delegaci Izb lekarskich:

Dr Dietzius Adolf z Jarosławia (Iz. kr.),

Dr Festenburg Edward ze Lwowa (Iz. lw.).

Zastępcy:

Dr Jabłoński St. z Rzeszowa (Iz. kr.),

Dr Bylicki W. ze Lwowa (Iz. lw.).



WŁADZE SANITARNE w GALICYI.

Departament sanitarny c. k. Namiestnictwa galic. we Lwowie.

Dr Merunowicz Józef, c. k. rada Namiestnictwa,
referent sanitarny krajowy.

Biuro sanitarne:

Dr Lachowicz Zdzisław, c. k. inspektora sanit.

Dr Barzycki Józef, c. k. insp. sanit., Rada cesarski.

Dr Milewski Tadeusz, asyst. sanit.

Dr Kosiński Leopold, asyst. sanit.

Dr Gołębiowski Karol, asyst. sanit.

Biuro weteryn.:

Timoftiewicz Ludwik, c. k. weteryn. kraj.

Harasymowicz Dyonizy, c. k. inspektor weterynar.

Bloch Józef, c. k. Koncepista weteryn.

Starsi lekarze powiatowi: (VIII ranga).

Dr Bieniewicz Aleks. Dr Biesadecki Jan. Dr Stanko Wojciech. Dr Skalski Władysław. Dr Zaleski Eustachy. Dr Werner Karol. Dr Gładyszowski Emil. Dr Wągrowski Karol. Dr Wolański Kajetan. Dr Zawadziński Stanisław. Dr Janowski Ignacy. Dr Serkowski Bolesł. Dr Rosner Maksym. Dr Skibicki Adam. Dr Wurst Adolf. Dr Obtulowicz Ferdyn.

Lekarze powiatowi: (IX ranga).

Dr Liściński Ludwik. Dr Kniehynicki Klemens. Dr Pietrzycki Antoni. Dr Dembowski Mieczysław. Dr Bielański Gustaw. Dr Litwinowicz Orest. Dr Czyżewicz Władysław. Dr Maryno-

wski Mieczysław. Dr Nycz Wincenty. Dr Berggrün Adolf. Dr Hordyński Andrzej. Dr Ciepielowski Kazimierz. Frydman Zenon. Dr Dorożyński Jakób. Dr Lic Henryk. Dr Jendl-Sausenhofen Ignacy. Dr Filewicz Jan. Dr Dzikowski Zygmunt. Dr Wasylewski Tytus. Dr Jabłoński. Jacek Stanisław. Dr Hirschler Mieczysław. Dr Coghen Antoni. Dr Goldhaber Adolf. Dr Danielski Jan. Dr Kramarzyński Mieczysław. Dr Balicki Stanisław. Dr Sobolewski Franciszek. Dr Blumenfeld Henryk. Dr Głowiński Wincenty. Dr Żelazowski Wiktor. Dr Witkowski Edward. Dr Kownacki Józef. Dr Loewy Alojzy. Dr Lebedowicz Emil. Dr Seiborowski Kazimierz. Dr Krzyżanowski Kalikst. Dr Bednarski Jan. Dr Schmidt Filip. Dr Kuhn Adolf. Dr Peters Józef. Dr Friedberg Józef. Dr Opieński Jan. Dr Momiłowski Walery. Dr Szajna Józef.

Koncepiści sanitarni: (X ranga)

Dr Kronenberg Karol. Dr Gawlikowski Stanisław. Dr Warzycki Bronisław. Dr Januszkiewicz Ignacy. Dr Słaczka Antoni. Dr Teodorowicz Tadeusz. Dr Szczepański Włodzimierz. Dr Pohorecki Władysław. Dr Nycz Henryk. Dr Stokłosiński Franciszek. Dr Borysiewicz Wiktor. Dr Karpiński Stanisław. Dr Żukotyński Franciszek. Dr Krzyszkowski Erazm. Dr Iwański Karol. Dr Bory Julian. Dr Hyżycki Cyryl.

Asystenci sanitarni:

Dr Gold Józef. Dr Haim Lieber. Dr Fuchs Leon. Dr Bakowski Teofil. Dr Mosler Maksymilian. Dr Biesiadzki Antoni. Dr Milewski Tadeusz. Dr Szaynowski Maryan. Dr Dolnicki Cyryl. Dr Kosiński Leopold. Dr Jastrzębski Aleksander. Dr Piotrowski Edward. Dr Gołębiowski Karol. Dr Mossor Kazimierz. Dr Simon Frydryk.



Spis lekarzy według miejsca zamieszkania.

Kraków.

Dr Ackermann Adam, Szpital
św. Łazarza.

Aronsohn Jul., Gertrudy 7.

Batko Józef, Strzelecka 9.

Baurowicz Aleks., Kolejowa 2
(3—4).

Bednarski Adam, Klinika okul.

Biełański G., Studencka 3.

Berger Ludwik, Niecała 1.

Bier Leonard, Strzelecka 7.

Blatteis Jakób, Kolejowa 12
w lecie w Krynicy.

Bobkiewicz Henryk, Mały Ry-
nek 3 (3—4).

Borzęcki Eug., Floryńska 37.

Bossowski Aleksander, Flory-
ńska 35 (3—4). Tel. 292.

Braun Stanisław, Dietla 95.
Tel. 221.

Browicz Tadeusz, Krupnicza
5 (3—4). Tel. 197.

Brudzewski Kar, Klinika okul.

Bujwid Odo, Kolejowa 3.

Buszek Jan, Fizyk miasta, Ry-
nek A—B 39 (2—4). Tel. 168.

Buzdygan Mikołaj, Braeka 8
(3—4).

Cercha Maks., Szczepańska 3.

Cholewicz Franciszek, ś. Jana
4 (3—4).

Ciechanowski St., Karmelic. 25.

Cybulski Napoleon, Szczepań-
ska 11.

Czerny Edw., Basztowa 18.

Doboszyński L., Karmelicka 35.

Dobrowolski Stanisł., Klinika
chir.

Dobrzański Stef., Krupnicza 9.

Dobrzyński Kaz. Długa 31.

Dr Doliński M., Klin położn.

Domański Stanisław, Szcze-
pańska 9 (3—4). Tel. 108.

Droba Stan. Dietla 95.

Drożdż Bolesław, ul. św. Jana
11 (2—4).

Dziewoński Władysł. Szpital
św. Łazarza.

Eichhorn Ferdynand, Dietla
47. Tel. 120.

Eliasiewicz Z. Grzegórzec. 14.

Filimowski Antoni, Grodzka
39 (2—4). Tel. 93.

Filipkiewicz Stef., Kolej. 18.

Flis Kazimierz, Coll. medic.

Fränkel Henr., Starowiślna 42.

Gans Jan, Coll. medicum.

Gawlik Jan, Długa 13.

Gertler Norbert, Gertrudy 18.

Górniewicz Zygmunt, Klin.
chirurg.

Górski Ks., Mikołajska 11.
(3—4).

Grażynski Edward, Zielona 8.

Gwiazdomorski J, Łobzowska
32 (Dom zdrowia). Tel. 67.

Haim Leopold, ś. Anny 9.

Harajewicz Jan, Podwale 14.

Himmelblau Jakób, Szpit. św.
Łazarza.

Hirsch Dawid, Długa 10.

Hirsch Herman, Zielona 7.

Jakubowski Maciej Leon, Pod-
wale 10 (3—4).

Jankowski St., Szlak 32.

Jarosław Wład., Rakowicka 1.

Jaugustyn Stanisł., Siemiradz-
kiego.

Jaworski Walery, Kopernika
2 (3—4).

Dr Jordan Henr., Wiślna 5 (3—4).

Tel. 210.

Josse Jan, Sienna 5.

Junger Jak., Krakowsk. 3 (2—4)

Jurowicz Izydor, Stradom 17.

Kaczkowski Karol, Krowoderska 54.

Kaczyński St., Kopernika 12.

Karaś Andrzej Szpital św. Łazarza.

Kaufmann Mich., Grodzka 32.

Kedzior Wawrz., Klin. wewn.

Kirschner Aron, Dietla 55.

Kohn Maksymil., Pijarska 9 (3—4). Tel. 171.

Kopff Leon, Pijarska 9 (3—4); w lecie w Krynicy.

Korczyński Edward, Łobzowska 12 (3—5).

Korczyński Ludomił, Sławkowska 10. (3—4).

Kośmiński Franciszek, Szpital św. Łazarza (3—4).

Kostanecki K., Batorego 16.

Koy Stan., Floryańska (3—4). Tel. 218.

Kozłowski M., Klin. chirurg.

Kozłowski Sykst., Biskupia 14.

Kraft Kamil, Szp. św. Łazarza.

Kramarzyński Karol, Pijarska 5 (3—4).

Krokiewicz Antoni, Podwale 1.

Krongold Wilh., Dietla 49.

Kurkiewicz Stanisław, Szpital św. Łazarza.

Kryński L., Franciszkańska. 1.

Krzyształowicz Franc., Kolejowa 3 (3—4).

Kwaśnicki August, Basztowa 4 (3—4) Tel. 252.

Kwiatkowski Stanisł., Klinika wewn.

Landau Jan, Grodzka 69.

Landau Rafał, Dietla 67.

Langie Adam, Sławkowska 20 (3—4).

Latkowski Karol, Szpital św. Łazarza.

Lax Jan, Jasna 5. Tel. 235.

Leinkram Zygm., Szp. św. Łaz.

Lewkowicz Ks. Szpital św. Ludwika. Tel. 170.

Dr Lustgarten Lud., Grodzka 60.

Lustig Samuel, Krakowska 35.

Łazarski Józ., Dietla 97.

Łepkowski Winc., Straszewskiego 27 (dentysta). Tel. 237.

Łopaciński Mich., Mikołajsk. 2.

Łoniewski A. klin. okul.

Majer Józef, Krupnicza 9.

Majewski Julian, Klin. okul.

Maleszewski Wł. Klin. położn.

Małaczyński R. Łobzowska 32.

Marcisiewicz Feliks, Wiślna 10 (3—5).

Mars Ant., Szpitalna 19 (2—4). Tel. 35.

Masny Ignacy, Szp. św. Łazarza.

Matzke Henryk, Szewska 19.

Mayzel Tadeusz Wiślna 2.

Maczka Tomasz, Floryańska 31 (2—4).

Maziarski Stanisł., Coll. med

Mendelsburg H., Wolska 17.

Mikucki Wład., Pańska 6.

Münz Emil, Sławkowska 4. (1—3).

Murdziński Franciszek, Szpitalna 36 (3—4). Tel. 102.

Nartowski Mieczysł., Rynek główny 43.

Nowak Julian, Dietla 97.

Nowak Zygm., Szp. św. Łazarza

Nowotny Francisz., Zielona 20.

Obaliński Alfred, Kolejowa 7 (3—4). Tel. 55.

Pareński Stanisław, Wielopole 4 (3—5). Tel. 208.

Paszkowski Stanisław, św. Anny 7 (3—4). Tel. 132.

Peterseim Leon, Długa 30.

Piątkowski M., Szewska 15.

Pieniążek Przemysław, Bracka 10 (3—5). Tel. 164.

Piepes Wilhelm, Grodzka 18.

Piórko A., Wielopole 12.

Piotrowski Juliusz, Batorego 4

Piotrowski Tymoteusz, klin. chirurg.

Ponikło Stan., Bracka 5 (3—4). Tel. 192.

Późniak S. Wielopole 15. (2—3).

Raczyński Adam, Rynek główny 45.

Dr Raczyński Jan, Rynek A. B. 45 (3—4). Tel. 207.
 Radecki P., Zwierzyniecka 8.
 Reifer Ad.
 Reiss Władysław, Kolejowa 7 (3—4).
 Riedmüller Bol., Klinika chir.
 Rosenblatt Em., Basztowa 25 (3—4).
 Rosner Aleksander Bracka 13, Tel. 32.
 Różecki Józef, Floryńska 24, (3—4).
 Rutkowski Maks., Klin. chir.
 Saffan Łukasz, św. Filipa 4.
 Satkowski Zyg., Długa 31.
 Schaitter Ign., Grodz. 62 (2—3). Tel. 87.
 Schermant Józef, Stradom 23.
 Schoengut Stefan, Wiślna 10.
 Schuman Franciszek, (dent.) Stolarska 13.
 Schneider Ludwik, Floryńska 34 (3—4) Tel. 287.
 Schwarz Albin, Floryńska 7, (3—5) l. p.
 Sciborowski Wład., Wolska 14 (3—4); w lecie w Szczawnicy.
 Seifmann P., Bernardyńska 13.
 Seńkowski Michał Kóper. 12.
 Sedzimir Cz., pl. Matejki 5.
 Siedlecki J., Rynek 45. A. B.
 Sieradzki Włodzim., Coll. med.
 Silberstein Adolf, Agnieszki.
 Simon Fryderyk, Kopernika 8.
 Skobel Stanisław, Rynek gł. 23 (3—5),
 Skórczewski Bol., Batorego 24, w lecie w Krynicy.
 Skrzyński S., Bracka 11 (3—4).
 Sliwiński Michał, Mały Rynek 4 (3—4).
 Słapa Wilhelm, Kolejowa 4. (3—4). Tel. 34.
 Służewski Kaz., Retoryka 1.
 Smolarski Wład., Długa 4.
 Sochacki Leon, Szpital ś. Łaz.
 Sokołowski Henr., św. Jana 16 (2—4).
 Sołtysik Mieczysław, Rynek kleparski 15.
 Spira Rafał, Dietla 52.

Dr Sroczyński Franciszek, Floryńska 38. (10—12; 3—4).
 Stahr Elias, Sebastjana 17.
 Stankiewicz Wikt. Kolejowa 10
 Sternbach Dawid, Starowiślna 23.
 Stopczański Aleksander, Kopernika 12, zakład chem.
 Supiński Edmund, Szpital ś. Łazarza.
 Surzyński Józef, Franciszkań-1 (3—4). Telef. 156.
 Süsskind Albert, Stradom 18 (3—5).
 Switalski Ludwik, Klinika położnicza, Tel. 27.
 Syrop Jak. (dent.), Grodzka 20.
 Szewczyk Józef, Floryńska 13
 Szponder Wojciech, Szpital ś. Łazarza.
 Szymkiewicz Kazim., Rynek gł. 26 (dentysta).
 Tokarski St., Dietla 103.
 Torczyński Teofil, Szpital ś. Łazarza.
 Trzeński Bogusł., Pijarska 2.
 Trzebiński Rudolf, Podwale 12 (3—4). Telef. 81.
 Tuszyński Ferdynand, Sławkowska 20.
 Tyszecki Teofil, Pawia 8, (3 do 4) w lecie w Krynicy.
 Unsin Henr., Starowiślna 28.
 Wachholz Leon, Basztowa 25.
 Wachtel Zygmunt, Grodzka 32.
 Walkowski Jan, Długa 20.
 Walentowicz And., Poselska 7.
 Wasowicz Z. Szpitalna 6.
 Wernicki K., Klinika wewn.
 Wierchiewicz Bolesław, Wolska 11 (3—4).
 Wilkosz Aleksander, Mały Rynek 4 (3—4). Telef. 217.
 Wiszniewski Ludw., Szlak 40 (3—4). Telef. 211.
 Wodniecki Józ., Wielopole 6.
 Wróblewski Wincenty, Franciszkańska 4.
 Zanietowicz Józ., Batorego 1.
 Zarewicz Aleksander, Floryńska 40 (2—4).
 Zeitner J., Dietla 79 (2—5).

Dr Zoll Józef, Kolejowa 7.
 Żuławski Karol, Długa 82.
 Telef. 159.
 Żychoń Józef, Szewska 10.
 Żydłowicz Wł., Floryańska 22.

Dentyści:

Dr Lepkowski Wincenty, dentysta, Straszewskiego 27.
 Schuman Franc., Stolarska 13.
 Matzke Henryk, Szewska 19.
 Piepes Wilhelm, Grodzka 18.
 Syrop Jakób, Grodzka 20.
 Szymkiewicz Kazimierz, Rynek gł. 26.
 Drd Łukaszewicz Karol, św. Tomasza 11 (róg ślawkowskiej).
 Drd Hrebenda Władysław, Szpitalna 17.
 Matuszewski Henr, Stolarska 13.
 Dłużyński Jan, Floryańska 12.

Weterynarze:

W. Jackowski Józef, Grzegórzki w. m.
 Klich Karol, w. p.
 Papée Aleksander, w. m.
 Rutkowski Kaz. w. p.

Lwów.

Dr Arnold Winc., Szpital powsz.
 Aschkenazy Z., Chorańcz. 13.
 Auerbach Em., Krakowska 14.
 Bałaban Teodor, Wałowa 7.
 Barański A., Chorańczyczna 24.
 Baraniecki Roman, Szpital.
 Barącz Roman, Teatralna 11.
 Beck Adolf, Pańska 14.
 Berezowski K., Łyczakowska 3.
 Bett Maks., Kazimierzowska 39.
 Bienkowski Bogumił, dent., ul. Kościuszki 8.
 Bikeles Guttman, Kopernika 5.
 Blotnicki T., Brajerowska 10.
 Bylicki Wład., Kościuszki 7.
 Chądzyński Jan, Sobieskiego 4.
 Chomin Ant., Żimorowicza 3.
 Ciszka Edm., Żółkiewska 45.
 Czaczkowski J., Zyblikiew. 37.
 Czarnik St., Łyczakowska 46.
 Czyżewicz Ad., Cłowa 2.

Dr Dębicki Kl., Piekarska 8.
 Dekauński Stan., Dworzec kol.
 Dobiński Włodz., Puławs. 1.
 Dubanowicz P., Ormiańska 33.
 Dujanowicz, Szpital powsz.
 Dukiet J., Sykstuska 35.
 Durst Adolf, św. Michała 3.
 Ehrlich Dawid, Grodecka 58.
 Elektorowicz Emil, Łyczak. 6.
 Eliasz Radzikowski St., Kl. w.
 Fechter Tadeusz, Szpital p.
 Feiersztein Iz., Słowackiego 6.
 Feuerstein Neuman, Janowska 9.
 Festenburg Edward, Dominkańska 11.
 Fiałkowski Lud., Syxstuska 1.
 Fibich Stanisław, Zielona 5.
 Frankowski W. Grodzickich 4.
 Frenkl Henr., Pańska 15.
 Fuchs F., dent., pl. Maryacki 9.
 Gabryszewski Ant., klin. chir.
 Gembarzewski Zygm. Jagiellońska 7.
 Gluchowski Franciszek.
 Gluziński Lesław, Wałowa 14.
 Gluziński A., Kościuszki 18.
 Głowacki Bol., Batorego 24.
 Gońka And., dent., Kopern. 4.
 Gostyński Józef, Kościuszki 2.
 Gross Karol, ul. Boimów 9.
 Grabowski M. Zyblikiewicza 6.
 Haisig Karol, Szpital pow.
 Hellmann, ul. Jagiellońska 16.
 Henzel St., Brajerowska 16.
 Hlebowicki Cypryan, Szpital p.
 Hojnacki Wł., Słowackiego 2.
 (3—5).
 Hoszard Franc., Kraszewsk. 4.
 Hüchel J., Zakład chem. lek.
 Jana Stan., Wałowa 27.
 Janda Franc., Pańska 21.
 Jasiński Wł., Kurkowa 3.
 Jasiński Adam, Zakład fizjol.
 Jaszczerowski Kaz., magistrat
 Kaczorowski Bron., Sobiesk. 5.
 Kadyj Henryk, ul. Zielona 15.
 Kaufman O., Kazimierz. 39.
 Kicki Tytus, Kopernika 3.
 Kłaysy H. Szpital pow.
 Kobyłański Ant., Strzelecka 2.
 Korman J., Karola Ludw. 21.

Dr Kosiński F., ul. Skarbk. 37.
 Kosiński L., Grottgera 7.
 Kossak Leon, Wałowa 29.
 Kowalski Edm., Podzamecze.
 Kowalski Michał, Czarnieck. 1.
 Kozłowski Br., Klin. chirurg.
 Kozierowski E., Kopernika 23.
 Krasowski Stanisł., Klin. chir.
 Krobicki Tad., Skarbkowska 2.
 Kryszakowski J., Piekarska 24.
 Krygowski T., ulica 3 Maja 10.
 Krzyszkowski J., Piekarska 24.
 Kucharski Piotr, pl. Akadem. 1.
 Kunzek Henryk, Szpital p.
 Kwiatkiewicz Stan., pl. Bernardyński 12.
 Lachowicz Zdzisław, Trybunałski pl. 1.
 Landau F., Karola Ludwika 37.
 Lilien Norbert, 3 maja 10.
 Lewin Adolf, Gródecka.
 Lateiner Em., Kopernika 9.
 Legeżyński Wiktor, Żółkiewska 65.
 Leńko Zenon, Szpital p.
 Liekendorf Ign. Kurkowa 2 a.
 Lukas Ad., l. sąd. Blachar. 8.
 Ładniewski Sz. Barska 6.
 Łopacki L., Chorażeczyna 13.
 Mach Andrzej, Łyczakowska 8.
 Machek Em., Akademicka 11.
 Mahl Jakób, Jagiell. 24.
 Majewski Ad., Pl. św. Zofii 1.
 Marischler Jul., Klin. Wew.
 Mayer Józef, Halicka 15.
 Margulies Maks, Gródecka 3.
 Markiewicz D., Szpital pow.
 Mehrer Henr., Jagiell. 13.
 Merczyński Em., Kopernika 1.
 Merunowicz Józef, c. k. Protomedyk, Zamoyskiego 18.
 Meschel J., Szpital powsz.
 Mosing Kaz., Wałowa 13.
 Mukowicz E., Kopernika 22.
 Niemczynowski Tad., Szp. p.
 Niemiłowicz Wł., Zakł. ch. lek.
 Obrzut Andr., Zakł. anat. pat.
 Obtułowicz F., 3-go Maja 21.
 Opolski Wiktor, Wałowa 13.
 Padalewski A., Akademicka 3.
 Pajackowski W., Pl. Akad. 2.
 Papée Jan, Piekarska 4.

Dr Pawlikowski A., Chorażecz. 2.
 Penzias Samuel, Bernsteina 10.
 Pilecki Z., Szpital p.
 Piotrowski G., Akademicka 5.
 Pisek Wilh., Jagiell. 12.
 Pivel Edward, Boimów 4.
 Pilewski Oskar, Kopernika 9.
 Podlewski K., Chorażecz. 16.
 Polański Stan., Szpital p.
 Prus Jan, Kościuszki 7.
 Prashill Tad., Piekarska 24.
 Rapaport Józef, Gródecka 10.
 Rapp Leon, Piekarska 15.
 Reinhold Zygm., Sykstuska 23.
 Reinhold Jon., Sykstuska 23.
 Reitzes D. jun., Kopernika.
 Reitzes D., Skarbkowska 27.
 Rencki Roman, Klin. wewn.
 Roicki Ant., Sokoła 1.
 Rosenzweig Leo, Sykstuska 6.
 Rosner Jan, Cłowa 2.
 Rosner Ig. l. m., Sykstuska 14.
 Rożański J. Kraszewskiego 11.
 Rubinstein N., Łyczakowska.
 Rydygier Lud., Kościuszki 16.
 Sawicki E., Mochnackiego 10.
 Schellenberg L., Kopernika 22.
 Schmelkes M., Kazimierz. 43.
 Schmidt E., Akademicka 11.
 Schramm Hilary, Sykstuska 22.
 Selzer Józef, Sykstuska 4.
 Serbeński Wal., Batorego 30.
 Serkowski Rom., Kurkowa 5.
 Sielski Szczes., Akademicka 8.
 Sieradzki A., Chorażecz. 14 B.
 Silberstein S., Sykstuska 34.
 Singer Menele, Kotlarska 1.
 Skałkowski Bron., Kościuszki.
 Smitowski M., Sobieskiego 7.
 Sobierański W., Zakł. farmak.
 Sochanik S., pl. Bernardyński 15.
 Sołowij, Mickiewicza 3.
 Sochański J., Pańska 2.
 Spalke Zygmunt, Grodzick. 4.
 Stachiewicz T., Pl. Maryacki 8.
 Stankiewicz Ferd., Pańska 27.
 Stark J., Pl. Gołuchowsk. 3.
 Starzewski Józef, Wałowa 4.
 Stauber Salom., Żółkiewska 2.
 Steinhauz Józef, Sykstuska 21.
 Stella-Sawicki Jan, ins. szp. Kurnicka 13.

Dr Strojnowski Edw., Plac Maryacki 6 i 7.
 Świątkiewicz Michał, Grodzkich 1.
 Świątkowski Jan, Zakład Dra Dobńskiego.
 Świątkowski Stef., Szp. powsz.
 Swierżawski Leon, Zakł. anat.
 Szuszkiewicz Piotr, lek. polic.
 Plac Kapitulny 3.
 Szpilman Józef, dyr. szk. wet.
 Sztembarth Celest., Bator. 26.
 Szulislowski Ad., Kilińskiego 2.
 Szydłowski Zdzisław, Sykstuska 22.
 Tabor Bron., Akademicka 20.
 Tatarczuch Władysław, 1. m. Kołataja 6.
 Trzebieńcki Kazimierz, Kopernika 14.
 Uhma Czesław, Lindego 7.
 Wachtel A., Bernardyńska 3.
 Wallach Don, Kar. Ludw. 35.
 Walsleben Teod., Kar. Ludw. 3.
 Węclewski Tadeusz, Garncarska 16.
 Wolisch Alfred, Kościuszki.
 Wechsler Emil, Wałowa 23.
 Wehr Wiktor, 3-go Maja.
 Weigel Józef, Akademicka 20.
 Weiss Adolf, Akademicka 3, (dentysta).
 Wernicki Józef, Batorego 30.
 Wiczkowski J., Kościuszki 4.
 Widman Oskar, pr. szp., Grodzkich 2.
 Wojciechowski Bruno, Klin. chirurg.
 Zajączkowski Julian, Szpital powsz.
 Zakrzewski J, Słowackiego 5.
 Zakreys Franc., Grodecka 50 B.
 Zavadil Teofil, Akadem. 20.
 Ziembicki Grzegorz, 3 Maja 5.
 Zion Oswald, Kołataja 3.
 Zgórski Kazim., Kopernika 16.
 C. Beschloss M., Żółkiewska 29.
 Chliff Sam., Sobieski 13.
 Gabel Hil., Sobieskiego 26.
 Grabscheid Max, pl. Krakowski 10.
 Krainer Eman., pl. Krakow. 7.

C. Kurzer Lazar, Pl. Krakow. 12.
 Lateiner Jak., Żółkiewska 65.
 Latainer Leon, Karol. Ludw. 79.
 Letz Samuel, pl. Gołuchowskich 15.
 Lisowski Maryan, dentysta pl. Trybunalski 1.
 Madeyski Edward, ortoped. pl. Smolki 5.
 Mark Sal., pl. Maryacki 8.
 Rosenkranz Maur., Batorego 6.
 Weiss Ign., Akademicka 3.
 Zawirski Konst., Batorego 14.
 Zrogowski Jan, Batorego 6.
 W. Barański Antoni Prof., Chorażczynna 24.
 Błoch Józef. Sakramentek 4.
 Harasymowicz Dyonizy, Łyczakowska 4.
 Kubicki Leon, w. m. Sapiec.
 Kretowicz Paweł, n. szk. w.]
 Kulczycki Włodzim.
 Królikowski Stanisław.
 Lang Henr., Akademicki pl. 1.
 Markowski Tomasz.
 Markowski Zyg., Szkoła weter.
 Piotrowicz Stan., " "
 Sang Andrzej, Panieńska 6.
 Silberman Jak., Szkoła weter.
 Sochaniewicz Teof., Sakram. 3.
 Timoftiewicz Ludwik, Jabłonowskich 2.
 Zagórski Józef Antoni, Szkoła weteryn.
 Szpilman Joz. Dr. Prof.

1. Pow. Bialski.

D. Nycz Wincenty, Biała 1. p.
 Bogdanik Józ., " pr. szp.
 Kapelusz Eug., " 1. szp.
 Kwieciński Maciej, "
 Hess Ernest, "
 Sroczyński Jul., "
 Steuer Alfred, "
 Długolecki Ferd., Kęty 1. m.
 Dworzański Karol, "
 Garbusiński Sabin, "
 Łucki Sas Julian, Oświęcim.
 Schlank Maurycy " 1. m.
 Słosarczyk Antoni, "
 Wechsler Leopold, "
 Keller Rajmund, Wilamowice

Dr Miodoński Fr., Buczkowice.
C. Spelda Aleksander, Biała.
W. Dziurzyński Teofil, w. p.

2. Pow. Bobrecki.

D. Dorożyński Jak., Bóbrka. l. p.
Bober Jan, Chodorów.
Gabryszewski Tad., Bóbrka.
Jasilkowski Maryan, Strzeliska
nowe.
C. Sochacki Fel., Chodorów l. k.
Handt Izidor " l. m.
Roth Wolf, Bóbrka.
Sternberg Bern., Strzeliska.
W. Kruczkowski S. Bóbrka w. p.

3. Pow. Bocheński.

D. Pietrzycki Ant., l. p. Bochnia.
Fränkel Józef Bochnia.
Górski Czesław, " l. sal.
Nodzyński Bolesł., " Sek.sz.
Oświęcimski S., Bochnia pr. sz.
Roth Alojzy
Gąsiorek Franc., Łapanów
Rutowski Klemens, Łakta.
Majewski Tad., Niepołomice.
Łukasiewicz Walery, Wiśnicz
Olszewski Bronisł., Wiśnicz.
C. Wieselmann Mor., Wiśnicz l. m.
Kohn F.
W. Fertig Zygm., Bochnia w. p.

4. Pow. Bohorodczański.

D. Hyżycki Cyryl, as. sanitarny.
Fereusiewicz M., Bohorodcz.
Scherp Dawid, Łysiec.
W. Lang Henryk, w. p.

5. Pow. Borszczowski.

D. Goldhaber A., Borszczów l. p.
Mosler Maksymilian as. sanit.
Jarosiewicz Roman, Borszczów
Kittner Jakób,
Feuerstein Lejz., Korolówka
Altmann Zygm., Jezierzany.
Kraus Adam, Mielnica.
Krzyształowicz Aug., Skała.
Seidner Abraham, Skała.
C. Pöller Herman, Skała.
Mintzeles Lejs., Ujście biskup.
W. Tychowski W., Borszczów
w. p.

6. Pow. Brodzki.

D. Sobolewski Franc., Brody l. p.
Aufrecht Ozyasz, Brody.
Jung Wilhelm, Brody.
Jároszyński W., Szczurowice.
Kalach Feliks, Brody.
Leiblinger Fel., Brody, l. m.
Schapira Aleks., Brody l. sz.
Sołtysik Stan., " pr. sz.
Strumiński Adam, "
Madejski Wł., Pieniaki l. s.
Czerski Teofil, Toporów.
Ustrzycki Julian, Podkamień.
Landesberg Mojżesz, Załóżce.
C. Grünfeld Iz., Brody l. m.
Nussbaum Melchior, Podka-
mień l. m.
Rager Izidor, Załóżce.
Rosenbaum Leon, Łopatyn l. m.
W. Lubliner Leon, Brody, w. p.

7. Pow. Brzeski.

D. Nycz Henryk, Brzesko l. p.
Bernacki Franc., Brzesko,
Bernadzikowski Sz., "
Michalik Kazimierz, Radłów.
Grzybezyk Stan., Szczurowa.
Łowczowski Wiktor, Wojnicz
l. m.
Kisielewski Józef, Zaklicz. l. m.
Kluczyński Zbig., Zaklicz.
Janczy Fr., Czehów.
C. Czernek Henr., Wojn. l. m.
W. Kisiel Daniel, Brzesko w. p.

8. Pow. Brzeżański.

D. Skibicki Adam, lek. pow.
Teitelbaum Melech, Brzeżany.
Kowenicki Adam, Brzeżany.
Falk Bär, Brzeżany.
Uranowicz Tadeusz, l. m. "
Zauderer Albert, pr. szp. "
Barban Chaim, Kozowa.
Biliński Bogdan, Kozowa l. k.
Fleischman Adolf, Kozowa.
C. Łucyk Jakób, Kozłów.
W. Sigal H., Brzeżany w. p.

9. Pow. Brzozowski.

D. Lic Henr., Brzozów l. p.
Niziołek Paweł, Brzozów.

D. Benoni Ferdynand, Dynów.
Meth Sz., Dynów.
W. Małecki M., Brzozów w. p.

10. Pow. Buczacki.

D. Hirschler Miecz., Buczacz l. p.
Kroo Józef, „ „ l. m.
Krzyżanowski Edw., „ „ l. m.
Nacht Fabiusz, „ „
Feller Aron, „ „
Mogilnicki, „ „
Kromer Józef, Koropiec l. o.
Sokal Majer, Jazłowiec.
Koerner Ed., Monasterzyska.
Bobek Jan, Potok Złoty.
C. Mosler Mojżesz, Buczacz.
Adler Szymon, Monaster. l. m
W. Maykowski B., Buczacz w. p

11. Pow. Chrzanowski.

D. Berggrün Alfr., Chrzanów l. p.
Klein Leon, „ „ l. m.
Rieser Adolf, „ „
Woynarowski Kazimierz. „ „
Damski W., Jaworzno l. gór.
Hochbaum Oskar, Jaworzno.
D. Dura Józef, Krzeszowice l. s.
Schneck Karol, Szczak. l. f.
Steinkeller Hen., Trzebin. l. m.
Medwey Aleks., Siersza.
Bednarski J., Alwernia.
Murczyński Wład., Bobrek.
W. Ochniez Michał, Chrzan. w. p.

12. Pow. Cieszanowski.

D. Peters Józef, Cieszan. l. p.
Jüngst Wacław, Narol l. o.
Rosenblüth Ef., Lubaczów l. m.
Szymański Henryk, Lubaczów
Müldner Józef, Oleszyce.
C. Rotter As., Cieszanów l. m.
W. Serwacki Michał, Ciesza-
nów w. p.

13. Pow. Czortkowski.

D. Wagrowski K., Czortków l. p.
Bubeniczek Franc., em. lek.
pułk. Czortków.
Hausvater Jakób, Czortków.
Blaustein Józef, „ „
Stoeckl Adolf, Czortków l. m.
Lutyński L., Jagielnica l. fabr.

D. Rosenzweig Lejz., Jagielnica.
Pierzchała Kaz., Białobóznica.
C. Oestersetzer Ad., Czortków.
W. Marko Dymitr, Czortków
w. p.

14. Pow. Dąbrowski.

D. Kramarzyński Mieczysł., Dą-
browa l. p.
Millet Abraham, Dąbrowa.
Zareba Ant., l. m. sąd.
Rudnicki Karol, Szczucin l. m.
Przybyszowski W., Żabno.
C. Kluczycki Wit., Mędrzechów
W. Szczerba Jan, Dąbrowa w. p.

15. Pow. Dobromiński.

D. Bieńczewski Aleks., Dobro-
mil l. p.
Cwiklierc Ludw., Dobr. l. m. sa.
Puchalski Szczepan, Dobromil.
Marynowski Józef, Bircza.
Górski Stan., Robotyczne l. o.
C. Brauner Leon, Dobrom.
W. Dötsch Fr., Dobromil w. p.

16. Pow. Doliniański.

D. Borysiewicz Wikt., konc. san.
Kotłowski Stan., Dolina l. m.
Kosterkiewicz J., „ l. Salin.
Nowak Józef, Wygoda l. f.
Berwid Bol., Dolina.
Sekanina Jan, Perehińsko.
Ozarkiewicz, Rożniatow. l. o.
Krzyształowicz A., Węldziz.
l. o.
Podłuski Mikołaj, Bolechów
l. m. i kol.
Blumenthal Jakób, Bolechów.
C. Kułowski Leon, Bolechów
l. sal.
W. Fedorowicz Wł., Dolina w. p.

17. Pow. Drohobycki.

D. Janowski Ignacy, Drohobycz
l. p.
Dolnicki Cyryl as. s. „ „
Antoniewicz Włodz. l. m. „ „
Feuerstein H., „ „
Pelczar Zenon, „ „
Tiegermann Em., „ „
Friedmann Henr., „ „

- D. Wilder Izydor, Drohobycz
 Lechowski Wik. „
 Schechner Mich., Drohobycz.
 Sobieszczanski Ludwik, Medenice.
 Zieliński Tad., Podbuż, l. o.
 Bermann Dawid, Borysław.
 Löw Bernh., Borysław l. gór.
 Tenner Ignacy, Schodnica.
 Dwernicki Stanisław, Schodnica.
 C. Reich Baruch, Drohobycz l. m.
 Rosenöhl Joach. „ l. kol.
 Kelhofer Sam., Borysł. l. m.
 W. Łucki Jan, Drohobycz w. p.

18. Pow. Gorlicki.

- D. Frydman Z. Gorlice l. p.
 Bielewicz Feliks, „ l. m.
 Frühling Marc., „
 Kretowicz Walenty „
 Neumann Eugen. „
 Przesmycki Jan „
 Wroński B., em. l. p. „
 Katyński Ludwik, Biecz l. m.
 C. Koller Jerzy, Gorlice l. m.
 W. Biliński Włodzimierz, Gorlice w. p.

19. Pow. Grodecki.

- D. Balicki Stan., Gródek l. p.
 Tyszkowski Leon, Gródek.
 Geller Michał, Lubień.
 Udziela M., Janów l. o.
 C. Landau Ad., Gródek.
 Schöps Ignacy, Janów.
 W. Lille Ozyasz, Gródek w. p.

20. Pow. Grybowski.

- D. Jendel Sausenhofen Ignacy,
 Grybów l. p.
 Jakubowski Adam, Grybów
 l. m.
 Kurzyniec Wojciech, „
 Mańkowski Kaz., Cieżkowice.
 Potok H. „
 Treliński Mikołaj, Ryglie l. m.
 W. Hirsch Herm., Grybów w. p.

21. Pow. Horodeński.

- D. Schmidt Fil., Horodenka l. p.
 Palesten Henr., „ l. m.

- D. Kanafass Ozyasz, Horodenka.
 Roszko Antoni, Horod. l. sz.
 Madejski Boles., Kopeczyńce,
 Bujalski Maryan, Obertyn.
 C. Burnatowicz Rom., Obertyn
 l. m.
 W. Skuciński Jan, Horodenka
 w. p.

22. Pow. Husiatyński.

- D. Pohorecki Władysław, Husiatyn l. p.
 Korolik Tomasz, Husiatyn.
 Auerhahn Wilh. Chorostków.
 Wilson Rysz., Kopeczyńce.
 C. Hładij Sz., Chorostk. l. m.
 Margulies Elias, Husiatyn.
 Rares Izydor, Husiatyn l. m.
 Siebner Nath., Kopyczyńce
 Sobelsohn Daw., Probużna l. m.
 W. Nowicki Józef, Husiat. w. p.

23. Pow. Jarosławski.

- D. Marynowski Miecz., Jarosław
 l. pow.
 Dietzius Adolf, „ lek.
 m. kol.
 Feldmann Marek, „
 Friedwald Abr., „
 Meissels Zygm., „
 Mach S., „
 Plech Aur., Jarosł. em. l. p.
 Rossberger Sal. Jarosław.
 Trzaskowski Jul., Jarosław.
 Turzański Grzeg. „ l. m.
 Grosse Zenon, Moszczany.
 Babka Wacław, Radymno.
 Schmeidler Leon, „ l. k.
 Malik Józef, „
 Jastrzębski Walery, Sieniawa.
 David M., Sieniawa.
 Rodzoń Wład., Pruchnik.
 C. Ackerbauer Schmerl., Jarosł.
 Becher Salom., Jarosław.
 Thalheim Joachim, Pruchnik
 l. m.
 Morecki Pink., Sieniawa l. m.
 W. Kwieciński St., Jarosł. w. p.

24. Pow. Jasielski.

- D. Biesiadecki Jan, Jasło l. p.
 Szaynowski Maryan, „ as. sa.

D. Cieglewicz Stan. Jasło
 Hicner Aleks. " l. m.
 Kadyi Józef, Jasło s. sz.
 Macudziński Wal., Jasło pr. sz.
 Pawlicki Teodor, Jasło.
 Gałuszka Józef, Kołaczyce.
 Roth Józef, Krempna.
 Brill Krystyn, Żmigród.
 W. Pawlikiewicz Jan, Jasło w. p.

25. Pow. Jaworowski.

D. Hordyński Andrzej, Jawo-
 rów l. pow.
 Orski Jan, Jaworów.
 Gracka Józef, Krakowice l. s.
 Blech Bernard, Wielkie Oczy.
 C. Bendel Zygm., Jaworów.
 Gabel Rubin " "
 W. Bernstein Józ., Jaworów w. p.

26. Pow. Kałuski.

D. Wurst Adolf, Kałusz l. p.
 Kurowiec Jan " "
 Arnold Marek, Kałusz.
 Jastrzębski Julian, Wojniłów.
 C. Kieżeles Herm., " l. kol.
 Finkelstein Maur. " l. m.
 W. Hryniewiecki Emilian, Ka-
 łusz w. p.

27. Pow. Kamionecki.

D. Gawlikowski St., lek. pow.
 Stupnicki Wł., Kamionka l. m.
 Nadel R. " "
 Czerkawski Jul., Dziedziłów.
 Cink Aleks., Radziechów.
 Prebendowski Stanisław, Ra-
 dziechów.
 Pawluk Bazyli, Radziechów.
 Zaorski Bronisław, Busk.
 C. Raps Maks., Kamionka.
 Siegelbaum Jakób, Busk.
 W. Kałkowski Józef, Kamionka
 w. p.

28. Pow. Kolbuszowski.

D. Ciepeliowski Kazim., Kolbu-
 szowa l. p.
 Billig Elias, Kolbuszowa l. m.
 Woś Michał, Sokołów l. m.
 Bukowski Piotr, " "
 Dornfest Izydor, " "

D. Szóstkiewicz St., Majdan l. m.
 W. Wędrychowski J., Kolbus-
 szowa w. p.

29. Pow. Kołomyjski.

D. Rosner Maks., Kołomyja l. p.
 Silberstein Izydor, Kołomyja.
 Głaczyński Wł., " pr. sz.
 Hulles Jakób " "
 Jaworski Bolesł " "
 Kobryński Włod., " "
 Lewicki Zenobiusz, Kołomyja.
 Piaskiewicz Wł., " l. m. i k.
 Stauber Zygmunt " "
 Rosenheck Sal. " "
 Sysak Gabryel " "
 Zaleski K. " "
 Vincenz Aleks., Peczeniżyn.
 Kumer L., Jabłonowa.
 Schorsz Józ. " "
 Morawski Mateusz, Gwoździec.
 C. Berger, Kołomyja.
 Reder Eman., " "
 Mazacz Jan, Kołomyja.
 Ternier Hersch " "
 Zaleski Antoni " "
 W. Machalski, Kołomyja w. p.

30. Pow. Kosowski.

D. Coghen Antoni, Kosów l. p.
 Tarnawski Apolinary, Kosów.
 Bażant Wacł., Kosów l. sal.
 Frisch Józef, Kosów.
 Skomorowski Jan, Kutty l. m.
 Soniewicki Teodor, Żabie.
 C. Rudich Leon, Kosów.
 Berger Adolf, Kutty.
 W. Koniński Karol, Kosów w. p.

31. Pow. Krakowski.

D. Bielański G., Kraków l. p.
 Haim Leopold, a. s.
 Komorowski B., Zwierzyniec.
 Malinowski G., Czernichów.
 Topoliński Henryk, Prądnik
 biały.
 Ziarko Jan, Prądnik czerw.
 Królikowski Jan, Grzegórzki.
 Staniszewski Julian, Liszki
 l. o.
 W. Klich Karol, Kraków w. p.
 Rutkowski K. " " "

32. Pow. Krośniński.

- D. Słaczka Antoni, Krosno l. p.
 Humiecki Mod., Krosno.
 Kocay Aleks., Krosno.
 Mazurkiewicz Dyon., Krosno
 Wain Jan, Krosno.
 Kropaczek Wilhelm, Dukla.
 Reiss Karol, Dukla l. m.
 Przysłowski Jakób, Korczyn
 Rościszewski E., Iwoniec.
 C. Horak Karol, Dukla.
 W. Szydlowski Zenon, w. p.

33. Pow. Łańcucki.

- D. Witkowski Edw., Łańcut l. p.
 Fleszar Jan, Łańcut l. m.
 Sawicki Ant., Kańczuga.
 Zasacki Stanisław, Kańczuga.
 Nidecki Apolin., Leżajsk l. m.
 Michalik Józef, "
 Zawilski Stanisław, "
 Howiecki Mat., Przeworsk.
 Koncewicz Jan " l. m.
 Smyczyński J., Przeworsk.
 Lanes Salomon, Żołynia.
 Tryniecki Bol., Grodzisko.
 C. Arzt Ignacy, Łańcut l. sk.
 W. Duleba Maryan, w. p.

34. Pow. Limanowski.

- D. Ściborowski Kazim., l. p.
 Kruk Kazim., Limanowa.
 Herzig Naftali, Mszana. dolna.
 Wojtowicz Edmund, Mordarka.
 Orzeł Józef, Ujanowice.
 W. Atlas Herman w. p.

35. Pow. Liski.

- D. Jabłoński Jacek, Lisko l. p.
 Robel Wiktor, Baligród l. m.
 Jaremkiewicz Mich., Ustrzyki.
 Heftler Natan, Ustrzyki.
 Lenartowicz Roman, "
 Kłuszyński Karol, Lisko.
 Duleba, Lutowisko.
 C. Freysinger Józ., Lisko l. m.
 Propst Jakób, Lutowisko l. m.
 W. Audykowski M., Lisko w. p.

36. Pow. Lwowski.

- D. Obtułowicz Ferd., Lwów l. p.
 Kolhberger, Kulpark. s. sz.
 Maliszewski H. " pr. "
 Neusser Gust. " dyr. sz.
 Woszczyński J., Kulpark. p. sz.
 Kruszyński St. " "
 Gawacki Kar., Jaryczów nowy.
 Budzynowski Tad., Jaryczów.
 Acker Sal., Szczerzec.
 Stanowski Karol, l. f. Win-
 niki.
 C. Urieh Salomon, Szczerzec.
 W. Lang Henryk, Lwów w. p.

37. Pow. Mielecki.

- D. Warzycki Br., Mielec as. san.
 Bakowski Teofil, Mielec a. s.
 Kijas Błażej, Mielec em. l. p.
 Lorentski And., Radomyśl.
 Staniszewski Wład., Mielec.
 Sternberg Józef, Mielec.
 Cymbler Waleryan, Radomyśl.
 Jaroeki Piotr, Radomyśl.
 C. Schabus Em., Mielec l. m.
 W. Łukaszewski Andr., Mielec
 w. p.

38. Pow. Mościski.

- D. Lebedowicz Em., Mościska
 l. p.
 Rokossowski M., Sądowa W.
 Kosz Kornel, Krukiéniec l. o.
 Langer Józef, Mościska.
 Willer Abraham, Medyka.
 C. Körner Wilh., Mościska l. m.
 Raab Hen., Sąd. Wisznia l. m.
 W. Grochowski Kar. Mośc. w. p.

39. Pow. Myślenicki.

- D. Blumenfeld Henryk, Myśle-
 nice, l. p.
 Konarzewski J., Sułkowice l. o.
 Łodziński Wikt., Myśl. l. m.
 Dereniowski Bol., Jordanów
 l. m.
 Uchacz Bł., Maków l. sk.
 Steinberg Bernard, Maków.
 Zduń Józef, Skawa.
 Zduń Jan, Raba wyżnia.
 Lang Otokar, Rabka l. o.

W. Vergesslich Joz., Myślenice
w. p.

40. Pow. Nadworniański.

D. Szajna Józef, Nadwórna l. p.
Last Szymon, Nadwórna.
Bogdański Bronisł., Delatyn
l. m. i sal.
Polończyk, Delatyn.
Bibring Szym., Nadwórna.
C. Feuerstein Maur., Nadwórna
l. m.
W. Nestajko Euz., Nadwórna w. p.

41. Pow. Niski.

D. Loewy Alojz., Nisko l. p.
Bresiewicz Stan. Nisko l. g.
Hernich Franc., Rudnik l. m.
Reik Jakób, Ulanów.
Hand Jonatan, Ulanów,
C. Hand Saul, Ulanów l. m.
W. Piskorski Jan w. p.

42. Pow. Nowosądecki.

D. Filewicz Jan, N. Sącz l. p.
Czapliński St., N. Sącz pr. szp.
Kijas Tadeusz, „
Płochocki Tadeusz, „
Lehman Józef, „
Kołączkowski J., w l. Szczawn.
Kosterkiewicz Franc. „
Kozubski Ludw., N. Sącz l. k.
Ameisen Maurycy, „
Zieliński Edward, „
Mohr Dawid, „
Richter Józef, „
Silberman Leon, „
Dziembowski Józef, Muszyna.
Solecki Jan, Piwniczna.
Kmietowicz Fr., Krynica l. g.
Ebers Henryk, Krynica.
Roth Władysław, Krynica.
Chilewski Aleks., S. Sącz l. k.
Gawelkiewicz Leop. „ l. k.
C. Zauderer Maur., N. Sącz.
W. Sołtykiewicz Jan „ w. p.

43. Pow. Nowotarski.

D. Bednarski Jan. N. Targ l. p.
Schein Herman „ l. m.
Langsam Gutman, N. Targ.
Hammerschlag R., Krościenko.

D. Chramiec And., Zakopane.
Chwistek Bronisł. „
Piasecki Wenanty, „
Piasecki Eugeniusz. „
Beaurain Karol „
Florkiewicz Wład., „
Gaik Jan „
Hawranek M., „
Kruszyński St., „
Janiszewski I., „
Tyszkiewicz Winc., „
Zatłokał R., Czarny Dunajec.
W. Miziura Andrż., N. Targ w. p.

44. Pow. Pilzneński.

D. Januszkiewicz Ignacy (syn.),
Pilzno.
Fuchs Leon, as. s.
Januszkiewicz Ign. (ojc.) Pilzno
Mydlarski Wład., Pilzno.
Czerwiński Kaz., Brzostek.
W. Orzechowski Mar., Pilzno.

45. Pow. Podgórski.

D. Dębowski M., Podgórze l. p.
Aronsohn Sam., „
Dika Hubert „
Goldberger Izaak „
Keppler Paweł „
Pancewicz Izidor Podgórze
Śmorągiewicz Kaz. „ l. m.
Świątek Winc. „ l. k
Sumorok-Fegler K. Dębniaki.
Nawrat Stanisł., Skawina.
W. Olbrycht P., Podgórze, w. p.

46. Pow. Podhajecki.

D. Krzyżanowski Kalikst, Pod-
hajce l. p.
Choróbski Stan. pr. szp.
Salpeter, Podhajce.
Landau Aron, Podhajce.
Zirhoffer Karol, Wiśniowczyk
l. o.
C. Sternschuss Henr., Podhajce.
W. Mikolaschek Jan, Podhajce
w. p.

47. Pow. Przemyski.

D. Dzikowski Zygmunt, Prze-
myśl l. p.
Ciechański A., Przemyśl s. szp

Grabscheid Mojż., Przemyśl.
 Keller Maurycey, "
 Kiebuziński Baz., Przemyśl.
 Kutna Samuel, "
 Lityński Luc., " 1. k.
 Madejski Józef pr. szp.
 Mannheim M., 1. k. chor.
 Michalik Franc., "
 Pordes M., "
 Schoeffer Franc., (dentysta).
 Szyszkowski Mich., Przemyśl.
 Smolarski Zygm., " 1. m.
 Trybulec Franciszek, "
 Ziemiański Leon, "
 Salay Przem., "
 Godłowski Aleks., Dubiecko.
 Ruczka Stan., Niżankowice.
 C. Chilf Joach., Przemyśl (dent).
 Schnitzer, " "
 Biber Maur., " sek. szp.
 i więz.
 Salwer Joachim, Przemyśl.
 Talheim Joachim, "
 W. Fried Ferd., Przemyśl w. p.

48. Pow. Przemyślański.

D. Teodorowicz Tadeusz, Prze-
 myślany 1. p.
 Barbag Herman, Przemyślany.
 Moch Jan, Gliniany.
 Mendłowski Wł., Gliniany.
 Hordyński Stan., Baczów.
 C. Kostmann Ign., Przemyślany
 1. m.
 Kümmermann Sal., Gliniany.
 Sternberg Józef, Przemyślany.
 W. König Pinkas, Przemyślany
 w. p.

49. Pow. Rawski.

D. Lisiński Ludw., Rawa 1. p.
 Dadlez Julian, "
 Ożarowski Stanisław, Uhnów.
 Mieczulski Antoni, Niemirów,
 Jaciów Mikołaj, Magierów.
 C. Elner Mark., Niemir. 1. m.
 Herold Izidor, Rawa.
 Hirsch Henryk, Lubycza.
 Kibitz Bernard, Uhnów.
 Kibitz Natan, Rawa.
 W. Szymański Antoni, w. p.

50. Pow. Rohatyński.

D. Wasylewski Tyt., Rohatyn 1. p.
 Schaff S., "
 Terlecki Ant., " 1. m.
 Porycki Bronisł., Bukaczowce.
 Halarewicz B., Bołszowce 1. m.
 Gwozdecki Teofil, Lipica d. l.o.
 Hanakowski Włodz., Bursztyn.
 C. Goldschneider Jak., Bursztyn.
 W. Weissberg Abr., Rohatyn
 w. p.

51. Pow. Ropczycki.

D. Szczepański Włod., Ropcz. 1. p.
 Białkowski Wład. "
 Roller Fryderyk, " 1. m.
 Bentkowski Zygm., Dębica.
 Nowak W. Dęb. ca.
 Sędzielowski Fr. Sędziszów.
 Kronfeld Herman, "
 C. Benda Ant., Dębica 1. m i k.
 Reiss Elias, Dębica.
 Sztolzenberg Kar., Sędzisz.
 W. Panek Jan, Ropczyce w. p.

52. Pow. Rudecki.

D. Żelazowski Wiktor, 1. p.
 Śnieżek Ludwik, Rudki.
 Maciulski Józef, Kołbajówce.
 Jakiński Leon, Komarno 1. sk.
 Blauer Teodor, Komarno.
 W. Weissberg Adolf, Rudki w. p.

53. Pow. Rzeszowski.

D. Danielski Jan, Rzeszów 1. p.
 Bujniwicz Jakób. "
 Elsner Hirsch "
 Fiałkowski Wojc., "
 Grodecki Franc., "
 Głuszkiewicz Włod., "
 Jabłoński Stan., " pr. sz.
 Kraus Herman, "
 Niesiołowski Wł. "
 Herz Emanuel, "
 Segel Edward, "
 Zagórski Ad., " 1. m.
 Koepel Henryk. "
 Kolański Alfons, "
 Teller Józef, Rzeszów.
 Sieniewicz Mich. Błażowa 1. m.
 Biliński Mieczysław, Tyczyn.

D. Dobrowolski Adam, Głogów.
 C. Bernfeld Leon, Tyczyn l. m.
 Herzum Józ., Głogów l. m.
 Reiner Iz., Rzeszów.
 Rotter Herm., "
 W. Rasp Karol, Dr med., Rzeszów w. p.

54. Pow. Samborski.

D. Skalski Wł., Sambor l. p.
 Biegelmayer Alf., " p. s.
 Chrzasczczewski Woj., Sambor.
 Debicki Karol "
 Klaubner Adolf "
 Markiewicz Henryk "
 Waligórski Czesław, "
 Kędzierski Wład., Topolnica.
 Jessyp Aleksy, Sambor.
 Dreifach Izidor, Łąka.
 C. Bardasch Maurycy Sambor.
 W. Rożankowski Jan, Sambor w. p.

55. Pow. Sanocki.

D. Czyżewicz Wład., Sanok l. p.
 Piotrowski Edward, " as. s.
 Drewiński M., " l. szp.
 Edelheit Zygmunt "
 Kozłowski Emil, " l. m.
 Zaleski Karol, " l. w.
 Lemer Tytus "
 Kryński Józef " l. m.
 Herzig Fryderyk.
 Hendrychowski Stan. Jaśliska.
 Bielecki Ign., Rymanów.
 Eisenstein Joachim, Rymanów.
 Galant Józef, Zagórz l. k.
 Jodłowski Jan, Zarszyn.
 C. Stangenhaus Józ., Sanok s. szp.
 Atlas Sal., Bukowsko l. m.
 W. Wiliński Jan, Sambor w. p.

56. Pow. Skalański.

D. Iwański Karol, Skala l. p.
 Mizes Izidor, Skala.
 Wojtkowski Jan, "
 Sereth Izidor, Grzymałów.
 Schmetterling Adolf, Grzymałów.
 Dawid Salom., Podwoleczyska.
 Türkel Sam., Podwoleczyska.

D. Swiderski Bruno, Podwolecz.
 Gottfried Mojżesz, Skala.
 C. Bardach T., Touste.
 Berger Elias, Podwolecz.
 Starwer Maurycy, Skala.
 Metal Izaak, Podwolecz. l. m.
 W. Przykopa Rudolf, Skala w. p.

57. Pow. Śniatynski.

D. Werner Kar., Śniatyn l. p.
 Senensieb Marek, Śniatyn.
 Lic Feliks, Zabłotów.
 Langbang Boruch, Śniatyn.
 Mehrer Izidor, Śniatyn l. m.
 C. Pomeranz Izidor Śniatyn.
 Berger Aron, Śniatyn.
 W. Janoncz Stefan, Śniatyn w. p.

58. Pow. Sokalski.

D. Głowiński Winc., Sokal l. p.
 Jajus Miron, " l. m.
 Łuszczkiewicz J., "
 Urech Marek, "
 Kurasiewicz Józef, Bełz.
 Piżł Bronisław, Tartaków.
 Frostig Henryk, Bełz.
 Feuerstein El., Krystynopol l. m.
 C. Markl Józef, Wareż l. m.
 Pordes Sal., Krystynopol.
 Blum Zygmunt, Bełz.
 W. Eitelberg Br., Sokal w. p.

59. Pow. Stanisławowski.

D. Wolański Kaj., Stanisł. l. p.
 Jastrzębski Aleks. " as. s.
 Berghof Feliks. "
 Boral Henryk "
 Birer Jakób, "
 Csessnak Julian "
 Dawidowicz Emil, "
 Drzewicki Stefan, "
 Rubinstein Jakób, "
 Goldhaber Jak. " l. k. ch.
 Konkolnik Grze., " p. s.
 Kopaczynski Wład. " l. z. k.
 Lachawiec Apol., "
 Ochsenhorn Mojż., "
 Ostafiński Maryan, "
 Majewski A. " l. k.
 Stefanicki Jan, " dent,
 Sztencel Bernard "

D. Wnęgowicz St., Stanisławów.
 Żukowski Aleks. " "
 Zins Mojżesz, Halicz.
 l. m.

Mołczkowski Dyon., " l. k.
 Orzechowski Józ., Maryampol
 Pertak Henr., Czernelica.

C. Blaustein Edw. Stanisławów.

Grader Maur., " "
 Löwner Abraham " "
 Hoffman Jan " l. sz.
 Klaat Szymon " l. k.
 Rosenbaum Max., " "
 Szczepkowski Tyt., " l. kar.
 W. Grodecki M., " w. p.

60. Pow. Staromiejski.

D. Stokłosiński Fr., l. p.
 Mężyk Jan, Chyrów lek. zakł.
 wychow. OO. Jezuitów. l. m.
 Cieszewski W., Stara Sól.
 C. Obuszkievicz Stanisł., Stare
 miasto l. m.
 W. Raff Herman, Stare Miasto.
 w. p.

61. Pow. Stryjski.

D. Serkowski Bol., Stryj l. p.
 Kronenberg K., " k. s.
 Jeż Andrzej, " l. m.
 Stahlberger Teodor " "
 Meisels Jul., " "
 Jeger Izak, " "
 Czarnecki Julian, " "
 Papieski Antoni, " "
 Lippel Jakób, " "
 Peczenik Leon, " "
 Michalski Wiktor, Skole.
 Friedländer Mendel, Skole.
 Mironowicz Kor., " l. s.
 Nunberg Leon, Synowódzko
 górne l. okręg.
 C. König Iz., Stryj sek. szp.
 Rosenberg Nach., Stryj.
 Temple Dym., Stryj l. m.
 Kräuterblüth Jak., Skole.
 W. Smoluchowski Jan, w. p.

62. Pow. Strzyżowski

D. Krzyszkowski Erazm, Strzy-
 żów k. san.
 Taub Samuel, Strzyżów.

D. Karabiński Edm., Strzyżów.
 Patryn Józef, Strzyżów.
 Szczepański Tytus, Strzyżów.
 Natter Wiktor, Frysztak.

C. Spiegel Em., " "
 W. Pilch Ant., Strzyżów w. p.

63. Pow. Tarnobrzegi.

D. Momidłowski Walery, Tarno-
 brzeg l. p.
 Machalski Leon, Tarnobrzeg
 em. lek. pow.
 Orzechowski Leonard. " "
 Verstaendig Elias, Tarno-
 brzeg l. m.
 Radziński K., Rozwadów.
 Dumaire Wł., Rozwadów " "
 Hochstim Adolf, Rozwadów.
 Meller Jakób, Baranów.
 Kuzniar W., Grębów l. o.
 C. Hellmann Tob., Tarnobrzeg.
 W. Nowak Jan, Tarnobrzeg w. p.

64. Pow. Tarnopolski.

D. Gładyszowski Emil, Tarno-
 pol l. p.
 Mossor Kazimierz, Tarnopol
 as. s.
 Eckhard Józ., Tarnopol p. s.
 Gold Jakób, " "
 Leiblinger Izyd., " l. m.
 Kowenicki Walery " "
 Moszkowicz Jak. " "
 Frisch Julian " "
 Ochsenhorn Chaim. " "
 Münzer Maks., " "
 Rosenfeld A., Tarnopol. p. s. ż.
 Swistun Atan., " "
 Witoszyński Włodz. Tarnopol.
 Weissberg Zygm., " "
 Brudziński Ludw., Mikulińce.
 Koller Bolesław, " "
 Błoch Fr. " "
 C. Brauner Izidor, Tarnop. s. sz.
 Planer Jakób, " "
 Stein Adolf (dentysta). " "
 W. Rohr H., Tarnopol w. p.

65. Pow. Tarnowski.

D. Stanko Wojc., Tarnów. l. p.
 Biesiadzki Ant. " a. s.
 Ader Antschel, " "

D. Dintenfass Henryk, Tarnów.

- Eberson Maurycy, " "
 Foebus Izrael, " "
 Glaser Leopold, " "
 Glücksman Leon, " "
 Józefczyk Tad., " "
 Trammer Abrah., " "
 Kowalski Henr., " "
 Metzger Jan, " l. m.
 Pilzer Herman, " s. sz.
 Schützer Leon, " l. s. i.
 Skowroński Wł., " p. s.
 Waleczyński Józef, " l. m.
 Wolfram Adolf, " "
 Zbigniewicz Jan, " s. sz.
 Kalisz Al., Tuchów l. m.
 Starachowicz Jan, Tuchów.
 Cymbler Walery, Radomyśl.
 W. Sikorski Narcyz, w. p.

66. Pow. Tłumacki.

- D. Litwinowicz Orest, Tłum l. p.
 Hovurka Ant., l. f.
 Richter Arnold, Tłumacz l. m.
 Blumenblatt L., Tyśmienica.
 Laszkiewicz J., l. o. Niżniów.
 Regiec Jan, Ottynia.
 C. Philip Herman, Ottynia l. k.
 Pomeranz Filip, Tyśmienica.
 W. Gałek J., Tłumacz w. p.

67. Pow. Trembowelski.

- D. Kuhn Adolf, l. p.
 Opiński Jul., Trembowla.
 Glücksmann-Natan, Budzanów.
 Stoklassa Józ., Budz. l. m.
 Bryliński Józef, Janów.
 Deutsch Z., Trembl. l. k.
 Mrazek Bronisław, Strusów.
 C. Fischer Leon, Trembowla.
 Hrazdilek Ed., Strusów.
 Neustein Joach., Trembl. l. m.
 Rosenstock Ign., Budzanów.
 W. Cielenkiewicz, Trembowla
 w. p.

68. Pow. Turczański.

- D. Karpiński St., Turka l. p.
 Sekiewicz Franciszek, Turka.
 Żaduriewicz Emil, "
 Janikiewicz Stanisł., Borynia.
 C. Kelhofer Sal., Turka.
 W. Bardach Z., Turka w. p.

69. Pow. Wadowicki.

- D. Zawadziński Stanisław, Wadowice l. p.
 Bukowski August, Wadowice.
 Gedl Władysław, "
 Opydo Franciszek, "
 Zborowski Józef, Andrychów.
 Żedzianowski Stan., " l. m.
 Wiktor Michał, Andrychów.
 Landau Schachua, Andrychów.
 Lewandowski, Tłuczan.
 Tarchalski Józ., Zator. l. m.
 Nikłobore Jan, Zebrzydowice.
 Mikołajski S., Lanckorona.
 C. Erychleb Jan, Kalwaria.
 Weezerka August, Wadowice.
 W. Zörner Ferd., " w. p.

70. Pow. Wielicki.

- D. Kownacki J., Wieliczka l. p.
 Podobiński Ant., " l. m.
 Steiner Stan., " l. sal.
 Szpitzel Jakób, Wieliczka.
 Berger Maksymil., Dobczyce.
 Morawiecki Józef, Gdów.
 W. Waśniewski Jan, Wieliczka
 w. p.

71. Pow. Zaleszczycki.

- D. Friedberg Józef, l. p.
 Blutreich Izaak, Zaleszczyki.
 Sołowski Jan, " p. sz.
 Kittner Jakób, Zaleszczyki.
 Markstein Wilhelm, Zaleszcz.
 Kretz Ber., Tłuste l. m.
 Gilnreiner Michał, Uścieczko.
 C. Reischer Ignacy, Zaleszczyki
 sek. sz. i l. m.
 W. Banach A., Zaleszcz. w. p.

72. Pow. Zbarażki.

- D. Żukotyński Fr, Zbaraż k. s.
 Baczyński Eust. Nowe sioło,
 Berger Michał, Zbaraż l. m.
 Biliński Włodz., " "
 C. Mantel Maur., " l. sz.
 Reisner Wilh., " l. m.
 W. Horodnicki Mikołaj w. p.

73. Pow. Złoczów.

- D. Zaleski Eust., Złoczów l. p.

D. Gold Józef, Złoczów as. s.
 Heyne Bolesław " l. m.
 Stein Elias " l. k.
 Wysocki Aleks., " p. s.
 Bendel Samuel, "
 Malsburg Henryk, Pomorzany
 l. o.

Laufer Maurycy, Gołogóry.
 Piotrowski Tomasz, Olesko.
 Skórski Marj., Zborów l. m.
 Mazanek Ignacy, Sassów.
 Sturm Leon, Zborów.

C. Aderschläger Izaak, Biały
 Kamień l. m.

Hirschhorn F., Jezierna l. m.
 Fuchs Mojż., Olesko l. m.
 Raps Mayer, Pomorzany l. m.
 Petersil Józef, Zborów.

Bienenwald S., Sasów l. m.
 Tischner Dion, Złoczów s. sz.

Deutsch Hen., " l. m.

Eskreis Markus " s. sz.

W. Dorożyński T., " w. p.

74. Pow. Żółkiewski.

D. Opieński Jan, Żółkiew l. p.

Drzymalik Sylw., "

Muszkiet Karol " p. sz.

Fruchtman Fryd., "

D. Wyrzykowski Kaz., Żółkiew.

Finkel Herman, Kulików.

Olejniak Mich., Mosty Wielkie.

Newestiuk Jakób, "

Borzemski Antoni, Dobrosin.

C. Elner Sal., Żółkiew s. sz.

W. Urieh Leopold, Żółkiew w. p.

75. Pow. Żydaczowski.

D. Bory Julia, l. san.

Grabscheid, Żydaczów.

Kraetschmar Fel., Drohowyż

Mihowicz B., Rozdół.

Gozdecki Józ., Żurawno l. m.

C. Sakler Elias, " l. m.

Wehrn Leon, Mikołajów l. m.

W. Stupnicki A., Żydaczów w. p.

76. Pow. Żywiecki.

D. Kniehynicki Kl. Żywiec l. p.

Idziński Wiktor, " l. szp.

Seidler Ant., Żywiec l. sk.

Benda Maryan, Żywiec.

Gawlik Jan, Sucha l. sk. i kol.


Janota Rud., Weg. górka.

Blumenfeld Joa., Zabłocie.

C. Klein Ad., Rajcza l. sk.

W. Proskurnicki Anatol, Żywiec

w. p.



ALFABETYCZNY SPIS LEKARZY.

Skrócenia przy końcu nazwisk:

Kr. oznacza **Kraków.**

L. „ **Lwów.**

Numerą odnoszą się do powiatów.

Acker S. 36
Ackermann A. **Kr.**
Ader A. 65
Altmann Z. 5
Ameisen M. 42
Antoniewicz W. 17
Arnold. W. **L.**
Aronsohn I. **Kr.**
Aronsohn S. 45
Aschkenazy Z. **L.**
Auerbach E. **L.**
Auerhahn W. 22
Aufrecht O. 6

Baczyński E. 72
Babka W. 23
Balicki S. 19
Bałaban T. **L.**
Baraniecki R. **L.**
Barański A. **L.**
Barącz R. **L.**
Barbag H. 48
Barb L. 58
Barzycki J. 52
Batko J. **Kr.**
Bażant W. 30
Bąkowski T. 37
Bąrowicz A. **Kr.**
Beaurain K. 43.
Beck A. **L.**
Bednarski A. 68
Bednarski J. 11.
Bednarski J. 43
Benda M. 76
Bendel S. 73
Benoni F. 9
Bentkowski Z. 51
Berezowski K. **L.**

Berger L. **Kr.**
Blaustein J. 13
Bier Leonard **Kr.**
Berger M. 72
Berggrün A. 11
Berghof F. 59
Bermann D. 17
Bernacki F. 7
Bernadzikowski S. 7
Berwid B. 16
Bett M. **L.**
Białkowski W. 51
Bibring S. 40
Bieleński G. **Kr.**
Bielecki J. 55
Bielewicz F. 18
Biegelmajer A. 54
Bieńczewski A. 15
Bienkowski W. **L.**
Biliński W. 72
Bierer J. 59
Biesiadecki J. 24
Biesiadzki H. 65
Bikeles G. **L.**
Biliński Miecz. 53
Biliński B. 8
Billig E. 28
Blauer T. 52
Blech B. 25
Blatteis J. **Kr.**
Blumenfeld J. 76
Blumenfeld J. 10
Blumenblat L. 66
Blutreich J. 71
Bloch Fr. 64
Błotnicki T. **L.**
Bobek J. 10
Bober J. 2

Bobkiewicz H. **Kr.**
Bogdanik. 1
Bogdański W.
Bogdański B. 40
Bohosiewicz T. **L.**
Boral H. 59
Borzęcki **Kr.**
Borzęmski A. 74
Bory J. 75
Borysiewicz W. 16
Bossowski Al. **Kr.**
Braun S. **Kr.**
Bresiewicz S. 41
Brill K. 24
Broniowski A.
Browicz T. **Kr.**
Brudzewski K. **Kr.**
Brudziński L. 64
Bryliński J. 64
Bubeniczek F. 13
Budźynowski W. 36
Bujalski M. 21
Bujwid O. **Kr.**
Bujniewicz J. 53
Bukowski A. 69
Bukowski P. 28
Buszek J. **Kr.**
Buzdygan M. **Kr.**
Bylicki W. **L.**

Cercha M. **Kr.**
Chadzyński J. **L.**
Chilewski A. 42
Cholewicz F. **Kr.**
Chomin A. **L.**
Choróbski S. 46
Chramiec A. 43
Chrzasczczewski. 54

Chwistek Br. 43
 Ciechanowski Kr.
 Ciechański A. 47
 Cieglewicz S. 24
 Ciępielowski K. 28
 Cieszewski Wł. 60.
 Ciuk A. 27
 Coghen A. 30
 Csessnak J. 59
 Cwiklicer L. 15
 Cymbulski N. Kr.
 Cymbler W. 37
 Czaczkowski J. L.
 Czapliński S. 42
 Czarnecki J. 61
 Czarnik S. L.
 Czerkawski J. 27
 Czerny E. Kr.
 Czerski 6
 Czerwiński K. 44
 Czyżewicz A. L.
 Czyżewicz W. 55

Dadlez J. 49
 Damski W. 11
 Danielski J. 53
 Dawid S. 56
 Dawid M. 23
 Dawidowicz E. 59
 Dębicki K. L.
 Dębicki K. 54
 Dekański S. L.
 Dembowski M. 45
 Dereniowski B. 39
 Deutsch Z. 67
 Dietzius A. 23
 Dintenfass H. 65
 Dika H. 45
 Długolecki F. 1
 Dobiński W. L.
 Doboszyński L. Kr.
 Dobrowolski A. 53
 Dobrowolski S. Kr.
 Dobrzański S. Kr.
 Dobrzyński R. Kr.
 Doliński M. Kr.
 Dolnicki C. 17
 Domański S. Kr.
 Dornfest J. 28
 Dorożyński J. 2
 Dreifach I. 54
 Drewiński M. 55

Droba St. Kr.
 Drożdż B. Kr.
 Drzewicki S. 59
 Drzymalik S. 74
 Dubanowicz P. L.
 Dukiet J. 55
 Dujanowicz L.
 Duleba. 35
 Dumaire W. 63
 Dura S. 11
 Durst A. 26
 Dwernicki S. 17
 Dworzański K. 1
 Dziembowski J. 42
 Dziwoński W. Kr.
 Dzikowski Z. 47.

Ebers H. 42
 Eberson M. 65
 Eckhard J. 64
 Edelheit 55
 Ehrlich D. L.
 Eichhorn F. Kr.
 Eliasiewicz Z. Kr.
 Elias S. L.
 Elektrowicz E. L.
 Ellinger St. 34.
 Elsner H. 53.

Falk K. 8
 Fechter T. L.
 Feldmann M. 23
 Ferensiewicz M. 4
 Festenburg E. L.
 Feuerstein E. 58
 Feuerstein H. 17
 Feuerstein L. 5
 Feuerstein N. L.
 Fajersztajn I. L.
 Feller A. 10
 Fiałkowski L. L.
 Fiałkowski N. 53
 Fibich S. L.
 Filewicz J. 42
 Filimowski A. Kr.
 Filipkiewicz S. Kr.
 Finkel H. 74
 Fleischman A. 8
 Fleszar J. 33
 Flis Kr.
 Florkiewicz W. 43
 Foebus J. 65

Fraenkel J. 3
 Fraenkel L.
 Frankowski W. L.
 Fränkel H. Kr.
 Friedländer M. 61
 Friedberg J. 71
 Friedmann H. 17
 Friedwald A. 23
 Frisch Jul. 64
 Frostig H. 58
 Fruchtman F. 74
 Frühling M. 18
 Frydmann Z. 18
 Fuchs F. L.
 Fuchs L. 44

Gabryszewski A. L.
 Gabryszewski T. 2
 Gaik J. 43
 Galant J. 55
 Gans J. Kr.
 Garbusiński S. 1
 Gałuszka J. 24
 Gasiorek F. 3
 Gawacki K. 36
 Gawalkiewicz L. 42
 Gawlik J. Kr.
 Gawlikowski St. 27
 Gawroński A. 19
 Geller M. 19
 Gertler N. Kr.
 Gedl W. 69
 Gembarzewski Z. L.
 Gilnreiner M. 71
 Glaser L. 65
 Gładyszowski E. 64
 Głuchowski F. L.
 Gluziński A. L.
 Gluziński L. L.
 Glücksmann N. 67
 Glücksmann L. 65
 Głaczynski W. 29
 Głowacki B. L.
 Głowiński W. 58
 Głuszkiewicz W. 53
 Gold J. 73
 Gold J. 64
 Godłowski A. 47
 Goldberger I. 45
 Goldhaber A. 5
 Goldhaber I. 59
 Gołębiowski K. L.

Gońka A. L.
 Górniewicz Z. Kr.
 Górski C. 3
 Górski Ks. Kr.
 Górski S. 15
 Gostynski J. L.
 Gotfried M. 56
 Gozdecki J. 75
 Grabowski M. L.
 Grabscheid M. 47
 Grabscheid 75
 Gracka J. 25
 Grażyński E. Kr
 Grodecki F. 53
 Gross K. L.
 Grossek Z. 23
 Grzybezyk S. 7
 Gumowski F. 20
 Gwozdecki T. 50
 Gwiazdomorski J. Kr.

Haim L. Kr.
 Halarewicz B. 50
 Hand J. 41
 Hammerschlag R. 41
 Haisik K. L.
 Harajewicz J. Kr.
 Hausvater J. 13.
 Hanakowski W. 50
 Hawranek M. 43
 Heftler N. 35
 Hellmann. L.
 Hendrychowski T. 55
 Henzel St. L.
 Herman W. L.
 Hernich F. 41
 Herz E. 53
 Herzig F. 55
 Herzig N. 34
 Hess E. 1
 Heyne B. 73
 Himmelblau J. Kr.
 Hicner A. 24
 Hirsch D. Kr.
 Hirsch H. Kr.
 Hirschler M. 10
 Hlebowicki C. L.
 Hochbaum O. 11
 Hochstim A. 63
 Hojnacki W. L.
 Hordyński A. 25
 Hordyński S. 48

Hoszard F. L.
 Hovurka A. 66
 Hüchel L.
 Hülles J. 29
 Humiecki M. 32
 Hyżycki S. 63
 Jabłoński J. 35
 Jabłoński S. 53
 Jaciow M. 49
 Janczy Fr. 7.
 Janiszewski T. 43
 Jajus M. 58
 Jakliński L. 52
 Jakobi L. 60
 Jakubowski A. 20
 Jakubowski M. Kr.
 Jasilkowski M. 2
 Jangustyn St. Kr.
 Jana S. L.
 Janda F. L.
 Janikiewicz St. 68
 Janiszewski T. 43
 Jankowski S. Kr.
 Janota R. 76.
 Janowski J. 17
 Januszkiewicz J. o.
 44
 Januszkiewicz J. s. 44
 Jaremkiewicz M. 35.
 Jaroeki P. 37
 Jarosiewicz R. 5
 Jarosz St. 7
 Jarosz W. Kr.
 Jaroszyński W. 6
 Jasiński W. L.
 Jasiński A. L.
 Jastrzębski A. 59
 Jastrzębski J. 26
 Jastrzębski W. 23
 Jaszczurowski K. L.
 Jaworski W. Kr.
 Jaworski B. 29
 Jeger I. 61
 Jekeles L. L.
 Jendl J. 20
 Jessyp A. 54
 Jeż A. 61
 Jdźiński W. 76
 Jłowicki M. 33
 Jodłowski J. 55
 Jordan H. Kr.

Josse J. Kr.
 Józefczyk T. 65
 Junger J. Kr.
 Jung W. 6.
 Jüngst W. 12
 Jurowicz J. Kr.
 Jwański K. 56.
 Kaczorowski B. L.
 Kaczyński S. Kr.
 Kackowski K. Kr.
 Kaden K. Kr.
 Kadyj J. 24
 Kadyj H. L.
 Kalach F. 6
 Kalisz A. 65
 Kanafas O. 21
 Kapelusz E. 1
 Karaś A. Kr.
 Karabiński E. 62
 Karpiński S. 68
 Katyński L. 18
 Kaufmann M. Kr.
 Kaufmann O. L.
 Kędzior W. Kr.
 Kędzierski W. 54.
 Keller M. 47
 Keller R. 1
 Kepler P. 45
 Kieki T. L.
 Kiebusiński B. 47
 Kijas B. 37
 Kijas T. 42
 Kirschner A. Kr.
 Kisielewski J. 7
 Kittner J. 71
 Kittner J. 5.
 Klauber A. 54
 Klein L. 11
 Kleczyński Z. 7
 Kłaysy H. L.
 Kłuszyński K. 35
 Kmietowicz F. 42
 Kniehyniecki K. 76
 Kobryński W. 29
 Kobylański A. L.
 Kocay 32
 Koepel H. 53
 Koerner E. 10
 Kohn M. Kr.
 Kolasiński A. 53
 Kolberger 36

- Koller B. 64
 Kołaczkowski J. 42
 Komorowski B. 31
 Konarzewski J. 39
 Koncewicz J. 33
 Konkolniak G. 59
 Kopaczynski W. 59
 Kopff L. Kr.
 Korezyński E. Kr.
 Korezyński L. Kr.
 Korolik T. 22
 Korman J. L.
 Kosterkiewicz F. 42
 Kosterkiewicz A., 16
 Kosiński F. L.
 Kosiński L. L.
 Kościński F. Kr.
 Kossak L. L.
 Kostanecki A. Kr.
 Kosz K. 38
 Kotłowski S. 16
 Kowenicki W. 64
 Kowalski H. 65
 Kowalski E. L.
 Kowalski K. L.
 Kowenicki A. 8
 Kownacki J. 70
 Koy S. Kr.
 Kozierowski E. L.
 Kozłowski B. L.
 Kozłowski M. Kr.
 Kozłowski S. Kr.
 Kozłowski E. 55
 Kozubski L. 42
 Kraft K. Kr.
 Kraetschmar F. 75
 Krauss A. 5
 Kraus H. 53
 Kramarzyński M. 14
 Kramarzyński K. Kr.
 Krasowski S. L.
 Kretowicz W. 18
 Kretz B. 71
 Krobicki T. L.
 Krokiewicz A. Kr.
 Kromer J. 10
 Królikowski J. 31
 Kronfeld H. 51
 Krongold W. Kr.
 Kronenberg K. 61
 Kroó J. 10
 Kropaczek F. 32
 Kruk K. 34
 Kruszyński St. 43
 Krygowski T. L.
 Krynicki J. 55
 Kryński L. Kr.
 Krysakowski L.
 Krzyszkowski E. 62
 Krzyszkowski J. L.
 Krzyształowicz A. 16
 Krzyształowicz. 5
 Krzyształowicz F. Kr.
 Krzyżanowski E. 10
 Krzyżanowski T. 46
 Kucharski P. L.
 Kuhn A. 67
 Kummer L. 29
 Kunzek H. L.
 Kurasiewicz J. 58
 Kurkiewicz St. Kr.
 Kurowiec J. 26
 Kutna S. 47
 Kurzyniec W. Kr.
 Kuźniar W. 63
 Kwaśnicki A. Kr.
 Kwiatkiewicz S. L.
 Kwiatkowski St. Kr.
 Kwieciński M. 1.
 Łachawiec A. 59
 Łachowicz E. 55
 Łachowicz Z. L.
 Landau A. 46
 Landau F. L.
 Landau J. Kr.
 Landau S. 69.
 Landau R. Kr.
 Landesberg M. 6
 Lang O. 39
 Langbank B. 57
 Langer J. 38
 Langie A. Kr.
 Langsam 43
 Last S. 40
 Laszkiewicz A. 66
 Lanes S. 33
 Lateiner E. L.
 Latkowski K. Kr.
 Laufer M. 73.
 Lax J. Kr.
 Lebedowicz E. 38
 Lechowski W. 17
 Legeżyński W. L.
 Lehmann. 42
 Leiblinger F. 6
 Leiblinger J. 64
 Lemer T. 55
 Leinkram Z. Kr.
 Lenartowicz R. 35
 Leńko Z. L.
 Lewandowski J. 69
 Lewin A. L.
 Lewkowicz Ks. Kr.
 Lewicki Z. 29
 Lic F. 57
 Lilien N. L.
 Loewy A. 41
 Lic H. 9
 Lickendorf I. L.
 Lippel J. 61
 Lisiński L. 49
 Litwinowicz O. 66
 Lityński L. 47
 Lorentski A. 37
 Löw B. 17
 Lukas A. L.
 Lustig S. Kr.
 Lustgarten L. Kr.
 Lutyński L. 13.
 Ładniewski Kr.
 Łazarski J. Kr.
 Łepkowski W. Kr.
 Łodziński W. 39
 Łoniewski Kr.
 Łopaciński M. Kr.
 Łopacki L. L.
 Łowczowski W. 7
 Łucki J. 1
 Łukasiewicz W. 3
 Łuszczkiewicz J. 58
 Mach S. 23
 Mach A. L.
 Machalski L. 63
 Machek E. L.
 Maciulski J. 52
 Macudziński W. 24
 Mączka T. Kr.
 Madejski B. 21
 Madejski J. 47
 Madejski W. 6
 Mahl J. L.
 Majer J. Kr.
 Majewski T. 3,

Majewski A. 59
 Majewski A. **L.**
 Mallik J. 23
 Malinowski G. 31
 Maliszewski H. 36
 Malsburg H. 73
 Małaczyński R. **Kr.**
 Matzke H. **Kr.**
 Mannheim M. 47
 Mańkowski K. 20
 Marcisiewicz F. **Kr.**
 Marek A. 26
 Margulies M. **L.**
 Marischler J. **L.**
 Markiewicz D. **L.**
 Markiewicz H. 54
 Markstein W. 71
 Mars A. **Kr.**
 Marynowski J. 15
 Marynowski M. 23
 Masny I. **Kr.**
 MaziarSKI St. **Kr.**
 Meyer **L.**
 Mayer J. 19
 Mayzel T. **Kr.**
 Mazanek J. 73
 Mazurkiewicz D. 32
 Medwej A. 11
 Mehrer H. **L.**
 Mehrer J. 57
 Meisels J. 61
 Meissels Z. 23
 Meller J. 63
 Mendlowski W. 48
 Mendelsburg H. **Kr.**
 Merczyński E. **L.**
 Merunowicz J. **L.**
 Meschel J. **L.**
 Meth S. 9
 Metzger J. 65
 Meżyk J. 60
 Michalik Fr. 47
 Michalik J. 33
 Michalik K. 7
 Michalski W. 61
 Mieczulski J. 49
 Miihowicz Br. 75
 Mikołajski S. 69
 Milewski T. **L.**
 Millet A. 14
 Miodoński Fr. 1
 Mironowicz K. 61

Mieses I. 56
 Moch J. 48
 Mogilnicki. 10.
 Mohr D. 42
 Mołczkowski D. 59
 Momidłowski S. 53
 Momidłowski W. 63
 Morawiecki J. 70
 Morawski T. 29
 Mossing K. **L.**
 Mosler M. 5
 Mossor K. 64
 Moszkowicz J. 64
 Mrazek B. 67
 Mukowicz E. **L.**
 Müldner J. 12
 Münz E. **Kr.**
 Münzer M. 64
 Murczyński W. 11.
 Murdziński F. **Kr.**
 Muszkiet K. 74
 Mydlarski W. 44.

Nacht F. 10
 Nadel R. 27.
 Nartowski M. **Kr.**
 Natter W. 62
 Nawrat S. 45
 Neumann E. 18
 Neusser G. 36
 Newestiuk J. 74
 Nidecki A. 33
 Niemiłowicz W. **L.**
 Niemczynowski T. **L.**
 Nieszkowski Z. 42
 Niklibore J. 69
 Niziołek P. 9
 Nodzyński B. 3
 Nowak Jul. **Kr.**
 Nowotny Fr. **Kr.**
 Nowak Wład. 51
 Nowak J. 16
 Nowak Z. **Kr.**
 Nunberg L. 61
 Nycz W. 1
 Nycz H. 7

Obaliński A. **Kr.**
 Obrzut A. **L.**
 Obtułowicz F. **L.**
 Ochsenhorn M. 59
 Ochsenhorn Ch. 64


Olejnik M. 74
 Olpiński J. 67
 Olszewski B. 3
 Opiński J. 74
 Opolski W. **L.**
 Opydo F. 69
 Orski J. 25
 Orzechowski J. 59
 Orzechowski L. 63
 Orzeł J. 34
 Ostafiński M. 59
 Oświęcimski S. 3
 Ożarkiewicz. 16
 Ożarowski 49

Padalewski A. **L.**
 Pajaczkowski W. **L.**
 Palęster H. 21
 Papee J. **L.**
 Pancewicz J. 45
 Papiński A. 61
 Pareński S. **Kr.**
 Paszkowski S. **Kr.**
 Patryn J. 62
 Pawlicki T. 24
 Pawlikowski A. **L.**
 Pawluk B. 27
 Peczenik L. 61
 Pelczar Z. 17
 Penzias S. **L.**
 Pertak M. 59
 Peters J. 12
 Piasecki E. 43.
 Piasecki W. 43
 Piaskiewicz W. 29
 Piątkowski M. **Kr.**
 Pięniązek P. **Kr.**
 Piepes W. **Kr.**
 Pierzchała K. 13
 Pietrzycki A. 3
 Pilecki Z. **L.**
 Pilewski O. **L.**
 Pilzer H. 65
 Piotrowski A. **Kr.**
 Piotrowski E. 55
 Piotrowski G. **L.**
 Piotrowski J. **Kr.**
 Piotrowski T. 73
 Piórko A. **Kr.**
 Pisek W. **L.**
 Pivel E. **L.**
 Piżl B. 58

- Plech A. 23]
 Pluciński M. 36
 Płochocki T. 42
 Podlewski K. L.
 Podłuski M. 16
 Podobniński A. 70
 Pohorecki W. 22
 Polański St. L.
 Polonczyk 40
 Ponikło S. Kr.
 Pordes M. 47
 Porycki B. 50
 Potok H. 20
 Późniak M. Kr.
 Praschi I. L.
 Prebendowski S. 27
 Prus J. L.
 Przesmycki J. 18
 Przysłowski J. 32
 Puchalski S. 15
 Raczynski J. Kr.
 Raczynski A. Kr.
 Radecki P. Kr.
 Radziński K. 63
 Rapaport J. L.
 Rapp L. L.
 Reices D. L.
 Reifer A. Kr.
 Reik J. 41.
 Reinhold J. L.
 Reinhold Z. L.
 Reiss K. 32
 Reiss Wł. Kr.
 Regiec J. 66
 Reitzes D. L.
 Rencki R. L.
 Richter A. 66
 Richter J. 42
 Riedmüller B. Kr.
 Rieser 11
 Robel W. 35
 Rodzoń W. 23.
 Roicki A. L.
 Rokossowski W. 38
 Roller F. 51
 Rościszewski E. 32.
 Rosenblatt E. Kr.
 Rosenfeld A. 64
 Rosenzweig L. L.
 Rosner Al. Kr.
 Rosner Ig. L.
 Rosner J. L.
 Rosner M. 29
 Rosenblüth E. 12
 Rosenheck S. 29
 Rosenzweig J. 13
 Rossberger S. 23
 Roth J. 24
 Roszko A. 21
 Roth A. 3
 Roth W. 42
 Różecki J. Kr.
 Rozłucki M. 36
 Rożański J. L.
 Rubistein J. 59
 Rubinstein B. L.
 Ruczka S. 47
 Rudnicki K. 14
 Ruff St. L.
 Rutkowski Kr.
 Rutowski K. 3
 Rydygier L. L.
 Safian L. Kr.
 Salay 47
 Salpeter 46.
 Satkowski Z. Kr.
 Sawicki A. 33
 Sawicki E. L.
 Sawicki J. L.
 Schaitter J. Kr.
 Schaff S. 50
 Sekanina J. 16.
 Schapira A. 6
 Schechner 17.
 Schein H. 43
 Schellenberg L. L.
 Scherp D. 4.
 Schermant J. Kr.
 Schlank M. 1
 Schmeidler L. 23
 Schmelkes M. L.
 Schmetterling A. 56.
 Schmidt E. L.
 Schmidt F. 21
 Schoeffer F. 47
 Schneck K. 11
 Schneider L. Kr.
 Schöngut S. Kr.
 Schorsch J. 29
 Schramm H. L.
 Schumann F. K.
 Schützer L. 65
 Schwarz A. Kr.
 Ściborowski K. 34
 Ściborowski W. Kr.
 Sędzielowski F. 51
 Ségel E. 53
 Seidler A. 76
 Seidner A. 5
 Seifmann P. Kr.
 Selzer J. L.
 Senensieb M. 57
 Senkowski M. Kr.
 Serbeński W. L.
 Sereth J. 56
 Serkowski B. 60
 Serkowski R. L.
 Siedlecki J. Kr.
 Sielski S. L.
 Sieniewicz M. 53
 Sieradzki A. L.
 Sieradzki W. Kr.
 Sędzimir G. Kr.
 Śkiewicz F. 68
 Śiewierski P. Kr.
 Silbermann A. Kr.
 Silbermann L. 42
 Silberstein J. 29
 Silberstein S. L.
 Simon F. Kr.
 Singer M. L.
 Skalski W. 54
 Skalkowski B. L.
 Skibiński A. 8
 Skobel S. Kr.
 Skomorowski J. 30
 Skórczewski B. Kr.
 Skórski M. 73
 Skowronski W. 65
 Skrzyński S. Kr.
 Ślaczka A. 32
 Sliwiński M. Kr.
 Słosarczyk A. 1
 Ślupa W. Kr.
 Służewski K. Kr.
 Smitowski M. L.
 Smolarski W. Kr.
 Smolarski Z. 46
 Smoragiewicz K. 45
 Snieżek L. 52
 Sobierański W. L.
 Sobieszezański L. 17
 Sobolewski F. 6
 Sochacki Leon Kr.

- Sochanik S. **L.**
 Sochański J. **L.**
 Sokal M. 10
 Sokołowski H. **Kr.**
 Solecki J. 42
 Sołowski J. 71
 Sołtysik M. **Kr.**
 Sołtysik S. 6
 Soniewicki T. 30
 Spalke Z. **L.**
 Spira R. **Kr.**
 Spitzel J. 70
 Sroczyński J. 1
 Sroczyński F. **Kr.**
 Stachiewicz T. **L.**
 Stahlberger T. 61
 Stahr E. **Kr.**
 Staniszewski J. 31
 Staniszewski W. 37
 Stankiewicz F. **L.**
 Stankiewicz W. **Kr.**
 Stanko W. 65
 Stanowski K. 36
 Starachowicz J. 65
 Stark J. **L.**
 Stark W. **L.**
 Stauber S. **L.**
 Starzewski J. **L.**
 Stauber Z. 29
 Stefanicki J. 59
 Stein E. 73
 Steiner S. 70
 Steinberg B. 39
 Steinhaus J. **L.**
 Steinkeller H. 11
 Stenzel B. 59
 Sternbach D. **Kr.**
 Sternberg J. 37
 Steuer A. 1
 Stoeckl 13
 Stoklassa J. 67
 Stokłosiński F. 60
 Stopezański A. **Kr.**
 Strojnowski E. **L.**
 Strumiński A. 6
 Stupnicki W. 27
 Sturm L. 73
 Sumok K. 45.
 Surzycki J. **Kr.**
 Supiński E. **Kr.**
 Süsskind A. **Kr.**
 Świątek W. 45
 Świątkiewicz M. **L.**
 Świątkowski J. **L.**
 Świfalski L. **Kr.**
 Świątkowski S. **L.**
 Świerzewski L. **L.**
 Świdorski B. 56
 Świstun A. 64
 Syrup J. **Kr.**
 Sysak G. 29
 Szajna J. 40
 Szajnowski M. 24
 Szewczyk J. **Kr.**
 Szpilmann J. **L.**
 Szponder W. **Kr.**
 Szymański H. 12
 Szymkiewicz K. **Kr.**
 Szymonowicz W.
 Szyszkowski W. 47
 Szczepański W. 51
 Szczepański T. 62
 Szolajski J. 62
 Szostkiewicz S. 28
 Sztembarth C. **L.**
 Szulistański R. **L.**
 Szuszkiewicz P. **L.**
 Szydłowski Z. **L.**
Tabor B. L.
 Tarchalski J. 69
 Tarnawski A. 80
 Taub S. 62
 Tataarczuch W. **L.**
 Teller J. 53
 Teitelbaum M. 8
 Tenner J. 17
 Teodorowicz T. 48
 Terlecki A. 50
 Tiegermann Ern. 17
 Tokarski St. **Kr.**
 Torczyński T. **Kr.**
 Trammer A. 65
 Treliński M. 20
 Trybulec F. 47
 Topoliński H. 31
 Trzaskowski B. 23
 Trzciniecki K. **L.**
 Trzeiński B. **Kr.**
 Trzebiński P. **Kr.**
 Trzebiński R. **Kr.**
 Tryniecki B. 33
 Turzański G. 23
 Tuszyński F. **Kr.**
 Tükel S. 56
 Tyszecki T. **L.**
 Tyszkiewicz W. 44
 Tyszkowski L. 19
 Uchacz B. 39
 Udziela M. 19
 Uhma Cz. **L.**
 Unsin H. **Kr.**
 Uranowicz T. 8
 Urech 58
 Ustrzycki J. 6
 Verstaendig J. 63
 Vincenz A. 29
Wachholz L. Kr.
 Wachtel A. **L.**
 Wachtel Z. **Kr.**
 Wagrowski K. 13
 Wain J. 32
 Walezyński J. 65
 Walentowicz A. **Kr.**
 Waligórski C. 54
 Walkowski J. **Kr.**
 Wallach D. **L.**
 Warzycki B. 37
 Wasylewski T. 50
 Wasowicz Z. **Kr.**
 Wechsler E. **L.**
 Wechsler L. 1
 Wehr W. **L.**
 Weigel J. **L.**
 Weiss L. **L.**
 Weissberg Z. 64
 Wenclewski T. **L.**
 Werner K. 57
 Wernicki J. **L.**
 Wernicki K. **Kr.**
 Wicherkiwicz B. **Kr.**
 Wiczkowski J. **L.**
 Widmann O. **L.**
 Wiktor M. 69
 Wilder I. 17
 Wilkosz A. **Kr.**
 Willer A. 38
 Wilson R. 22
 Wiszniewski L. **Kr.**
 Witoszyński W. 64
 Witkowski E. 33
 Wnękowicz S. 59
 Wodziecki J. **Kr.**

Wojciechowski B.	Zakrzewski J. L.	Ziarko J. 31
Wojtkowski J. 56	Zaleski E. 73	Zieliński E. 42
Wójtowicz E. 43	Zaleski K. 29	Zieliński T. 17
Wolański K. 59	Zanietowski J. Kr.	Ziembicki G. L.
Wolfram A. 65	Zaorski B. 27	Ziemiański L. 47
Wolisz A. L.	Zaremba A. 14	Zins Mojżesz 59
Woś M. 28	Zarewicz A. Kr.	Zion O. L.
Woszczyński J. 36	Zasacki S. 33.	Zirhoffer K. 46
Woynarowski K. 11	Zatlokal R. 43	Zoll J. Kr.
Wroński B. 18	Zauderer A. 8	Zrogowski 22
Wróblewski W. Kr.	Zavadil T. L.	
Wurst A. 26	Zawadziński S. 69	Żelazowski W. 52
Wyrzykowski K. 74	Zawilski S. 33	Żedzianowski S. 69
Wysocki A. 73	Zbigniewicz J. 65	Zukowski A. 59
	Zborowski J. 69	Żuławski K. Kr.
Zadurowicz E. 58	Zduń J. 39 (ojc.)	Zurawski T. 33
Zagórski A. 53	Zduń J. 39 (syn)	Zukotyński J. 72
Zajączkowski J. L.	Zeitner J. Kr.	Żychon J. Kr.
Zakreys F. L.	Zgórski K. 88	Zydłowicz W. Kr.



SPIS CHIRURGÓW.



Ackerbauer S. 23	Biber M. 47	Feuerstein M. 40
Aderschläger J. 73	Bienenwald S. 74	Finkelstein M. 26
Adler S. 10	Blum Z. 58	Fischer L. 67
Arzt J. 33	Brauner J. 64	Freysinger J. 5
Atlas S. 55	Brauner L. 15	Fuchs M. 73
	Burnatowicz R. 21	
Bendl Z. 25		Gabel H. L.
Bardach T. 56	Chilf J. 47	Gabel R. 25
Bardasz M. 54	Chilf S. L.	Goldscheider J. 50
Becher S. 23	Czernek H. 7	Grabscheid M. L.
Benda A. 56		Grader M. 59
Bendel Z. 25	Deutsch H. 73	Grünfeld J. 6
Berger A. 30	Elner M. 49	
Berger A. 57	Ellner S. 74	Hand S. 41
Berger E. 56	Erychleb J. 69	Handt J. 2
Berger 29		Hellman T. 63
Bernfeld L. 53		Herold J. 49
Beschloss M. L.	Eskreis M. 73	Herzum J. 53

Hirsch H. 49
 Hirschhorn F. 73
 Hladij S. 22
 Hoffman J. 59
 Horak K. 32
 Hrazdilék E. 67

Kelhofer S. 68
 Kehlhofer S. 17
 Kibitz B. 49
 Kibitz N. 49
 Kiczales H. 26
 Klaar S. 59
 Klein D. 76
 Kluczycki W. 14
 Koller J. 18
 König J. 61
 Korner W. 38
 Kostmann J. 48
 Kräuterblüth J. 61
 Kreiner E. **L.**
 Kujłowski L. 19
 Kurzer L. **L.**

Landau A. 19
 Lateiner L. **L.**
 Letz S. **L.**
 Lisowski M. **L.**
 Loewner 59
 Łucyk J. 8

Madejski E. **L.**
 Margulles E. 22
 Mantel M. 72
 Mark S. **L.**
 Markl J. 58
 Mazacz 29

Metal J. 56
 Minceles L. 5
 Morecki P. 23
 Mosler M. 10

Neustein J. 67
 Nussbaum M. 6

Ostersetzer A. 13

Philipp H. 66
 Plahner J. 64
 Pöller H. 5
 Pomeranz F. 57
 Pomeranz J. 66
 Pordes S. 58
 Probst J. 35.

Raab H. 38
 Rager J. 6
 Raps M. 73
 Rares J. 22
 Reich B. 17
 Reiner J. 53
 Reischer J. 71
 Reisner W. 72
 Reiss E. 50
 Rosenbaum L. 6
 Rosenbaum M. 59
 Rosenberg N. 61
 Rosenkranz M. **L.**
 Rosenöhl J. 17
 Rosenstock J. 67
 Roth W. 2
 Rotter A. 12
 Rotter H. 53
 Rudich L. 30

Sakler E. 75
 Salver J. 47
 Schabbus E. 37
 Scheps J. 19
 Schnitzer P. 47
 Siebner N. 22
 Siegelbaum J. 27
 Sobelsohn D. 22
 Sochacki F. 2
 Spelda A. 1
 Spiegel E. 24
 Stangenhaus J. 55
 Starwer M. 56
 Sternberg B. 2
 Sternberg J. 48
 Sternschuss H. 46
 Stolzenberg K. 51
 Szczepkowski T. 59

Temple D. 61
 Terner H. 29
 Thalheim J. 47
 Tischner D. 73

Urich S. 36.

Weczerka A. 69
 Wehrn L. 75
 Weiss J. **L.**
 Wieselmann M. 3.

Zaleski A. 29
 Zauderer M. 42
 Zawirski K. **L.**
 Zrogowski J. **L.**



Ogólne przepisy pocztowe.

Należytości za listy zwyczajne w całym państwie austr. do wagi 20 gr. ($\frac{6}{10}$ l. ct.) jest 5 ct., nad 20 do 250 gr. (15 l. ct.) 10 ct., listy takie mogą być przy oddaniu opłacone lub nie, a wtenczas za listy niefrankowane do 20 gr. 10 ct., od 20 do 250 gr. 15 ct., listy za mało frankowane podlegają tej samej opłacie, z tą różnicą, że wartość przyklepionych marek odlicza się.

Za listy, które w miejscu doręczane bywają, opłaca się: do 20 gr. 3 ct., od 20 do 250 gr. 6 ct. Za nieopłacone, opłaca odbiorca 6 ct. do 20 gr.; 9 ct. do 250 gr.

Listy kartkowe po 3 ct. dla doręczenia adresatom w miejscu nadania zamieszkałym, jakoteż listy kartkowe po 5 ct., które do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec przesyłane być mogą.

Karty korespondencyjne po 2 ct. mogą być przesyłane do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec — karty te można wysyłać zagranicę z dolepieniem odpowiedniej należytości. Karty korespondencyjne mogą być rekomendowane jak listy za opłatą 10 ct. za rekomendację, lub przyklepieniem marki 10 ct.

Na listy rekomendowane otrzymuje się receptis. Należytość rekomendacyjna do wszystkich krajów europejskich wynosi 10 ct.

Jeżeli nadawca po upływie pewnego czasu nie otrzymał odpowiedzi, natenczas ma prawo przy urzędzie nadawczym zrobić zapytanie (reklamację) za opłatą 10 ct. Jeżeli zaś był dołączony receptis zwrotny, natenczas reklamacja nie podlega żadnej opłacie; jeżeli pokaże się, że list zaginął, wtenczas ma prawo żądać wynagrodzenia 20 złr., gdy list był do miejsca w obrębie monarchii położonego adresowany, zaś 21 złr., gdy był za granicę wysłany.

Na listach rekomandowanych nie można kłaść żadnej wartości; mogą zaś być tylko zalepiane. Listy rekomendowane do Prus i Niemiec mogą być posyłane na koszt adresata. Przy listach rekomandowanych, jakoteż i zwykłych, zaleca się także: na odwrotnej stronie listu podać imię i nazwisko oddawcy (w razie, jeżeli taki list zwrócony zostanie, by mógł być oddawcy doręczonym).

Na listy rekomendowane przesyłane w kraju służy reklamacja w przeciągu 6 miesięcy, do urzędów zagranicznych rok cały, od dnia oddania listu; po upływie określonego terminu, chociażby list zaginął, oddawca nie ma prawa do wynagrodzenia.

Druki. Do państwa Austriackiego, Bośni, Hercegowiny, ks. Lichtenstein oraz Niemiec wynosi opłata: do 50 gr. 2 ct., do 150 gr. 3 ct., do 250 gr. 5 ct., do 500 gr. 10 ct.; do 1 kilogr. 15 ct. Waga nie może przenosić kilogr. (2 fnt. ct.). Niedostatecznie opłaconych druków nie wysyła się, lecz zwrócone są oddawcom.

Listy z pieniędzmi winny być zaopatrzone w kopercie trwałej pięcioma pieczęciami, w urzędowej zaś kopercie dwiema, lub też jeżeli wartość przenosi 500 złr., a waga 250 gramów, przynieść je można na pocztę, ale nie zapieczętowane, aby urzędnik mógł sprawdzić kwotę znajdująca się w nich, wtenczas jednak portoryum musi być zaraz uiszczono i wynosi 50⁰/₁₀ więcej, niż zwyczajne.

Gotówkę brzęczącą posyłając, należy obwinąć w papier i przypieczętować wewnątrz koperty, aby się nie poruszała.

Opakowanie. Przedmioty małej wartości, którym przyciśnięcie nie szkodzi, nie przepuszczające tłuszczu lub wilgoci, nie przenoszące ciężaru 5 kilogr., na nie wielką odległość pakować można w papier mocny i obwiązać sznurkiem.

Powziętki pocztowe w kraju (Nachnahme). Wolno wysyłać przesyłki do wszystkich w kraju poczt monarchii austr., jakoteż węgierskiej za pobraniem do wysokości 500 złr.

Przekazy pieniężne (Postanweisungen). Za pośrednictwem urzędów pocztowych można przekazywać wypłaty w kraju do wysokości 500 złr. w. a.

Przesyłający opłaca porto przyklepieniem marki do 10 złr. 5 ent., od 10 do 50 złr. 10 ent., do 150 złr. 20 ct., od 150 do 300 złr. 30 ct., od 300 do 500 złr. 50 ct.

Drogą zaś telegraficzną przyjmują i wypłacają przekazy pieniężne i znaczki pocztowe (Postanweisungen) do wysokości 500 złr. w. a. Przy posyłkach przekazów drogą telegraficzną opłata pocztowa jest ta sama, co przy przekazach zwykłych, z dodatkiem opłaty depeszy zawisłej od ilości słów.

Przekazy za granicę mogą być przesyłane do całych Niemiec, Szwajcaryi, Bawaryi i Wirtembergu, Bułgaryi, Rumunii, Turcyi i Egiptu, jako też do Stanów zjednoczonych Ameryki, jak również ze wszystkich tych krajów do Monarchii austr. i węgierskiej. Blankiety są inne jak w kraju. Kwoty mogą być przesyłane do wysokości 200 złr. albo 400 marek czyli 500 franków.

Zlecenia pocztowe. Za pośrednictwem urzędów pocztowych można ściągać od innych osób drobne wierzytelności do wysokości 500 złr. Blankietów nabywa się w urzędach pocztowych po cenie $\frac{1}{2}$ centa; a dołączysz dokument (n. p. weksel, rachunek lub kwit itp.), przesyła się w kopercie zapieczętowanej, jako opłacony list polecony pod adresem urzędu pocztowego, gdzie debent mieszka.

W razie uiszczenia kwoty na blankiecie wyrażonej, wydaje poczta adresatowi załączone dokumenta, a pieniądze przesyła wierzytelowei za przekazem, po straceniu zwykłej należitości przekazowej.

Zlecenia pocztowe są i do Niemiec dozwolone; w takim razie wierzytelności obliczają się na austriacką monetę wedle kursu wiedeńskiego.

Pod jedną kopertą można więcej zleceń naraz wysłać, ale nie trzeba zapomnieć o dołączeniu dokumentu każdego zlecenia, gdyż w takim razie zlecenie musiałoby być zwrócone bez skutku.

Pocztowe Kasy oszczędności. Niemal wszystkie pocztowe urzęda

Listy pilne. Jeżeli oddawca życzy sobie, ażeby list natychmiast po odejściu do miejsca przeznaczenia był doręczonym, winien dopisać na kopercie po lewej stronie u dołu „*doręczyć zaraz przez umyślnego posłańca*“ (expres). Za to dopłaca się 15 ct., jeśli adresat mieszka w miejscu, gdzie się znajduje urząd pocztowy. Za każde $7\frac{1}{2}$ kilometra (milę) odległości od urzędu pocztowego płaci się posłańcowi 50 ct., zawsze jednak adresat jest odpowiedzialny za uiszczenie przypadającej kwoty. Na kopercie można i godzinę oznaczyć, o której list musi być koniecznie wręczony. — Należytość uiszcza się przyklepianiem marek odpowiedniej wartości, zaś przy pieniężnych, gotówką. Za doręczenie awiza razem z przesyłką opłata wynosi 30 ct.

Taryfa opłaty listów.

Do	Należytość za opłatę				
	Listy		kor. kart.	Druki	
	za każde gr.	ent.		za każde gr.	ent.
Belgii, Bułgarii, Chin (p. Rosyę)	15	10 5		50	3
Danii i Islandyi	"	10 5		50	3
Egiptu	do " 15	5 "		do " 50	2
Niemiec z Alzacyą i Lotarynią,				" 250	5
Helgoland i Luxenburg . . .	nad 15	10 2		" 500	10
	-- 250			" 1000	15
Francyi z Algierem	15	10 5		50	3
Gibraltar przez Niemcy	15	10 5		50	3
Grecyi i wysp Japońskich, Korfu,					
Cefalonia, Zante	15	10 5		50	3
Wielkiej Brytanii i Irlandyi . .	15	10 5		50	3
Włoch	15	10 5		50	3
Czarnogóry	15	7 4		50	2
Niderlandów	15	10 5		50	3
Norwegii	15	10 5		50	3
Persyi przez Rosyę	"	" "		"	"
Portugalii z Madera i w. Azorskich	15	10 5		50	3
Rumunii (Mołdawii i Wołoszczyzny)	15	10 5		50	3
Rosyi z Polską	15	10 5		50	3
Stany Zjednocz. Północn. Ameryki	"	" "		"	"
Szwajcaryi	15	10 5		50	3
Serbii (z Węgier)	15	5 4		50	2
(z Austrii)	15	7 3		50	2
Hiszpanii	15	10 5		50	3
Tureyi europ. i azyatyckiej przez					
Tryest, Belgrad, Orsowę . . .	15	10 5		50	3


austryackie przyjmują wkładki począwszy od 50 ct., na które wydają bezpłatne książeczki. Kwoty wyżej 1 złr. procentują się wedle stopy 3 $\frac{1}{2}$ %, a wypłata tychże następuje po skończonym roku.

Wkładki do wysokości 20 złr. można podjąć natychmiast w jakimkolwiek większym urzędzie pocztowym, wyższe zaś wkładki wolno odebrać tylko z asygnatą urzędu kas pocztowych oszczędności w Wiedniu, dokąd należy wprzód wypowiedzenie przesłać.

Na każdą wkładkę wydaje centralny zarząd kas pocztowych w Wiedniu potwierdzenie, które przechowywać trzeba, a w razie gdyby takowe nie nadeszło, należy natychmiast reklamować. Wszelkie przesyłki i korespondencje są bezpłatne.

Jednej osobie nie wolno posiadać więcej książeczek nad jedną, pod utratą kapitału włożonego, również nie wolno wkładać naraz kwoty wyżej 300 złr., a roczna wkładka nie może przenosić 1000 złr. Wkładki większe mogą być użyte na zakupno państwowych obligacyi, które pocztowy zarząd kupuje na żądanie i wystawia właścicielowi książeczkę (Renténbüchel).

Celem ułatwienia zebrania kwot mniejszych do 50 ct., służą karty oszczędności po cenie 5 ct., na które częściowo nalepią się zwykłe znaczki pocztowe; gdy wartość ich wynosi 50 ct., przyjmuje się je jako gotówkę na książeczkę oszczędn.



SKALA STEMPLOWA.

SKALA I.

na weksle.

					złr. ct.
	Do	75	złr.	—	05
nad	75	złr.	"	150	" — 10
"	150	"	"	300	" — 20
"	300	"	"	450	" — 30
"	450	"	"	600	" — 40
"	600	"	"	750	" — 50
"	750	"	"	900	" — 60
"	900	"	"	1050	" — 70
"	1050	"	"	1200	" — 80
"	1200	"	"	1350	" — 90
"	1350	"	"	1500	" 1—
"	1500	"	"	3000	" 2—
"	3000	"	"	4500	" 3—
"	4500	"	"	6000	" 4—
"	6000	"	"	7500	" 5—
"	7500	"	"	9000	" 6—
"	9000	"	"	10500	" 7—
"	10500	"	"	12000	" 8—
"	12000	"	"	13500	" 9—

Od każdych zaś następnych 1500 złr. o 1 złr. więcej, przy czem jednak kwoty poniżej 1500 złr. uważane będą za pełne.

SKALA II.

kwity i dokumenta w sprawach prawnych.

					złr. ct.
	Do	20	złr.	—	07
nad	20	złr.	"	40	" — 13
"	40	"	"	60	" — 19
"	60	"	"	100	" — 32
"	100	"	"	200	" — 63
"	200	"	"	300	" — 94
"	300	"	"	400	" 1 25
"	400	"	"	800	" 2 50
"	800	"	"	1200	" 3 75
"	1200	"	"	1600	" 5—
"	1600	"	"	2000	" 6 25
"	2000	"	"	2400	" 7 50
"	2400	"	"	3200	" 10—
"	3200	"	"	4000	" 12 50
"	4000	"	"	4800	" 15—
"	4800	"	"	5600	" 17 50
"	5600	"	"	6400	" 20—
"	6400	"	"	7200	" 22 50
"	7200	"	"	8000	" 25—

Nad 8000 złr. od każdych 400 złr. opłaconą być ma należność wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po złr. 1 ct. 25, przyczem sumy niżej 400 złr. uważają się jako pełne.

SKALA III.

ugody pożyczkowe, kontrakty służbowe, kwity na wygrane loteryjne.

					złr. ct.
	Do	10	złr.	—	07
nad	10	złr.	"	20	" — 13
"	20	"	"	30	" — 19
"	30	"	"	50	" — 32
"	50	"	"	100	" — 63
"	100	"	"	150	" — 94
"	150	"	"	200	" 1 25
"	200	"	"	400	" 2 50
"	400	"	"	600	" 3 75
"	600	"	"	800	" 5—

					złr. ct.
nad	800	złr.	Do	1000	złr. 6 25
"	1000	"	"	1200	" 7 50
"	1200	"	"	1600	" 10—
"	1600	"	"	2000	" 12 50
"	2000	"	"	2400	" 15—
"	2400	"	"	2800	" 17 50
"	2800	"	"	3200	" 20—
"	3200	"	"	3600	" 22 50
"	3600	"	"	4000	" 25—

Nad 4000 złr. od każdych 200 złr. opłacaną być ma należność wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po 1 złr. 25 ct., przyczem sumy niżej 200 złr. uważają się jako pełne.

RABKA.



**Najsilniejsza solanka jodobromowa,
tuż przy stacyi kolejowej, na 510
metr. nad poziom morza, wśród
pysznych gór położona.**

**Łazienki urządzone wzorowo
i z komfortem, wanny marmu-
rowe, metalowe, drewniane.**

Mieszkania obszerne, wygodnie umeblow.

Restauracya pierwszorzędna.

**Czytelnia dzienników i wypożyczal-
nia książek obficie zaopatrzona.**

Poczta i telegraf w miejscu.

Omnibus zakładowy przy każdym pociągu.

Sól Rabczańska

**lecnicza jodowa do kąpieli w domu
i okładów, prawdziwa tylko w orygi-
nalnych pudełkach à 1 klg. po 1 złr.**

**10 ct. do nabycia we wszystkich
aptekach i składach wód mineralnych.**


Specyalność!
Mikroskopy
1-rzędnej jakości.

Nowość:
Ferrrometer

według
Dra Jollesa
do oznaczenia
zawartości że-
laza we krwi.

Haemometer

Fleischla
zmodyfikowany
przez
prof. Mischera.



Optyczny Instytut
C. REICHERTA

Wiedeń VIII Bennogasse l. 24 i 26.

**Fabryka narzędzi chirurgicznych
i przyrządów ortopedycznych,
opasek**

(założona w roku 1840)

H. REINER

Wiedeń

IX, van Svietengasse 10,
Niederlage:
I., Franzensring 22.

Wiedeń 1873.
Dwa medale.

Tryest 1882.
Złoty medal.

Sydney 1879.
Srebrny medal.

Melbourn 1880.
Złoty medal.

Wszystkie w chirurgii i w ogóle
w medycynie używane narzędzia
i przyrządy potrzebne do pielęgnowania chorych, wreszcie opatrunki w doborowym gatunku, po umiarkowanych cenach.

Wyłączna

Fabryka Termokauterów
Dra Paquelin'a.

Illustrowany cennik, oprawny w płótno, zawierający 1800 rysunków i tekst objaśniający, przesyła za opłatą 3 złr. w. a. Przy zamówieniu powyżej 30 złr. załącza się katalog bezpłatnie.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.

Polecone
przez Towarzystwo lekarskie w Krakowie

Mleko wielokrotne krakowskie

oraz

mleko dla niemowląt

prof. dra Gaertnera

wyłącznie wyrabia

E. DOBRZYŃSKA.



Składy w Krakowie.

- 1) Mleczarnia E. Dobrzyńskiej, Sławkowska 12.
- 2) Taż mleczarnia, plac WW. Świętych 10.
- 3) Droguerya „pod czarnym wilkiem“ Zopotha, Sienna 12.
- 4) Skład optyczny J. Lańskiego, róg ul. Krakowskiej i Dietla 43.

W Podgórzu.

Droguerya Żarskiego.

We Lwowie.

O otwarciu i miejscu rozsprzedaży ogłosi
się później.

Wyłączność wyrobu została zastrzeżona.



ŻEGIESTÓW

Zakład zdrojowo-kąpielowy nad Popradem

miejsce odslonięta tylko od południa, wyniesiona 486 mtr.
nad poziom morza.

Stacya kolei żelaznej, poczta i telegraf w miejscu.

Najsilniejsza szczawa żelazista,
kąpiele borowinowe, mineralne, popradowe i hydro-
patyczne, znakomita górska stacya klimatyczna,
mleko, żentyca.

Pora kąpielowa trwa od 20 Maja do końca Września.

Wskazania lecznicze:

Zboczenia w odżywieniu i przemianie pierwiastków,
choroby układu nerwowego, dróg oddechowych,
przewodu pokarmowego, narządu moczopłciowego,
choroby kobiece, przewłoczne zatrucia (Rtęć, alko-
holizm, morfinizm), przewłoczne choroby zakaźne.

Woda Żegiestowska przyjemna jako napój
zastępuje Franzensbadską


jest do nabycia we wszystkich składach wód mine-
ralnych i aptekach tak w Galicyi, jak i w Kró-
lestwie Polskiem.

Wysyłka rozpoczyna się z dniem 15 Marca i trwa aż do zimy.

Skrzynia zawierająca 40 flaszek kosztuje na dworcu
w Żegiestowie 7 Złr. 50 ct., skrzynia o 20 flasz. 4 Złr.

Woda Żegiestowska zawiera w 1000 częściach:

Dwuwęglanu litowego	0,0244
" wapniowego	1,5828
" żelazowego	0,0544
Kwasu węglowego istotnie wolnego	2,9961

 Wszelkich bliższych wyjaśnień udziela na
żądanie **Zarząd Zakładu.**

WODA IWONICKA

jest z powodu zawartości
znacznej ilości kwasu węglowego
bardzo przyjemną do picia.

Sól iwonicka

tudzież

Ług iwonicki

są znakomitymi dodatkami do kąpieli
w chorobach skrofulicznych.

Do nabycia we wszystkich aptekach, składach
wód mineralnych, tudzież wprost w zarządzie.

Adres: Zarząd zdrojowy Iwonicz.

Dyrektor Zakładu
Dr Róściszewski.

IWONICZ



zakład zdrojowo kąpielowy.

Woda: szczawa słona jod i brom zawierająca
prócz tego:

znakomite kąpiele borowinowe
tudzież obojętne ciepłe i zimne w osobno
urządzonych łazienkach **hydropatycznych.**

Woda iwonicza

**z powodu znacznej ilości kwasu węglowego jest
bardzo przyjemną do picia.**

Tak woda iwonicza jak ług i sól do ką-
pieeli są do nabycia we wszystkich aptekach.

Lekarze: Dr Kl. Dębicki lekarz zakładowy,
i Dr Rościszewski. — Położenie Iwonicza
przeszło 400 metrów n. p. m. wśród lasów
szpilkowych, śliczne spacery. Zakład po-
siada przeszło 600 pokoi wygodnie i po-
rządnie urządzonych. — Apteka zaopatr.
w wszelkie wody mineralne. — Na rok
bieżący miejsca spacerowe znacznie roz-
szerzone, łazienki borowinowe nowo z kom-
fortem urządzone. — Kościół w zakładzie,
msza św. codziennie.

Zakład gimnastyczny w miejscu.

Doskonała muzyka zakładowa.

Stacya kolejowa, poczta i telegraf w miejscn.

Sezon od 20 maja do 20 września.

W I. sezonie (do 20 czerwca) i w III.
(od 20 sierpnia) mieszkania o 30% tańsze.

Wszelkich wyjaśnień udziela Zarząd zakładu.

Dyrektor Zakładu Dr E. ROŚCISZEWSKI.



ZAKŁAD WODOLECZNICZY

D^{ra} Piaseckiego
w Zakopanem,

✎ otwarty przez cały rok. ✎

Położenie najpiękniejsze i najzdrowsze,
wśród balsamicznego lasu świerkowego.

Środki lecznicze: umiejętna hydro-
terapia, massage, gimnastyka lecznicza,
elektroterapia, żywienie dyetetyczne.

Pokoje mieszkalne z komfortem
urządzone. Sale do zabaw, czytelnie,
biblioteka, fortepian, przybory do gier
i t. p. uprzyjemniają pobyt gościom.

Kuchnia wyborna.

**Cena 3 złr. i wyżej od osoby dziennie
za wszystko.**

Szczegółowe prospekty i cenniki zarząd
rozsyła na żądanie.

APTEKA
PIOTRA MIKOLASCHA

we Lwowie, Kopernika 1

poleca

WINA LECZNICZE

i wody leczniczo gazowe

własnego wyrobu

odszezególnione zaszczytnemi świadec-
twami P. T. pp. Lekarzy.



Wszelkie nowe środki
lecznicze stale na składzie.



Główny skład barwików
i chemicznych preparatów
do mikroskopii z fabryki
Dra G. Grüblera & Comp.
w Lipsku.

ADASIÓWKA

ZAKŁAD LECZNICZY

D^{ra} CHWISTKA

z wielkim komfortem urządzony, otwarty
tylko w letnim sezonie w najpiękniejszym
położeniu.

w Kuźnicach w Zakopanem.

Cena od 4 złr. wyżej.

ZAKŁAD WODOLECZNICZY

D^{ra} CHWISTKA

na Krupówkach w Zakopanem

otwarty rok cały,
bardzo wygodnie urządzony. Werandy
do leżenia na świeżem powietrzu (liege-
cur), łazienki, sale do zabaw itd.

Cena od 3 złr. wyżej.

DOM ZDROWIA

dla umysłowo chorych

Dra KAROLA ŻUŁAWSKIEGO

Docenta Psychiatrii,

w Krakowie, ul. Długa L. 82

Telefonu Nr 159,

konces. przez Wys. c. k. Namiestnictwo galic.

Przyjmuje osoby dotknięte chorobą umysłową, alkoholistów, morfinistów, jakoteż osoby dotknięte wszelkiego rodzaju nerwicami, połączonemi ze zboczeniem umysłu.

Leczenie odpowiednio do postępu nauki, hydro- i elektroterapia w miarę potrzeby.

Dom zdrowia urządzony z komfortem, nie ustępuje w niczem pierwszorzędnym podobnym Zakładom zagranicznym, położony w najzdrowszej dzielnicy miasta wśród ogrodów. Dla przyjemności chorych jest czytelnia, fortepian, rozmaite gry, wspólna sala jadalna. Staranna opieka, wszelkie wygody i towarzyskie życie wśród rodziny są zapewnione.

Ceny wraz z opieką lekarską i zupełnem utrzymaniem od 5 do 10 złr. dziennie, stosownie do umowy i wymagania.

Właściciel Zakładu przesyła na żądanie program, jakoteż udziela wyjaśnień ustnych lub pisemnych.

Konc, Zakład fabr. wód min. sztucz.

K. RZĄCY i CHMURSKIEGO

w Krakowie

przyrządza pod kontrolą komisji przemysłowej
Towarzystwa lekarskiego.

Wody sztuczne:

Selterska	flaszka	16	ct.
Bilińska	"	15	"
Gieshüblerska $\frac{1}{2}$ litr. 10 ct. $\frac{3}{4}$ litr.	"	14	"
Vichy, Grande-Grille i Celestins			
flaszka duża 40 ct. mała	"	25	"
Kissingen Rakoczy	"	20	"
Maryenbadzka	"	20	"

Wody lecznicze:

Bromowa mocna i słabsza	flaszka	28 i 20	ct.
Kwaśna sod.	flaszka	15	"
Żelazista, pyrofosforanowo żelazna			
mocna i słabsza,	"	25 i 22	"
Jodowa	"	20	"
Litowa	"	20	"
Hygieniczna sodowa	"	10	"

Bilińska szczawa rodzima

najznakomitsza szczawa alkaliczna

Wypróbowane od najdawniejszych czasów źródła lecznicze dla chorób nerek, pęcherza, żołądka, podagry, nieżytu oskrzelowego, hemoroidów itd.

. Znakomity dyetetyczny napój.

Rozbiór chemiczny profesora Drą Gintla
krajowego chemika w Pradze.

w 10.000 cz.:

węglanu sod. . 33.1901
siarkanu sod. . 6.6679
węglanu wapna 3.6312
chlorku sodow. 3.9842
siarkanu wapn. 2.4194

węglanu magnt. 1.7478
węglanu lit. . . 0.1964
stałych części . 52.5532
kwasu węgl. . . 16.4077
Temperatura 10°—11° C.

Zakład leczniczy Sauerbrunn

(kolei żelazn. Praga-Dux i Pilzno-Priesen)

kąpiele z komfortem urządzone, wanny, parówki, elektr. kąpiele,
zakład wodolecznicy kompletnie urządzony.

Lekarz zdrojowy Med. Dr Wilhelm Reuss.

Ze szczawy Bilińskiej wyrabiane

Pastilles de Bilin

(kołaczyki trawienne Bilińskie)

uznane jako

wyborny środek w zaburzeniach w trawieniu.

Na składzie we wszystkich składach wód mineralnych,
aptekach i droguoryach.

Zarząd zdrojowy w Bilinie (Czechy).

Kąpiele Salzbrunn na Szląsku

Stacya kolei Wrocław Halbstadt.

Pora zdrojowa od 1 maja do początku października,

dawno znane alkaliczne źródła, Oberbrunnen; ogromne obszary w górach położone, powietrze górskie, wspaniałe zakłady mleczne i żółteczne (wyjałow. mleko, kefir, ośle, owcze, kozie mleko), pneumatyczny gabinet i t. d. wskazany w chorobach szyi, dróg oddechowych i płuc, w nieżytych żołądka i jelit, w chorobach wątroby (kamieniach żółciow.) dnie, skazie moczanowej i cukrówce.

Lekarze zdrojowi: Radea sanit. Dr Nitsche, lekarz sztabowy Dr Pohl, Dr Determeyer, Dr Montag i Dr Ritter.

Rozsyłka Oberbrunnen przez pp. Furbach i Striebold
w „Bad Salzbrunn“.

książęco plesska Dyrekcyja w „Bad Salzbrunn“.

Kąpiele Landeck na Szląsku.

Znane od wieków

źródła lecznicze siarczku-sodu. Cieplice (28'5 C.)

Stacya klimatyczna, 440 mtr. ponad powierzchnię morza. — Wskazane szczególnie w chorobach kobiecych, dnie i goścu.

Pora zdrojowa od maja do połowy września.

Od r. 1898 będzie Landeck stacyą kolej.

Miejsce to ma wodociągi. — 6000 osób leczy się.

— o PROSPEKTA BEZPŁATNIE. o —

Magistrat.

Znowu znacznie niższe ceny.

Perlae et Capsulae medicinales „Hygea“

CREOSOTAL

(Creosotum carbonicum „Heyden“).

Pudełko	100	perełek	po	0·10	1,20	złr.
„	100	„	„	0·20	1,60	„
„	100	„	„	0·30	2,00	„
„	100	kapsulek	„	0·50	2,60	„
„	100	„	„	1·00	5,00	„

Creosoti carbonici 0·10

Morrhuali 0·20

pudełko 100 kapsulek 1,80 złr.

Guajacolum carbonicum.

Pudełko	100	perełek	po	0·05	1,20	złr.
„	100	„	„	0·10	1,80	„
„	100	„	„	0·20	2,80	„
„	100	kapsulek	„	0·30	3,80	„

Tylko w oryginalnych pudełkach.

Część zysku składam na dom akademicki.

Maryan Zahradnik

w Złoczowie.

Tańsze jak zagraniczne
dziurkowane
pastylki sublimatowe

(Pastilli Sublimati perforati)

„ZAHRADNIK“

polecane

przez Towarzystwo lekarskie krakowskie.

Pastylki nie zawijane w mul kauczkowy 500 sztuk po 0·5 sublimatu 4 złr. 20 ct.

Pastylki zawijane w mul kauczkowy, z sygnaturą, 500 sztuk po 0·5 sublimatu 6 złr. 20 ct.

Pastylki zawijane w mul kauczkowy, z sygnaturą, w rurkach po 5 sztuk à 1·0 lub po 10 szt. à 0·5 w pudełkach.

1 pudełko = 5 rurek = 50 past.
à 0·5 1 złr.

1 pudełko = 5 rurek = 25 past.
à 1 0 60 ct.

Część zysku składam na Dom akademicki.

Maryan Zahradnik

w Złoczowie.

Wystawa krajowa
Lwów 1894.
Medal złoty
i **Medal srebrny**
Izb handlowych.

„**HYGEA**”

Praga 1896.
2. międzynarodowa
Wystawa
farmaceutyczna
Dyplom honorowy
i medal państwowy.

chem. farm. Laboratorium **MARYANA ZAHRADNIKA**

w Złoczowie

poleca nadal łaskawym względem PP. Lekarzy

perelki i kapsułki lecznicze „Hygea”,

uznane przez Towarzystwo lekarskie krak.
za najlepsze i najtańsze.

Pudełka oryginalne po 50 i po 100 sztuk.

Ceny stałe oznaczone.

Do nabycia we wszystkich Aptekach

Skład główny dla Krakowa
w Aptece P. OTOWSKIEGO.

P. T. pp. Lekarzy, którzy chcą przepisać kapsułki mego
wyrobu, **upraszam usilnie** aby w interesie chorych raczyli
dodać na receptę:

„**fabric. Zahradnik in scatula originall**”,

ceny bowiem oryginalnych pudełek są o połowę niższe
od cen podług taxy.

Część zysku składam na Dom akademicki.

Maryan Zahradnik.

Ludwik Knapiński

Na żądanie WW. PP. Doktorów wykonuję narzędzia chirurgiczne we własnej fabryce podług ostatnich ulepszeń, wymagań nauki, które przy zupełnej doskonałości i dokładności w wykończeniu odznaczają się stosunkowo niskimi cenami.

Uważałem też za potrzebne wejść w stosunki z pierwszorzęd. domami specjalności chirurgicznej za granicą, a to odnośnie do przedmiotów, które dziś jeszcze nie mogą należeć do obrotu krajowego przemysłu i takowemi w odpowiedniej ilości skład swój zaopatrzyłem, iżby w każdym wypadku natychmiast być w możności zadość uczynienia wszelkim żądaniom WW. PP. Doktorów.

Nie wątpię, iż będę mógł pod każdym względem zadość uczynić żądaniom WW. PP. Doktorów, gdyż pracując przeszło lat 15 w tym zawodzie, czuję się być zupełnie wydoskonalonym, a rzetelnością i punktualnością w wypełnianiu wszelkich zleceń, mam nadzieję zaskarbić sobie poparcie z ich strony w szerszym zakresie.

Wszelkich informacyj udziela się franco podług nadesłanego adresu.

Przy zamawianiu większych partij instrumentów, ustępuje się stosow. procent.

Ludwik Knapiński

dostawca dla c. k. klinik Uniw. Jag.
narzędzi chirurgicznych
maszyn ortopedycznych
bandaży i instrumentów
do intubacyi.

Pierwsza fabryka w Galicyi

popierana przez Szanowną

Komisję przemysłową Tow. Lek. Krakow.

i odznaczona wielkimi meda-
lami srebrnemi za staranne
wyrabianie narzędzi odpowia-
dających wszelkim wymaga-
niom tak co do trwałości jako-
też dokładności.

Adres telegraficzny:

„Knapiński, Kraków.”

Kraków, Sławkowska 4.

Leczenie przez odzwyczajanie

(„Entziehungscuren“)

Dr Fromme, Stellingen (Hamburg).

Styryjski krajowy zakład leczniczy **Szczawy Rohitsch**

Stacya kolei połud. Pöltschach, Stac. Krapina kol. Zagoryańska.

Pora zdrojowa od Maja do Października.

Podalpejski, łagodno-wilgotny klimat, kąpiele żelazne, zakład wodoleczniczy z pływalnią, masaż, elektryczność, żetyca i kefir, doskonała restauracya i kawiarnia, wspa-
niały dom zdrojowy, czytelnia, biblioteka, wielka orkie-
stra, koncerty i bale. Stały urząd telegraficzny i poczt.
Apteka. Kolejowe karty sezonowe i powrotne po zni-
żonych cenach we wszystkich kasach pryw. kolei po-
łudniowej. Wynajęciem mieszkań zajmuje się Dyrekeya.
Prospekta i broszury na żądanie.

Źródła Tempel i Styria, dawno znane szczawy glau-
berskie. Doskonały środek w chorobach narządu pokar-
mowego i oddechowego. Źródło **Tempel** jako orze-
zwiający napój. — *Sprzedaż krajowych szczaw Rohitsch*
przez Zarząd zdrojowy i we wszystkich składach wód
mineralnych, w głównym składzie w Gracu i we Wie-
dniu, I. Sommerfelsgasse 4.

Nowość!

Radlaura gumowe bougies do macicy i cewki moczowej

15 cm. ugie, elastyczne a jednak trwałe. Do stosowania w ginekologii z dodatkiem: acid. tannic. 20⁰/₀, alumen 10⁰/₀, cinereum sulfuricum, sulfocarbolic. 10⁰/₀, jodoform i tannina 0.1 do 15⁰/₀. — Przeciwno rzeżączkom z dodatkiem: acid. tannicum 20 5⁰/₀, alumen 5⁰/₀, zincum sulfuricum, sulfocarbolicum 5⁰/₀ jodoform z tannina od 0.05 do 5⁰/₀ działają równocześnie mechanicznie w zwiężeniach cewki. Mogą zawierać salol, thallinum, nosophenum, jodolum, alumnolum. Tuzin 12 złr.

Antisepticum Rotterin także przeciwno ropieniom na bł. śluz. wybitnie skuteczny. (Zob. Therap. Monatsh. 1894, X.) Oryginalny stoik z 10 pastylkami 30 kr.

Radlaura Antinervin proszek (peptonizowany salicyl-bromanilid zob. Therap. Monatsh. zeszyt VI, str. 258, 271, 273), zastępuje antypirynę we wszystkich przypadkach bez szkodliwego działania ubocznego; że znakomitą skutkiem stosowana przez wiele powag medycznych, w klinikach rządowych i prywatnych w **influency, asthmie, migrenie, gruźlicy płuc, gorączkach zakaźnych, gościcu, dnio, nerwobolu.** 4 razy tańszy od antypiryny — dawka 0.50, 4 razy dnia. 100 gramów 3 złr.

Radlaura Somnal, tylko w formie płynnej, skuteczny, nie-szkodliwy środek nasenny, bez działania ubocznego; nawet przy dłuższem nżyciu. Dawka pół łyżeczki w mleku. Doświadczenia dokonane w klinikach rządowych i szpitalach wykazały, że Somnal Radlaura przewyższa w szybkości sprowadzania snu chloral i sulfonal. 100 gramów 8 złr.

Dra Friedlaendera deserowe dragées z pepsyną i kwas.


solnym, najlepszy przetwór pepsynowy polec. przez prof. Eulenbura, prof. Dra Bergmanna, prof. Dra Strucka, prof. Dra Senatora. Każda pigułka zawiera 0.10 czystej pepsyny i 1 kroplę czystego kw. solnego. 3 razy dnia 2—3 pigułek.

Radlaura czopki z Hamamelis przeciw hemoroidom, pudełko 60 ct. poleceny w wiedeńskich pismach lekarskich.

Radlaura środek przeciw tasiemcowi, tysiąc razy wypróbowany, składa się z 18 kapsulek Extr. filic. mar. aether., kussiny i ol. ricini. Pewny skutek w pół godziny. Pudełko 2 złr.

Wyrabia fabryka aptekarza Radlaura, Berlin W. Friedrichstr. 160.

Główny skład we Wiedniu, u aptekarza Maks Sobela, I. Wolzeile 14 i w Aptece c. i k. polnej, I., Stefansplatz 8.



Dra Römpler ZAKŁAD DLA CHORÓB PŁUCNYCH

w **Görbersdorfie** na Szląsku,
istniejący od roku 1875.

Stacya kolej. Friedland, okręg polit. Wrocław.

Leczenie odbywa się w zimie i w lecie.

Terapia odpowiada najnowszym doświadczeniom
poczynionym na klinikach.

Specyalne leczenie
cierpień krtani, nosa i uszów.

Wielki dom leczniczy

i dwie wille urządzenie
według wymagań hygieny
(ogrzewanie wodą)
położone w środku parku
zakładowego w obszarze
318 morgów, z tego 115
lasów.

Kąpiele i tusze

wzorowo urządzone według
najnowszych konstrukcyi.

Wielki, dobrze przewietrzany
ogród zimowy.

Zbudowana weranda ochroniona
od wiatrów do leczenia się na
wolnem powietrzu — połączona
z domem leczniczym.

Marientbad

sól glauberską i żelazo zawierające i ziemnoalkaliczne źródła, kąpiele gazowe, borowinowe, żelaziste, parowe, gorące powietrzne, zakład hydropatyczny. Skuteczny w chorobach żołądka, wątroby, w zastoju silnym, cierpieniach pęcherza, cierp. kobiecych, niedokrewności, cukrówe i t. d.

Rozsełka wody przez osobne **biuro wysyłkowe**, naturalnych soli i pastylek przez **Salzsudwerk**. — Nowa kolonada, elektryczne oświetlenie miasta, wodociągi, polow., rybołówstwo.

Pora zdrojowa od 1-go maja do 30-go września.

Frekwencya 20.000 (bez przejezdnych).

Prospekty na żądanie rozseła magistrat miasta.

Zakład dla leczenia chorób nerwowych w **Görlitz**.

Zakład leczniczy dla chorych nerwowych, zakład dla umysłowo chorych. Lekarska opieka dla nerwowo i umysłowo chorych w wieku młodzieńczym i dziecięcym.

Na żądanie prospekt.

Dr. Kahlbaum, Rad. sanit.

Zakład lekarsko-wychowawczy
dla nerwowo i umysłowo chorych w wieku młodzieńczym i dziecięcym
(nie dla idiotów) w **GÖRLITZ**.

Obok mojego zakładu dla leczenia chorób nerwowych ma mój zakład wychowawczy za zadanie w przypadkach rozwijania się obłąkania moralnego w wieku młodocianym, a gdzie dłuższe przebywanie pod ustawiczną opieką lekarską jest wskazane, dostarczenie dostatecznej opieki tym chorym i podanie ich wpływowi pedagogicznemu przez odpowiednie nauki i cielesne ćwiczenia.

Obszerny opis na żądanie.

Dr. Kahlbaum, Rad. sanit.

Dra Barwińskiego

zakład wodoleczniczy

Zamek Elgersburg

w lesie turyngskim. — 320 metrów nad p. m.
Stacja kolejowa.

Najstarszy
i najlepiej po-
lecony

zakład leczniczy
Niemiec.

**Masaż, elektryczność,
gimnastyka, dietetyka, ką-
piele wszystkich rodzajów.**

Premiowane: Ostenda, Stuttgart
i Erfurt 1894, gdzie niniejszy zakład
uzyskał jedyne najwyższe od-
szczęgólnienie ze wszystkich wód
turyngskich.

Bliższe szczegóły w prospektach.

Z zapytaniami zwrócić się należy do właściciela
rady san. **Dra Barwińskiego i R. Schenka.**

Bergquell-Frauendorf
przy Szczecinie.

ZAKŁAD
leczniczy i wychowawczy
dla chorych, umysłowo i nerwowo.

Przyjęcie chorych umysłowych następuje bez
trudności na warunkach prospektu, który
bezpłatnie bywa rozesłany.

Radca sanitarny **Dr. Zenker**,
właściciel i kierujący lekarz.

Dr. Fedor Plessner.

ZAKŁAD LECZNICZY

dla

nerwowo chorych.

Wiesbaden, Sonnenbergerstr. 30.

Leczenie wszystkich organicznych i czynnościowych zбоceń układu nerwowego także i morfinizm.

— Wykluczone psychozy. —

Mała ilość chorych. — Centralne ogrzewanie — Elektryczne oświetlenie.

Wiesbaden.

Dra Lehra zakład leczniczy Bad Nerothal.



**Sanatorium dla chorób nerwowych
i chorób krwi, gościec, dna.**

Zakład wodoleczniczy w Schreiberhau w Karkonoszach (Riesengebirge),

wspaniałe, osłonięte górskie położenie 710 m. nad p. m., otoczone na milę ciągnącymi się lasami szpilkowymi, z powodu łagodnej, jednostajnej ciepłoty nadają się także do leczenia w zimie. Wskazania: choroby krwi, nerwów, kobiece, dna, gościec, wszystkie choroby przewlekłe. Stosuje się: leczenie wodą, masaż, gimnastykę leczniczą, elektryczność, dyeta.

Wiadomości i prospekty przez

Dr Assmana, A. Jeuchnera.

Dra Kleudgena **Zakład leczniczy i wychowawczy**

dla nerwowo i umysłowo chorych

w **Obernigk** pow. Wrocław;

połączony z otwartym zakładem do leczenia chorób systemu nerwowego, w szczególności hysteryi, hypochondryi, neurastenii i chorób rdzenia przedłużonego — jak również dla **ozdrowieńców po psychozach.**

➡ Trzy duże ogrody do spacerów. ⬅

Bliższe szczegóły w prospektach wysyłanych na żądanie. Wszelkie korespondencje wysyłać pod adresem:

Dr Kleudgena zakład leczniczy w Obernigk, Wrocław.

Dr Kleudgen,
Wrocław.

Dr Tornier,
Obernigk.

Zakład leczniczy
dla
nerwowo chorych,
morfinistów i t. p.
Baden-Baden.
Leczenie przez odzwyczajenie
bez męczarni*)

Prosp. Dr. med. Otto Emmerich.

*) Porównaj: Dr. O. E., Leczenie przewlekłego zatrucia morfiną bez męczarni i przymuszenia. Nakład H. Steitza, Berlin. S. W. II. wydanie.

Dietenmühle Wiesbaden.

Dom leczniczy dla chorych nerwowych.

Umysłowo chorzy wykluczeni.

Leczenie wodą. Kąpiele parowe. Tusze parowe. Wiesbadeńskie ciepłe kąpiele. Kąpiele igliwiowe. Kąpiele słone i mułowe. Elektroterapia. Tusze Franklinowskie. Kąpiele elektryczne. Masaż i gimnastyka lecznicza. Dzwony pneumatyczne. Kuracye mleczne.

Otwarty cały rok — bliższe szczegóły w prospekcie.

Lekarz kierujący: Sanitarny rada:

Dr. C. W. Müller

II. lekarz: **Dr. Berberich.**

Zakład leczniczy D^{ra} Gierlicha

dla chorych nerwowych i osób potrzebujących wypoczynku.

**Masaż, elektryczność, gimnastyka, dyetetyka,
kąpiele wszystkich rodzajów.**

Wiesbaden. Znakomite zdrowe położenie, w pobliżu parku i lasu — idylliczny spokój.

Nowe budynki z komfortem urządzone. —

Cały rok otwarty.

Prospekt przesyła właściciel i lekarz kierujący

Dr. Gierlich

były kierujący lekarz „w Bad Nerothal.“

Apteka pod „złotym Słoniem“
EUGENIUSZA HELLERA

w Krakowie, ul. Grodzka 22. Telefonu Nr. 203.

poleca WW. PP. Lekarzom
największy skład wszystkich najnowszych
środków leczniczych,
oraz
przyrządów lekarskich i chirurgicznych.

Sterylizatory patentowane (Doc. Dr. Łepkowski i E. Heller) do **szczoteczek** do zębów i paznogi, **narzędzi chirurgicznych kateterów** i t. d., nowy wynalazek **suchej** sterylizacji **bez gotowania**, **krażki maciczne** systemu Hodge, Thomas i t. d. okrągłe, wygięte, podłużne, kauczukowe i cellulidynowe.

Utrzymuje na składzie wszelkie klizopompy, respiratory, rozpylacze, termometry maksymalne wyprobowane.

Wstrzykawki **Pravasa** i do serum Diphter.

Jak również poleca:

pastylki Ovarii à 0.20

i pastylki Thyroidini à 0.05,

polecane przez Towarzystwo lekarskie krakowskie.

Zawsze świeża **krowianka**.

Detal depôt Asch & Comp.

Wysyłki na prowincję skutecznia się odwrotnie.

Odznaczone medalem brązowym na krajowej Wy-
stawie we Lwowie w 1894 roku.

PIERWSZA PRACOWNIA I SKŁAD
instrumentów chirurgicznych
i maszyn ortopedycznych

pod firmą

L. Georgeon i J. Trepczyński
we Lwowie, ul. Ruska 1 1.

przyjmuje wszelkie zamówienia w zakres zawodu
tego wchodzące, podejmuje się wszelkich reperacyj
tak narzędzi jak i maszyn ortopedycznych, wyko-
nuje wszelkie roboty tego rodzaju, jakoto: ostrze-
nie, szlifowanie, polerowanie, niklowanie, wypalenie
i t. p. na sposoby zagraniczne, dokładnie i punktu-
alnie po cenach przystępnych.

P. T.

Zawodowa rutyna, doświadczenie i wprawa na-
byte we wielkich fabrykach Leitera, Tuerrigla we
Wiedniu, Schmidta w Berlinie, we Wrocławiu i t. d.
pozwalają nam mieć niepłonną nadzieję, że godnie
odpowiemy położonemu w nas zaufaniu, a sumienną,
uczciwą i punktualną pracą zjednamy sobie uznanie
i poparcie WW. PP. Lekarzy.

Polecając firmę naszą ogółowi WW. PP. Lekarzy

kreślimy się z należnym szacunkiem

L. Georgeon i J. Trepczyński,
Lwów, ulica Ruska 1. 1.

TRUSKAWIEC

Zakład zdrojowo-kąpielowy

stacya klimatyczno-lecznicza i zakład inhalacyjny.

Położony w uroczej górskiej okolicy (415 m. n. p. m.) posiada najsilniejsze w Europie źródła solne (25%), słono-glauberskie, siarczane i alkaliczne.

Kąpiele słone, siarczane, siarczano-słone, borowinowo-żelaziste, elektryczne, tusze zimne. Inhalacya solankowa Wassmundtha. Leczenie elektrycznością i masażem.
Żytyca.

Wskazania: Gościec stawowy i mięśniowy, podagra, otyłość, kiła, żoły. Cukrzyca. Nieżyt żołądka i kiszek, nawykowe zaparcie. Obrzęk wątroby i śledziony, żółtaczka, kamyki żółciowe, hemoroidy. Choroby kobiece zwłaszcza wysiękowe pozapalne. Zboczenia w miesiączkowaniu. Niektóre formy niepłodności, guzy włóknia-kowe.

Choroby dróg moczowych: nieżyt pęcherza i miedniczek nerkowych. Piasek w moczu, chroniczne zapalenie nerek. — Niektóre choroby skórne, jak wyprysk chroniczny, przewlekła róża i t. p.

Choroby serca, zwłaszcza zapalenia wsierdza i osierdza, oraz polegające na osłabieniu lub stłuszczeniu mięśnia sercowego.

Choroby nerwów, zwłaszcza neuralgie, zapalenia nerwów, porażenia obwodowe, formy przeczulicy i bezczułości.

Wysięki i wypociny w mięśniach około stawów po urazach i złamaniach.

Za względu na wziewalnię, nieżyty dróg oddechowych i rozedma płuc.

Choroby ocz i wzroku, polegające na żożach, reumatyzmie i powstałe skutkiem obstrukcyi lub przekrwienia brzuszego, zatrucia ołowiowe lub rtęciowe.

Ordynują: Radca Dr Plech, Dr Pelczar, jako lekarze zakładowi — nadto Dr Edw. Krzyżanowski i Steinhaus.

Sezon od 25 Maja do 25 Września.

Sanatorium Buchheide

(Straussenruh).

Lasy szpilkowe koło Szczecina. Zakład leczniczy dla chorób nerwowych, dla ludzi potrzebujących wypoczynku, ozdrowieńców, morfinistów, alkoholistów itd. **Otwarty cały rok.** Wielki park. — wokół lasy szpilkowe i liściaste. Elektroterapia. Hydroterapia. Masaż, gimnastyka. Leczenie terenowe. Prospekty darmo.

Właściciel i kierujący lekarz **Dr. Ernest Colla.** Lekarz konsult. Radca sanitarny **Dr Zenker.**

Kapiele Elgersburg w Turynii.

HOTEL i PENSYA

Herzog Ernst

założone w r. 1883 z trzema willami.

Nowe zakłady wodolecznicze.

Sezon od połowy kwietnia do 1 października.

Wzniesienie n. p. m. 555 metrów.

Znakomite wysokie zdrowe położenie w lesie, przepyszne widoki na okolicę. — Stosuje się wszelkie zabiegi wodolecznicze, elektroterapią, masowanie, gimnastykę leczniczą, na miejscu lekarz domowy i kąpielowy. Znakomite powietrze. Doskonała woda. — Ogólnie zachwalana kuchnia przy niskich cenach. Omnibus na dworcu. Lekarz kierujący **Dr Schäfer.** — Prospekta bezpłatnie.

Właściciel **Maksymilian Mercker,**

Wielki medal na wystawie przyr.-lekarskiej w Krakowie r. 1891.

WYSOWA

w Galicyi powiat Gorlice.

Zakład zdrojowo-kąpielowy i żętyczny.

Stacye kolei żelaznej Grybów lub Gorlice o 30 kilometrów od Zakładu odległe.

Siedm głównych źrójów chemicznie rozebranych przez Prof. Radziszewskiego i Trochanowskiego.

Źródło słone szczawa słono-bromowo-jodowo-żelazista zawiera z wszystkich dotąd znanych szczaw największe ilości dwuwęglanu sody. Węgł Prof. Radziszewskiego i Dra Lutostańskiego zajmuje pierwsze miejsce w dziale wód tego rodzaju.

Źródło Rudolfa szczawa alkaliczno-żelazista najsilniejsza z dotychczas znanych szczaw w Europie.

Źródło Bronisława silna szczawa alkaliczno-żelazista.

Źródło Józefa szczawa alkaliczna, nagrodzona na wystawie przyr.-lekarskiej wielkim medalem zasługi, polskim Gieshüblerem zwana, tego rodzaju zagraniczne szczawy zastąpić może.

Źródło Olgi o składzie do Słon. zbliżony. **Źródło Wandy** słaba szczawa żelazista.

Źródło Karola słaba szczawa żelazista.

W sezonie lekarz, apteka, łazienki, poczta, muzyka.

Wycieczki bliskie w uroczę okolice. — Jednodniowa wycieczka do: Krynicy, Muszyny, Żęgiestowa, Bardyowa.

Wody rozsyła Zakład w cenie:


za pakę dużą (40 flaszek) 8 zlr. || Za pakę małą (20 flasz.) zlr. 4'25.
Źródło Józefa paka duża 6 zlr.

Wody do nabycia we wszystkich składach wód mineralnych w Galicyi.

Informacye na żądanie gratis i franco.

Medal zasługi na wystawie przemysłowo-rolniczej w Przemyśle r. 1882.

Dra Koellnera dom leczniczy i pensya na Hainstein przy Wartburgu, Eisenach.



Także dla nieleczących się. Kęgielnia, weranda, własne deptaki w lesie tuż obok lasu turyńskiego. — Znakomita woda źródłana. — **Elektryczne oświetlenie.** Dom ogrzewany parą. Kanalizacja. Leczenie wodne, dyetyczne i ferenowe. Miejsce dla odpoczynku i rekonwalescentów.

Rzymskie, rosyjskie, elektryczne, lekarskie kąpiele parowe. Rozmaite tusze i kąpiele dla pań i panów. Leczenie elektryczne i pneumatyczne (aparat Geigela), masaże itd.

Bliższe szczegóły w opisach, wysyłanych darmo i opłatnie.

Jąkanie

leczy **Prof. Dr. Rudolf Denhardt** w swoim
gruntownie zakładzie

Honorarium **Eisenach** Prospekty
po wyleczeniu darmo

Jedyny zakład Niemiec, przepyszenie położony,
kilkakrotnie państwowo odznaczony, ostatnim
razem przez

J. M. Wilhelma II.

Zakład leczniczy dla chorych na cierpienia żołądkowe i jelitowe,

Parkvilla, Wiesbaden, Parkstrasse 19.

— Otwarty w zimie i w lecie. —

Prospekta bezpłatnie.

Dr L. Abend,

b. asystent profesora Leubego.

Naftalan

stosowany ze skutkiem
w chorobach skórnych, wypryskach (por. Deutsche Med.
Woch. 1896, Nr 52, Dr Józef Max),
w róży twarzy, w ranach wrzodziejących i wrzodach,
oparzeniach, zgnieceniach, stłuczeniach,
zapalenie przyjędza, dymienicy,
w gościowych i dnawych cierpieniach,
nadaje się też jako poctawa maści z powodu swoich wła-
sności antyseptycznych.


Prof. Pick w Pradze pisze: „Pański naftalan okazał się
zdatnym do użytku w leczeniu różnych chorób skórnych.”
Również korzystnie wyraził się o naszym środku **prof. Kaposi**
we Wiedniu. — W klinice **prof. Fingera** we Wiedniu
leczone nim rozmaite postacie wyprysku, impetigo conta-
giosa, herpes tonsurans, swierzb. u **prof. Schwimmera**
w Peszcie psoriasis z dobrym skutkiem, w niemieckim
szpitalu w Odessie, (**Dr. Fricker**) gościec stawowy,
neuritis. **Radca prof. Bergmann** w Berlinie pisze, że
w przypadkach w których w miejsce dawnych pędzlowań dzie-
giem stosował naftalan, dobry wynik.

Naftalan Gesellschaft — Geran-Tiflis.
Szpitalom, lekarzom fabrycznym posyłają na żądanie literaturę
i próbki zastępcy dla Austro-Węgier: **G. R. Fritz, Wiedeń I.**
Sprzedaż przez apteki.

K. ZIELIŃSKI

optyk i mechanik

Kraków, Rynek 1. A-B, 39,



poleca w wielkim wyborze wyroby optyczne t. j.
okulary, binokle, lornetki teatralne, polowe,
ciepłomierze lekarskie, chemiczne i pokojowe,
barometry i t. p.

Maszynki elektryczne z prądem stałym lub
indukcyjnym, oraz wykonuje wszelkie reparacye
takowych.

Poleca zarazem P. T. Okulistom własną szlifiernię szkła
optycznych, **specyalnie wszelkich szkła kombi-**
nowanych, które z najstaranniejszą dokładnością wy-
konuje i ściśle podług przepisu oprawia.

Roczne zestawienie.

Miesiąc	Przychód		Rozchód	
Styczeń . . .				
Luty				
Marzec . . .				
Kwiecień . .				
Maj				
Czerwiec . .				
Lipiec				
Sierpień . . .				
Wrzesień . .				
Październik .				
Listopad . .				
Grudzień . .				
Razem . . .				

Tannalbin Knolla,

szybko i pewnie działający w przewłocznych i ostrych chorobach przewodu pokarmowego u dorosłych i dzieci, także w gruźlicy jelit. Zob. doniesienia z klinik prof. Vierordta w Heidelbergu, Nothnagla w Pradze, Ganghofer w Pradze i t. d. i t. d.

Ichtalbin Knolla,

nieposiadający smaku ani zapachu, połączenie ichtyolu z białkiem, **najlepszy przetwór do wewnętrznego podawania ichtyolu.** — Zob. spraw. Dra A. Sacka Deut. Med. Wochschr. 23. 1897.

Diuretin Knolla,

dzielny środek **moczopędny** może być podawany równocześnie z **digitalis**.

Codein Knolla,

najlepszy środek przeciw kaszlowi, nieodczuwany u gruźliczych.

Ferropyrin Knolla,

dobrze haemostaticum w krwotokach z nosa, krtani, gardła, pochwy, także po wyjęciach zębów. Wewnętrznie w blednicy, niedokrewności i t. d.

Thyraden Knolla,

wyciąg gruczołu tarczycowego z stałą ilością jodu używany w klinice Kochera w Bernie. Tabletki à 0.3 świeżego gruczołu.

Zapasy w aptekach.

Chemiczna fabryka Knolla i Ski,
Ludwigshafen n. R.

